UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

EXODONCIA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
CIRUJANO DENTISTA

P R E S E N T A:

LAURA GEORGINA PEREZ YEPEZ

MEXICO. D. F.,

Vo. B. J.
Rosa Pérez

1983

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

SUMARIO

INTRODUCCION

- 1.- DEFINICION.
- 2.- HISTORIA CLINICA.
- 3.- TRIGEMINO.
- 4.- INDICACIONES Y CONTRA INDICACIONES EN EXODONCIA.
- 5.- INSTRUMENTAL.
- 6.- TECNICAS DE EXTRACCION CON FORCEPS Y ELEVADORES.
- 7.- ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA EXTRACCION DENTARIA.
- 8.- CUIDADOS PRE-OPERATORIOS Y POS-OPERATORIOS.
- 9.- FARMACOS.
- 10.- BIBLIOGRAFIA.

EXODONCIA.

E X O D O N C I A

D E F I N I C I O N

Se puede definir como una rama de la odontología que se encarga de la extracción de un órgano dentario de su alojamiento óseo.

Es de especial importancia el recibir a un paciente para lograr su confianza, para ello, además de suministrar comodidad al paciente, se -debera obtener una evaluación detallada general, debido a que los pa---cientes difieren en temperamento, condiciones físicas e inteligencia.

HISTORIA CLINICA

Es el documento central en el expediente del enfermo. Es la biografía del individuo, en relación a sus padecimientos físicos y mentales, incluyendo los datos o antecedentes pasados o actuales que pueden estar vinculados con ellos como son: su medio ambiente, sus hábitos y costumbres y los factores concerniente a su herencia.

De su concretización depende no solo el diagnóstico y la terapéutica del enfermo, sino también en el conocimiento del ambiente en que se desenvuelve.

Es pues la conjugación de todas las alteraciones pasadas, físicas y psíquicas, que se manifiestan en el paciente actualmente=

Documento gráfico en caso de reclamación judicial por incompetencia profesional.

Una historia clínica debere reunir los siguientes requisitos.

HISTORIA CLINICA

DATOS GENERALES.

(ficha de identificación)

NOMBRE _____ EDAD _____ EDO. CIVIL _____

OCUPACION _____ LUGAR DE NACIMIENTO _____

DOMICILIO _____ TELEFONO _____

Calle y Núm. Col. Z.P.

FECHA _____

EXAMEN BUCAL

EDO. DE LA CAVIDAD ORAL. _____

MOTIVO PRINCIPAL DE LA CONSULTA. _____

HIGIENE BUCAL. _____

TRATAMIENTOS ANTERIORES. _____

EDO. PARODONTAL. _____

OCLUSION. _____

ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR. _____

ANTECEDENTES DEL DIENTE A TRATAR.

CARIES. _____

ABCESO. _____

OBTURACION. _____

ENDODONCIA. _____

EROCION. _____

GIROVERSION. _____

TRAUMATISMO. _____

RESTO RADICULAR. _____

ABRASION. _____

PROTESIS. _____

ESTUDIO RADIOGRAFICO.

DENSIDAD OSEA. _____

INFECCION RESIDUAL. _____

RAICES. _____

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES.

ESTUDIOS POR APARATOS Y SISTEMAS.

SISTEMA NERVIOSO. _____

SISTEMA ENDOCRINO. _____

APARATO CARDIOVASCULAR. _____

APARATO DIGESTIVO. _____

APARATO RESPIRATORIO. _____

APARATO GENITO URINARIO. _____

PROPENCION HEMORRAGICA. _____

ALERGIAS. _____

PRUEBAS DE LABORATORIO. _____

ESTADOS FISIOLÓGICOS EN LA MUJER.

MENSTRUACION. _____

EMBARAZO. _____

LACTANCIA. _____

MENOPAUCIA. _____

EDO. GENERAL. _____

ANALGESIA INDICADA. _____

TECNICA EMPLEADA. _____

PRESCRIPCIONES OPERATORIAS. _____

COMPLICACIONES. _____

EXAMINADO POR : _____

NERVIO TRIGEMINO

TRIFACIAL O V PAR.

Entre la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso, por dos raíces - una gruesa y una pequeña.

Se desarrolla en relación con el primer arco branqueal, con sus fibras sensitivas inerva la piel de la cara y la parte anterior de la cabeza.

Es también conductor de la sensibilidad de los receptores de las mucosas de la boca, la nariz, del oído y de la conjuntiva de los --- ojos.

Inerva los músculos de masticación desarrollados del arco branqueal y los músculos del suelo de la boca.

Contiene también fibras aferentes, en su composición de los ramos del nervio entran las fibras secretoras vegetativas para las cavidades faciales.

Se divide en tres ramas, su origen real es el ganglio trigeminal de gasser, situado en la cara postero superior de la roca del temporal, del ganglio se desprende una raíz posterior que llega a una protuberancia anular, y en su parte anterior presenta tres raíces que -- son:

NERVIO OFTALMICO.

NERVIO MAXILAR SUPERIOR. (son exclusivamente sensitivas).

NERVIO MAXILAR INFERIOR. (es mixto).

PRIMERA RAMA DEL NERVIO OFTALMICO.

NERVIO OFTALMICO. Sale del cráneo a la órbita a través de la fisura orbital superior, antes de penetrar se divide en tres ramos.

NERVIO FRONTAL NERVIO LAGRIMAL RAMO MEDIAL O NASOCILIAR

NERVIO NASAL. Atraviesa la endidura esfenoidal, y se dirige por la parte interna y afuera del anillo de cinc.

Va adosado a la cara interna de la cavidad orbitaria, después se divide en dos, nasal interno que penetra por el conducto edmoidal (lámina cribosa), y penetra por el agujero edmoidal y da sus ramos terminales

a las fosas nasales donde recibe el nombre de nervio Naso Lobar.

NASAL EXTERNO. Que se prolonga hasta llegar al borde de la fosa orbitaria y posteriormente de sus terminales a nivel del tabique nasal y el espacio interciliar.

NERVIO FRONTAL.

Se divide en dos ramos una interna y otra externa.

La rama interna pasa por arriba del anillo de cinc y da ramas del párpado superior donde recibe el nombre de supraorbitario, donde sus terminaciones a la parte superior de la cavidad orbitaria.

La rama externa se dirige hasta el tabique nasal inervandola y pasando posteriormente al nervio interciliar.

NERVIO LAGRIMAL.

Pasa por arriba del anillo de cinc. que da ramas a la conjuntiva ocular, inerva una pequeña zona de la piel en el ángulo externo del ojo y la glandula lagrimal.

GANGLIO OFTALMICO O CILIAR.

1) Motor Ocular Común.

2) Nervio Nasal.

Ramas Eferentes.

1) Músculo Ciliar.

2) Iris.

3) Córnea.

EL GANGLIO OFTALMICO O CILIAR. Aplanado en forma cuadrilatera y dentro del anillo de cinc, recibe ramos eferentes del nervio motor ocular común, que es una rama motora y también recibe una rama sensitiva del nervio nasal. Las ramas eferentes que constituyen las ramas ciliares que dan inervación al músculo ciliar, al iris y a la córnea del ojo.

NERVIO MAXILAR SUPERIOR Y GANGLIO ESFENOPALATINO.

SEGUNDO RAMO DEL TRIGEMINO

Exclusivamente sensitivo, se origina de la parte media del borde anteroexterno del ganglio de gasser, se dirige hacia adelante para al--

canzar el agujero redondo mayor, por el cuál atravieza para penetrar a la fosa ptérigomaxilar, hacia adelante abajo y afuera corre para alcanzar el canal suborbitario, penetra en el conducto del mismo nombre y sale por el orificio sub-orbitario donde emite sus ramos terminales.

Se dirige en el desdoblamiento de la dura madre, hasta llegar al agujero redondo mayor, antes de atravezarla da una rama colateral llamada meningea media, pasa a la fosa esfenopalatina, y da las siguientes-ramas orbitaria, nervio esfenopalatina, nervio dentario posterior, nervio dentario medio y nervio dentario anterior y una rama terminal o nervio sub-orbitario.

Ramo Meningeo Medio. Se distribuye por las meninges de las fosas-esfenoidales acompañado a la arteria meningea media.

Ramo Orbitario. Penetra en la cavidad orbitaria, se dirige hacia-arriba, en el espesor del periostio de la pared externa de la orbita - al salir se divide en un ramo temporomalar, que penetra en el conducto malar donde se anastomosa con el temporal profundo anterior rama del -maxilar inferior, el otro ramo del orbitario es el lágrimo palpebral - que se dirige hacia adelante y arriba y suministra un filete lagrimal- que se anastomosa con el ramo lagrimal del oftálmico y termina en la -glándula lagrimal y un filete palpebral que termina en el párpado inferior.

Nervio Esfenopalatino. Se desprende del maxilar superior, por afuera del ganglio esfenopalatino, por el cuál proporciona uno o dos ramos anastómicos, los nasales superiores, el nasopalatino, el ptérido palatino, el palatino anterior, el palatino medio y el palatino posterior. Los dos o tres ramos nasales superiores llegan a las fosas nasales para inervar las mucosas de los cornetes superior y medio.

Nervio Nasopalatino. Penetra por el agujero esfenopalatino alcanza el tabique de las fosas nasales hasta llegar al conducto palatino anterior atravieza por éste para inervar la mucosa de la parte anterior de la bóveda palatina, emitiendo antes numerosos ramos a la mucosa que cubre el tabique.

Nervio Palatino Medio. Acompañado del palatino anterior o pasando por uno de los conductos palatinos accesorios de donde sale para -- distribuirse por la mucosa del velo del paladar.

Nervio Palatino Posterior. Penetra en el conducto palatino acces-

sorio, se divide en una rama anterior sensitiva destinada a la mucosa de la cara superior del velo del paladar, la posterior inerva el peristafilino interno, el palatogloso y el faringeo estafilino.

Nervios Dentarios Posteriores. Son dos o tres ramos que se desprenden del tronco en la parte anterior de la fosa ptérigomaxilar y descienden adosados a la tuberosidad del maxilar para penetrar en los conductos dentarios posteriores, proporcionan ramos de los gruesos molares superiores, así como a la mucosa del seno maxilar y al hueso mismo.

Nervio Dentario Medio. En pleno canal sub-orbitario se anastomosa con el dentario posterior y con el dentario anterior contribuye a formar así el plexo dentario, emitiendo ramos para los premolares y a veces para el canino.

Nervio Dentario Anterior. Emanado del nervio cuando este pasa por el conducto sub-orbitario, camina por el periostio para alcanzar el conducto dentario anterior y suministra ramos a los incisivos y al canino.

GANGLIO ESFENOPALATINO. También llamado ganglio de Meckel, está situado en el trasfondo de la fosa ptérigomaxilar por dentro y abajo del maxilar superior, es aplanado de arriba abajo y de forma triangular o cuadrilátera.

Ramos Aferentes. Los tres ramos que recibe procedentes del nervio esfenopalatino constituyen sus ramas externas y un ramo que posterior y nervio vidiano para abordar al ganglio por su borde posterior.

El Nervio Vidiano. Está constituido por una raíz motora, el periostio superficial rama del facial por una raíz sensitiva, el petroso profundo mayor rama del glosofaríngeo y por una raíz simpática procedente del plexo pericarotídeo.

Ramos Eferentes. Los ramos que parten del ganglio esfenopalatino se anastomosan y van a distribuirse al mismo tiempo que los ramos terminales del nervio esfenopalatino.

NERVIO MAXILAR INFERIOR Y GANGLIO OPTICO.

Es un nervio mixto, nace del borde anteroexterno del ganglio de Gasser y se forma por la reunión de la raíz motora y la raíz sensitiva.

va que proviene del ganglio.

En un desdoblamiento de la dura madre llega hasta el agujero oval, donde se relaciona con la arteria meningea menor. Fuera del agujero oval queda colocado por fuera de la aponeurosis interpterigoidea y del ganglio óptico al cuál se une intimamente.

Se divide entonces en dos troncos, uno anterior y otro posterior pero emite antes de su bifurcación un ramo recurrente, que se introduce en el cráneo, por el agujero redondo menor, acompaña a la arteria meningea media y se distribuye por las meninges.

El tronco anterior proporciona tres ramos: El Temporo Bucal, El Temporal Profundo Medio, Temporomaseterino.

El Nervio Temporo Bucal parte del tronco, se dirige hacia el pterigoideo externo al que suministra algunos ramos, en la cara externa se divide en un ramo ascendente motor o nervio temporal profundo anterior que se distribuye por los haces anteriores del músculo temporal, y un ramo sensitivo o nervio bucal, que cruza por la cara interna del tendón del temporal para alcanzar la cara externa del bucinados, donde proporciona ramos para la piel y la mucosa del carrillo, su ramo cutáneo se anastomosa con el facial.

El Nervio Temporal Profundo Medio, hacia arriba y afuera alcanza la cresta esfenotemporal y se dirige y distribuye en los haces medios del músculo temporal.

Nervio Temporomaseterino, Pasa por encima del músculo pterigoideo externo y al nivel de la cresta esfenotemporal se divide en un ramo ascendente este para por la escotadura sigmoidea y se distribuye por la cara profunda del músculo masetero.

El tronco Posterior, emite cuatro ramas, una de las cuales es común a los nervios del pterigoideo interno, peristafilino externo y músculo del martillo se une al ganglio óptico, del que se separa para dividirse en tres ramas, es el nervio del pterigoideo interno nervio del peristafilino externo y el nervio del músculo del martillo.

El Nervio Auriculotemporal, pasa sobre la arteria maxilar interna, penetra en la cara profunda de la parótida, el nervio atraviesa el ojal retrocondíleo de Juará ya en la parte superior de la glándula pasa por atrás de los vasos temporales superficiales y por delante del conducto auditivo externo, dividiéndose en varios ramos. Los Auriculares,

destinados a la articulación temporomaxilar. Un ramo anastomótico para el nervio dentario inferior, otro que se une al nervio facial y ramos parótideos que se distribuyen por la glándula parótida.

El Nervio Dentario Inferior, penetra por el conducto dentario y corre por éste, hasta el agujero mentoniano donde se divide en sus ramas terminales, el dentario inferior emite diversas ramas colaterales, la rama anastomótica del lingual se desprende en la región interpterigoidea y se dirige hacia abajo para alcanzar lingual por abajo de la cuerda del tímpano.

Los ramos dentarios nacen del conducto dentario y están destinados a inervar los molares, los premolares y el canino, así como el maxilar inferior y la encía que lo cubre.

Las ramas terminales son dos, el nervio incisivo proporciona ramos a los incisivos y al canino, y el nervio mentoneano sale por el agujero mentoneano y se espansa en múltiples ramos que se distribuyen por el mentón y el labio inferior, alcanzando su mucosa.

El nervio lingual cruza por el conducto de Wharton, se ramifica en la mucosa de la lengua situada por delante de la V lingual, el lingual recibe diversos ramos anastomóticos, uno de ellos del dentario, otro proviene del facial que constituye la cuerda del tímpano, el tercer ramo se anastomosa con el hipogloso mayor que desciende por la cara externa del músculo hipogloso y está constituido por uno o dos ramos. El último suministra un ramo anastomótico que se une con el nervio milohioideo.

GANGLIO ÓTICO O GANGLIO DE ARNOLD.

Esta situado por el agujero oval y por dentro del nervio maxilar inferior, como principales ramas aferentes el nervio petroso superficial menor que procede del ganglio geniculado y sale del cráneo por un conducto situado por dentro del agujero oval, el nervio petroso profundo menor deriva del nervio de Jacobsonen, la cara interna del tímpano y va a unirse con el nervio petroso superficial menor para constituir la raíz larga del ganglio ótico, la raíz simpática que rodea la meninge media.

Los ramos eferentes, se desprenden del ganglio, delgadas ramas que

van a los nervios del pterigoideo interno, del periestafilino externo y del músculo del martillo, así como ramos que van al aurículo temporal - para inervar la glándula parótida y la mucosa de la caja del tímpano.

El núcleo principal está situado en la eminencia y se halla formado por una columna que es continuación del músculo del hipogloso.

El núcleo accesorio está situado por delante del anterior entre este y el núcleo del facial.

Al salir del neuroeje en el surco bulboprotuberancial, el nervio - corre por el tejido sub-aracnoideo, entre la protuberancia y el canal basilar, hasta alcanzar el borde lateral de la lámina cuadriflata del esfenoides, recibe por el seno cavernoso filetes anastómicos procedentes del plexo pericarotideo y del oftálmico.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES EN EXODONCIA

Es importante hacer una evaluación inicial como medida de prevención para la intervención quirúrgica.

Esto se puede hacer por medio de una radiografía, conociendo perfectamente la anatomía de las piezas dentarias, (aunque aquí puede haber variaciones), si estas fueran múltiples y al mismo tiempo de ambos maxilares, se harán primero las extracciones del maxilar superior, sino pueden caer los fragmentos de los dientes o de cuerpos extraños en las cavidades abiertas de la mandíbula.

Esto se hará con el fin de evitar lo más posible las complicaciones de la intervención quirúrgica.

INDICACIONES

- 1.- Dientes Cariados.- cuya función no es restaurable por procedimientos de clínica operatoria.
- 2.- Dientes Fracturados Luxados o Semiluxados.- ya sea por destrucción por caries, por lesión traumática, destrucción ósea o molestias al morder.
- 3.- Dientes Amputados por Enfermedades Diabéticas.- como parodontopatías no susceptibles a tratamientos o cuando ya no hay soporte óseo.
- 4.- Dientes que han perdido su Antagonista.- por cuya causa son expulsados de su alveolo lesionando la encía antagonista, puede ocasionar inflamación.
- 5.- Dientes Ectopicos.- cuyo aliniamiento ortodontico no es posible giroversiones que no sean posibles de corregir con tratamiento ortodontico o cuando estan fuera de la arcada.
- 6.- Dientes que deben tratarse la pulpa.- y que por causas de la morfolgia nodular no es posible el tratamiento endodontico.
- 7.- Dientes Primarios Resistentes.- cuando el secundario correspondiente no se encuentra en posición correcta para su erupción o cuando ya haya hecho erupción el permanente y el primario o temporal persista y cuando

do se encuentren los primarios con foco de infección o absceso.

- 8.- Dientes Retenidos o Incluidos.- que provocan quistes o infecciones o algunos problemas de cefaleas continuas. - Como es muchas veces en el caso de los terceros molares, dentario inferior y mal posición dentaria periculitis o pericoronitis.
- 9.- Dientes Sanos.- pero aislados en distintos lados de la boca que constituyen impedimento para una correcta elaboración de la prótesis total.
- 10.- Dientes que están en una línea de fractura Osea.- por infección en una fractura de la mandíbula, el paquete vasculo nervioso está afectado. Cirugía.
- 11.- Raíces y fragmentos dentarios.- el resto radicular casi siempre está afectado, infección crónica.
- 12.- Dientes que traumatizan los tejidos Blando y que no hay procedimientos para evitarlos.- como los terceros molares en mal posición.
- 13.- Dientes situados en zonas Patológicas.- como en un quiste.
- 14.- En Ortodoncia.- cuando esta la requiere por algún tratamiento.
- 15.- Dientes Supernumerarios.- que se encuentran en zonas que ocasionan problemas para la oclusión.
- 16.- Dientes con Enfermedad Parodontal Avanzada.- como en la parodontitis (piorrea); o donde ya no existe soporte óseo.

INDICACIONES DE TIPO GENERAL

Como en los casos de esostosis cleidocraneana. (esto se refiere - al síndrome de deficiencia en la dentadura temporal apíñonamientos), -- también en el querubismo (síndrome donde también observamos apíñonamientos y dientes supernumerarios).

En la epilepsia, esto dependerá del estado del paciente. En la endocarditis bacteriana, cuando esta sea consecuencia de dientes infectados por gérmenes, en la artritis reumatoide.

CONTRAINDICACIONES LOCALES

4

Cuando exista una infección aguda acompañada de dolor e inflamación.

En dientes temporales que no exista germen dentario permanente.

Dientes cariados que estén afectando la pulpa, pero que se puede llevar a cabo el tratamiento endodóntico.

Dientes con parodonto sano (aún que este afectado por caries de tercer grado).

CONTRAINDICACIONES DE TIPO GENERAL

CARDIOPATIAS.- los pacientes enfermos del corazón y del sistema circulatorio requieren una consulta previa con su médico especialista por lo que los riesgos de la intervención aumentan considerablemente si no se hace la elección correcta del anestésico.

A estos pacientes debemos aplicarles anestésico sin vasoconstrictor. Los signos o síntomas más importantes de los padecimientos cardiovasculares son: Disnea, Ortopenia, Sianosis, Anorexia, Edema cardiaco y circulatorio.

DISCRACIAS SANGUINEAS.- en ésta enfermedad se debe interrogar a los pacientes detenidamente, acerca de los efectos producidos en las heridas traumáticas, se indagará si las heridas leves sangran copiosamente y si estas se cohiben fácilmente o si es necesario la administración de algún hemostático, si hay antecedentes de hemorragias en la familia o si después de la extracción se presentó alguna hemorragia, y la forma como se cohibió ésta, por lo general cuando la hemorragia es secundaria, puede ser algunas veces debido a enfermedades orgánicas generales y esta puede ser por el aumento o permeabilidad de los vasos, debido a la deficiencia de vitamina C, otras veces los vasos pierden su contractilidad.

El principal tratamiento o atención a estos pacientes son problemas hemorrágicos, es en primer lugar suprimir las causas del problema causante por medio del médico general y después intervenir en ellos.

ANEMIAS.- éstas significan un empobrecimiento de la sangre, ya sea cualitativo o cuantitativo del contenido de hemoglobina, estas pueden -

ser primaria o secundaria, hay una causa definitivamente distinguible, como por ejemplo en el caso de la anemia consecutiva a hemorragias o en la anemia que acompaña a las neoplasias malignas, las enfermedades infecciosas agudas como la fiebre tifoidea o la fiebre reumática aguda y los edos, patológicos crónicos como la sífilis, la tuberculosis y la nefritis, la anemia secundaria se manifiesta por lo común por palidez de las mucosas, en particular del labio inferior y con cierta frecuencia por estomatitis y gingivitis, con hemorragias marginales, las hipovolemias, producen anemias y en primer lugar intervienen las deficiencias de vitamina B₁₂ y de ácido fólico, la carencia de ésta tiene como consecuencia la anemia perniciosa que se caracteriza por la palidez de la piel.

LEUCEMIA.- no se intentara efectuar extracciones dentales en enfermos leucemicos a menos que sean necesarias y si estas llegaran a realizarse sera necesario hospitalizar al paciente por el peligro de hemorragias copiosas, presentables en la intervención, las lesiones bucales casi siempre se vuelven notables, algunas veces las ulceras gingivales, la hipertrofia y las hemorragias pueden ser indices para su diagnóstico y por lo tanto remitir a estos pacientes con su médico particular antes de tratarlos y así evitarnos complicaciones posteriores.

HEMOFILIA.- es la enfermedad hemorrágica más difícil de tratar siempre es hereditaria, pero no siempre son hemofilicas, las personas que tienen antecedentes de hemorragias en la familia, consiste en un defecto sanguíneo congenito, que se trasmite por medio de la descendencia femenina a la masculina. La coagulación sanguínea se encuentra impedida o muy retardada.

Las personas hemofilicas pueden tratarse especialmente antes, durante y después de la intervención y éstas deben ser en hospitalizadas en donde puedan proporcionales todos los medios necesarios o adecuados, para esta clase de enfermos.

DIABETES.- este es un trastorno crónica, pancreatico y metabólico. Caracterizado por una elevación excesiva de la glucosa sanguínea, acompañada de alteraciones en el metabolismo de los lípidos y proteínas, de todo lo cuál la causa es una falta relativa o absoluta de insulina.

El síndrome diabético se desarrolla como consecuencia de un desequilibrio entre la producción y liberación de insulina, por una parte y -

factores hormonales o tisulares que la modifican.

Se puede atribuir a la intolerancia a los hidratos de carbono y a la destrucción de los islotes de langerhans del páncreas.

Los signos y síntomas más característicos son con frecuencia poli-dipsia, poliuria y polifagia y pérdida de peso. La sospecha clínica de diabétes se confirma al encontrar glucosa en la orina y descubrir un -- contenido anormalmente elevado de glucosa en la sangre, si la hipogluce mia se acompaña de glucosuria y cetonuria, el diagnóstico de diabétes - se confirma.

Para el tratamiento adecuado, son indispensables la dieta y el tra tamiento insulínico.

Las personas diabéticas presentan muy escasa resistencia a la in-- fección y por lo tanto a la cicatrización en éllas es retardada.

CIERTOS PADECIMIENTOS NERVIOSOS.- como en la menstruación en muje res que padecen irritabilidad mental y física en éste período, como pue de ser menorragia, metrorragia, dismenorrea, etc.

En el embarazo esta no es una containdicación absoluta como en el caso anterior, procuraremos abstenernos en el primer trimestre de éste- o en los casos en que haya habido antecedentes de abortos.

Los neuróticos, estos pacientes ocasionan siempre dificultad para intervenirlos, necesitaremos premedicarlos, sedación y su hospitaliza-- ción seria más recomendable, para controlar su nerviosidad.

TUBERCULOSIS PULMONAR.- los enfermos con éste padecimiento sera di ffcil intervenirlos, pués el esputo contiene microbios de la tuberculo- sis, siendo posible que éstos penetren en el alveolo, y a su vez ocasió nen tuberculosis del hueso.

BUCIO TOXICO.- se deberan tomar las medidas necesarias, pués un -- tratamiento se podría precipitar una crisis en la cavidad de la glándu- la tiroides, que puede llegar hasta el paro cardiaco o bién los pacien- tes que se encuentran en estado de crisis estan semi-inconsientes, cia- nóticos, delirantes y con pulsaciones sumamente aceleradas. Los signos más importantes son: inestabilidad emocional, sudoración excesiva, a--- grandamiento de la glándula tiroides y taquicardia.

SIFILIS.- la resistencia de este tipo de pacientes esta disminuida por esto es factible una infección pos-operatoria o una curación retar- dada.

ICTERICIA.- se puede agravar el factor etiológico responsable de la ictericia y existe el peligro de hemorragia después de la extracción si ésta es necesaria, el paciente debe recibir grandes dosis de vitamina K, antes de la operación o someterse al tratamiento que corresponde.

OSTEOCLEROSIS.- en éste tipo de pacientes con esclerosis en los maxilares, la extracción será seguida de una invasión bacteriana del hueso expuesto, muerte de células óseas y gradual disolución de los componentes del hueso externo, hasta llegar a la esponja, cuando el hueso expuesto será cubierto por epitelio.

La extracción de dientes en procesos malignos estimula el crecimiento del neoplasma.

INSTRUMENTAL QUE SE UTILIZA EN EXODONCIA

Los instrumentos que se utilizan para efectuar las extracciones dentarias, tienen funciones distintas para operar y generalmente son:

Espejo y Mango.- los hay simples y con aumento.

Pinzas de Curación.

Jeringas.- las cuáles hay de dos tipos: la de lanzeta, que sirve para succionar y darnos cuenta si estamos infiltrando nuestra solución en alguna arteria o vena, la otra es similar pero sin lanzeta.

Legras o Elevadores.- los elevadores o botadores son instrumentos que nos sirven para la luxación de dientes o raíces, los empleamos para la extracción de dientes retenidos, terceros molares inferiores, normalmente erupcionados y raíces, especialmente inferiores. Las técnicas actuales amplían su campo de acción, para la dilatación de las tablas alveolares, la sección de tabiques inter e intra-alveolares y la odontosección.

Botadores.- constan de hoja, tallo y mango. la hoja tiene una punta o borde que puede ser agudo o redondeado, filoso o romo. La cara que se coloca sobre el diente a extraer es plana o cóncava, la opuesta es convexa.

El tallo une la hoja con el mango.

Las hojas están dispuestas siguiendo el eje longitudinal del tallo o anguladas, contra-anguladas y en bayoneta.

El mango puede ser de continuación, de acuerdo con los modelos ---

Cleve Dent o presentarse transversalmente como los de tipo Winter.

Además existen instrumentos que solo difieren en grosor, tamaño -- de la hoja y mango.

Finalmente nos queda recordar la existencia de botadores muy peque-- ños de hojas muy finas y mangos generalmente muy delgados, son los ele-- vadores apicales. Su diseño corresponde al tipo Cleve Dent.

Bisturi.- (hoja S), con mango, número, que es el más usado, con - hojas número II, que es recta y del número 12, que es curva, en forma - de guadaña.

Limas para Hueso.- con extremos operatorios rectangulares y otras-- en forma redonda. Este instrumento opera o funciona en un solo sentido y no en forma de serrucho.

Gubia o Alveoloton.- (osteoton), instrumento que se utiliza para - la regularización del proceso o hueso alveolar.

Cucharillas o Curetas.- instrumentos de doble extremo que se uti-- lizan para hacer la limpieza de los alveolos o también para la extrac-- ción de dientes o restos radiculares a nivel apical.

Separador o Retractor de los Tejidos Blandos.- que se utilizan en las comisuras labiales, unos nos sirven para tener mayor visión al cam-- po operatorio y otros para poder tomar diapositivas.

FORCEPS SUPERIORES.

Incisivos.	286	99A	99C	150	150A	101	62	MDI	
Caninos.	286	99A	99C	1150	32	32A	101	62	MDI 150A
Premolares.		99A	99C	150	150A	32	32A	101	62 MDI
Primer Molar.	32	32A	18L 18R	24	10S 10H	53R 53L	88R 88L	101	MD2
Segundo Molar.	32	32A	18L 18R	24	10S 10H	53R 53L	88R 88L	101	MD2
Tercer Molar.	32	32A	210	101	MD2				
Raices	65	286	69	150					

FORCEPS INFERIORES.

Incisivos.	103	151	203	101	62	MD3			
Caninos.	103	151	203	85	85A	101	62	MD3	
Premolares.	103	151	203	151A	85	85A	101	62	MD3
Primer Molar.	151A	85	85A	15	287	16	17	23	101 MD4
Segundo Molar.	151A	85	85A	15	287	16	17	23	101 MD4
Tercer Molar.		85	85A	222	101	MD4			
Raices	69	103	151	203	MD3				

Nota: Los forceps Nos. 62, 101, MD2, MDI, MD3, MD4, pueden ser usa
dos para dientes temporales y definitivos.

ALVEOLOTOMOS

No. 1-A.- Es universal y puede usarse en cualquier parte de la boca, para una alveolotomía y en muchos casos para extraer particular pequeñas de raíces. Se usa también para romper el proceso alveolar durante la extracción.

No. 2-A.- Para usarse en la región del primer premolar inferior y en la región del tercer molar superior donde no siempre favorablemente debe usarse el alveolotomo No. 1-A. Tar--no.

TECNICAS DE EXTRACCION CON FORCEPS Y ELEVADORES

Para realizar el acto quirúrgico, es necesario conocer la anatomía de los dientes por extraerse, tanto al alveolo que los arroja como las raíces de cada uno de ellos.

Así como también conocer el instrumental indicado en cada caso, es importante tener un campo estéril, esto lo podemos llevar a cabo por medio de la asepsia y antisepsia.

ASEPSIA.- es el conjunto de medios de que nos valemos para evitar la llegada de gérmenes al organismo, en otras palabras es la higiene -- que con sus reglas previene la infección.

ANTISEPSIA.- es el conjunto de medios por los cuáles destruimos -- los gérmenes ya existentes en el organismo, el modo como actúan los antisépticos sobre los gérmenes de oxidado y coagulado de la sustancia al buminoidea que constituye el organismo microbiano determinando su muerte.

SINDESMOTOMIA.- etimologicamente deriva del griego si-desmos-ligamento/ comia-cortar.

Que significa succionar o desprender los ligamentos de su inserción gingival.

Esto constituye un acto imprescindible en exodoncia, ya que vamos a desprender la mucosa o el periostio del hueso, además de facilitar -- la extracción, por el desprendimiento del ligamento circular y la inserción gingival, evita desgarramientos de la mucosa y nos permite colocar los bocados del forceps a la altura del cuello cervical, nos da -- más visibilidad del campo en el que se trabaja y después de la extracción puede ajustarse y adherirse esta mucosa desprendida del hueso, para conseguir que el alveolo cicatrice rápidamente.

INSTRUMENTAL

Los instrumentos deben poseer un discreto filo, con la finalidad de seccionar ligamento anular y no un grosero despegamiento.

Un verdadero bisturí no se aconseja por ser demasiado afilado, su profundización enérgica, puede seccionar la cortical alveolar, siendo - por otra parte demasiado delgado para producir una correcta filatación-alveolar, por otra parte su calibre lo hace demasiado flexible y arriesga su fractura.

Un periostótomo puede ser empleado para el primer tiempo, pero resulta demasiado grueso para el segundo, por lo que no es aconsejable su empleo.

Por lo tanto un sindesmótomo debe poseer punta, relativo filo y -- cierto espesor.

Son preferibles los de A sh o similares que son de aplicación más universal. Para nuestras maniobras utilizamos dos, uno recto para el - maxilar superior, y otro curvo para el maxilar inferior, que ocasionalmente empleamos para la cara distal de los terceros molares superiores.

Generalmente cada diente o cada grupo de dientes necesita un for-- cepts particular, diseñado según la anatomía de cada diente a nivel de - unión corona-raíz.

El acto de extraer un diente de su alveolo, requiere de tres tiempos, los cuales son:

PRENSION.- es el primer tiempo de la extracción, y del cuál depende el éxito de los tiempos siguientes, que consiste en la aplicación de los bocados del forceps al diente, hasta la unión corona anatómica y -- raíz, en donde se apoyan y a expensas del cuál se desarrolla la fuerza para movilizar al diente.

LUXACION O DESARTICULACION.- es el movimiento por medio del cuál - el diente rompe las fibras parodontales y a su vez dilata la tabla externa del alveolo y se realiza en dos movimientos.

Movimiento de Lateralidad.- que va de bucalo vest. hacia gingival- o palatino.

Movimiento de Rotación.- este es complementario de los de lateralidad y los vamos a aplicar solo en los dientes uniradiculares, pues si - este movimiento se aplica en los multiradiculares, se fracturarían las

raíces al hacerlas girar.

TRACCION.- es el último movimiento destinado a desplazar finalmente al diente de su alveolo, este movimiento se realiza y es un éxito - cuando los dos movimientos anteriores ya han dilatado al alveolo y están rotas las floras parodontales.

TECNICAS CON ELEVADORES Y BOTADORES

Se utilizan para la luxación de dientes y raices. La modalidad más clásica los emplea para la extracción de dientes retenidos, terceros molares normalmente erupcionados y raices, especialmente inferiores.

Las técnicas actuales amplían su campo de acción para la dilatación de tablas alveolares, la sección de tabiques inter intralveolares y la odontosección.

Los botadores constan de hoja, tallo y mango. La hoja tiene una punta o borde que puede ser agudo o redondeado, filoso o romo.

La cara que se coloca sobre el diente a extraer es plana o cóncava, la opuesta es convexa. El tallo une la hoja con el mango.

Tiempos de la Exodoncia con Botadores.

Elección, toma y presentación del botador.

Acuñamiento.

Apalancamiento.

Avulsión.

Los botadores se emplean como palanca y como cuña, se pueden hacer movimientos como el de la rueda y como destornillador los botadores rectos.

TECNICA.- la cara plana o cóncava se aplicara contra el diente por extraer y la convexa en el punto elegido como fulcrum de la palanca o la superficie seleccionada como fija cuando se desee recurrir al principio del plano inclinado (cuña). Los distintos espesores de las hojas se utilizaran de acuerdo con la amplitud del espacio interdentario dado que se pueden presentar dientes con buen punto de contacto, con troneras de distinta amplitud, dientes francamente separados entre si o faltar la corona del diente a extraer.

En el maxilar inferior los botadores rectos, se emplean generalmente para actuar sobre los terceros molares inclinados mesialmente.

Los angulados, pueden presentarse por mesial, distal o vestibular.

Por vestibular se aplican en el espacio interradicular de los molares pero adviertase que en los casos de presentación vestibular o distal deberan emplearse al revés, es decir, los izquierdos actuarán sobre los sectores derechos y viceversa.

ELEVADORES RECTOS.- existen varios, con diferentes hojas, anchas,-

angostas, de extremo agudo o romo.

Su empleo está condicionado a la posibilidad de introducción en el alveolo, al diámetro de la raíz y la fortaleza de la pieza a extraer.

Los agudos actuará preferiblemente sobre raíces. En los sectores posteriores de la boca, cuando se desee profundizar por mesial y especialmente por distal la longitud del instrumento, puede ser imposible la presentación por lo que acudiremos a los contra-angulados que permiten esta maniobra.

Estos botadores se emplean rara vez por vestibular, generalmente se aplican por mesial y distal.

Su hoja larga permite profundizarla casi hasta la zona apical del alveolo, por lo que resultan muy útiles para extracción de raíces fracturadas más allá del tercio medio.

AVULSION.- Consiste en desalojar totalmente el diente o raíz de su alveolo. Durante la profundización o acuñamiento.

La profunda introducción del elevador en el alveolo provocara la elevación radicular por producción de un intenso efecto expulsivo levantando la raíz de su lecho.

En caso de emplear el botador como palanca, al girarlo en caso de utilizarse el ángulo, la pieza sera elevada, o recurriendo al apalancamiento simple al emplears el elevador recto.

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES EN LA EXTRACCION DENTARIA

Complicaciones Generales.

LIPOTIMIA.- período de inconsciencia debida a la anoxia cerebral.

Esta es una de la complicaciones más comunes al emplear anestesia-local. Los síntomas clínicos se parecen a los del shock. El paciente palidece, su piel se pone fría y sudorosa, el pulso rápido y la tensión arterial cae algo, aunque transitoriamente.

La lipotimia responde muy rapidamente a tratamientos sencillos.

Se coloca la cabeza del paciente más baja que el cuerpo, en posición trendeleburg, las ropas apretadas debe aflojarse para facilitar la circulación del cerebro, se da una inhalación de amoniaco y se aplica una toalla fria en la cara. Si el paciente a perdido el conocimiento con movimientos convulsivos y pupilas dilatadas se administrará además oxígeno al cien por ciento y un centímetro de epinefrina o una ampoyeta de metazol.

SHOCK.- ésta reacción, es similar al síncope, es mucho más intensa con descanso súbito de la presión arterial y del volumen de sangre circulante. Se pierde la consciencia y el pulso se hace rápido y débil. - Se parece al shock operatorio primario, puede ser debido a la inyección intravascular del anestésico y requiere a veces medidas de urgencia.

Causas del Shock.

- 1.- Deficiencia aguda del retorno venoso por disminución de la volemia o estancamiento de sangre en los pequeños vasos.
- 2.- Deficiencia aguda en el vaciamiento cardiaco, por daño miocardio (shock cardiogénico) u obstaculo mecánico.

Shock Anafiláctico.

Al principio es muy semejante al síncope, se presenta palidez ecsesiva, disnea y mareos, al observar esto colocaremos al paciente en posición supina, posteriormente tomaremos el pulso y si no lo encontramos y hay inconsciencia pensaremos en un shock anafiláctico e inmediatamente emprenderemos el masaje cardíaco a pecho cerrado y daremos a oler sales de amoniaco, si con ésta no reacciona aplicaremos oxígeno y si aún así no hay reacción usaremos adrenalina al I x 1000 en dosis de 0.5 mg. por cualquier via, si no reacciona se podrá repetir la dosis y posteriormente se administrara un corticosteroide como el succinato de

hidrocortisona en dosis de 100 mg. o bien la metil prednisolona de 40 - mg.

Complicaciones del aparato cardiovascular.

ARRITMIA.- la arritmia puede presentarse en cualquier tipo de paciente y como consecuencia de cualquier procedimiento, se puede acompañar de disminución del gasto cardiaco, lo que predispone al colapso. La presencia de ésta complicación durante la anestesia puede requerir un cambio de anestesia.

BRADICARDIA.- ésta puede ser causada por el anestésico, la anoxia o el bloqueo del corazón.

CONVULSIONES.- se pueden presentar con la anoxia, exeso de CO_2 , - la acapnia o la administración accidental por vía intravenosa o la sobredosis del anestésico.

ACCIDENTE CEREBRAL.- los accidentes vasculares cerebrales son frecuentes en pacientes hipertensos, debe tomarse presente que sus signos son variables.

FIBILACION.- La fibrilación del corazón puede ocurrir por aumento de la irritabilidad del miocardio, asociada a hiperactividad simpática e hipersecreción de adrenalina.

HIPERTENSION.- si es ocasionada por el anestésico, es transitoria en el comienzo del estado de sobre dosis, cuando el pulso se acelera - puede aumentar la presión arterial y después disminuir.

HIPOTENSION.- puede ser provocada por el choque, los cambios de posición, la hemorragia o la disminución de vitalidad.

COCAPSO CIRCULATORIO.- es un accidente que rara vez se presenta - y generalmente se acompaña de depresión respiratoria.

Se manifiesta por palidez cutanea intensa, piel sin brillo, relajación general y pulso rápido y superficial.

Puede deberse a algún padecimiento cardiaco crónico, ya existente o por hipersensibilidad del paciente al anestésico, en la mayoría de los casos se debe a la anoxia y a la insuficiencia respiratoria.

En esta complicación debe usarse una droga vasopresora como la epinefrina.

PARO CARDIACO.- es poco frecuente, pero puede ocurrir en cualquier momento y el cirujano dentista está obligado a conocer y resolver este delicado problema.

Se designa como paro cardiaco a la suspensión de las contracciones ericaces del corazón y por lo tanto a la supresión de la función a la - que esta destinado, ya que puede haber movimientos leves y desordenados y el bombeo sanguíneo sea suficiente o no exista.

Puede presentar tres modalidades: .

Paro Total o Asistolia.

Actividad cardiaca, muy débil con bombeo insuficiente o sin él.

Fibrilación ventricular en la cuál la sangre no se moviliza.

ETIOLOGIA.- se debe a la presencia de diferentes factores que contribuyen para su producción como son hipoxia, hipercapnea, inadecuada - administración de drogas, estimulación directa o refleja del para-simpá tico o del simpático, estado nutricional pobre, fiebre alta o hipoter-- mia, ansiedad o miedo.

Entre éllas la hipoxia es el principal factor, esta se debe a:

- 1.- Anorexia anóxica.- por disminución de la tensión de O_2 en el - alveolo pulmonar, debida a obstrucción del árbol respiratorio, a un nivel bajo del oxígeno inspirado o a hiperventilación.
- 2.- Anorexia circulatoria por disminución de la velocidad de la co rriente sanguínea, por insuficiencia del miocardio, por choque, por la administración de drogas hipotensoras, o por cualquier- otro agente que cause baja de la presión arterial.
- 3.- Anorexia anemica.- en la cuál se encuentra disminuido el poder de fijación y liberación del oxígeno por la sangre, lo cuál -- puede deberse a la baja del volumen sanguíneo, por hemorragia, a la disminución de número de hematiés, al bajo porcentaje de- hemoglobina.
- 4.- Anorexia textual.- por detención de la respiración, sea por -- cualquiera de los motivos antes mencionados,el accidente pue- de ocurrir en cualquier momento, ya sea al iniciarse la aneste sia o durante el período de recuperación, por lo que el ciruja no dentista debe estar alerta en todo momento y preparado para cualquier urgencia.

La ausencia de pulso, de latido cardiaco y de tensión arterial, la delatación pupilar y la abolición de sangradooperatorio son datos sufi- cientes para diagnosticar un paro cardiaco.

TRATAMIENTO

La reanimación cardiaca solo es posible lograrla por masaje cardiaco y el éxito del tratamiento depende de la rapidez de su aplicación.

El masaje cardiaco puede llevarse a cabo en dos formas; con tórax cerrado (extratorácico) y con tórax abierto directamente sobre el corazón.

El objeto del masaje es lo. , restaurar la corriente circulatoria de tal manera que ésta sea capaz de producir un pulso periférico palpable en las carótidas, con una frecuencia de 70 pulsaciones por minuto y 2o. restablecer el látido cardiaco, se llevara a cabo con el paciente en posición supina con soporte firme y asegurando una entrada libre de aire.

Se coloca la palma de la mano derecha en la región esternal, apoyando el talón de ésta un poco arriba de la apófisis xifoides y la mano izquierda, se colocará encima del centro del esternón para hacer compresión en sentido perpendicular. Si da resultado efectivo en dos minutos se obtendrán manifestaciones circulatorias evidentes, aparecerá el pulso y la presión arterial subira por lo menos a 100 mm. de Hg. para la sistólica y la diastólica sera de 30 a 40 mm. de Hg.

ACCIDENTES DURANTE LA EXTRACCION

Lesiones a los dientes adyacentes.-las lesiones a los dientes adyacentes pueden ser causadas por los instrumentos usados en exodoncia, -- así como también por instrumentos agudos y cortantes, por fuerzas excesivas y mal dirigidas y para evitar, lesiones a los dientes adyacentes--será necesario utilizar correctamente los instrumentos en el acto operatorio, que nos permitira suministrar fuerzas controladas durante la extracción del diente. Así como también debemos hacer una valoración preoperatoria, en la cuál debemos incluir el examen clínico y radiográfico del diente por intervenirse, el aspecto del mismo en la boca y el mutuo acuerdo con el paciente sobre cuál diente debiera ser extraido.

Fractura Radicular.- una fractura de la unión esmalte con el cemento o más abajo del diente, puede ser visible clínicamente, y la cuál u-

nicamente la podemos observar radiográficamente, el pronóstico de tales fracturas radicales será determinando por la aproximación de los segmentos fracturados, la salud del paciente y la localización de la fractura de la raíz.

Mientras más apical sea la fractura, mejor sera el pronóstico para el tratamiento, pero si el diente persistiera, éste deberá ser examinado periodicamente, buscando su movilidad, vitalidad, dolor a la percusión y cambios radiográficos.

Dientes Móviles.- en ocasiones son luxados los dientes por fuerzas excesivas o mal dirigidas, y estos dientes ligeramente luxados, accidentalmente a la extracción y que sus tejidos periodontales estan sanos, - requieran de tratamiento, estos dientes desplazados o luxados sin prueba de fractura alveolar deberan ser alineados en su posición original, - inmovilizandolos, fijandolos con los dientes adyacentes estables, mediante ligaduras de alambre, acrílico o combinados, durante seis semanas aproximadamente, dicha ligadura no deberá permitir el movimiento de estos dientes luxados y los cuales deberan ser examinados periodicamente determinandose la vitalidad, movilidad, dolor a la percusión y cambios radiográficos, si el diente pierde su vitalidad será necesario si puede ser conservado mediante tratamiento de endodóncia o si deberá ser extraído.

Fractura del Instrumental Empleado en Exodoncia.- no es excepcional que las pinzas de curación, excavadores, exploradores, los botadores, o cualquier otro instrumental usado en exodoncia se fracturen en el acto quirúrgico, cuando excesivas fuerzas se aplican sobre ellos y - al mismo tiempo también pueden así herirse las partes blandas o tejidos óseos vecinos y para extraer dichos instrumentos se impondrá una nueva intervención si no es realizado en el acto de la extracción.

Fractura del Borde Alveolar.- accidente frecuente en el curso de la extracción, es la fractura del borde alveolar, en el cuál el trozo de hueso será eliminado algunas veces en el órgano dentario, este hueso queda fracturado en el primero de los casos tendremos que cortar y limar los bordes cortantes y filosos del hueso quedante del proceso fracturado y al mismo tiempo suturar también, citar al paciente para ver si el secuestro fracturado ha originado procesos inflamatorios consiguientes; osteitis, absesos, los cuáles si no desaparecen debemos hacer la -

extirpación del hueso fracturado, cortar los bordes cortantes, limar y suturar.

Fractura de la Tuberosidad.- en la extracción del tercer molar superior, sobre todo en los retenidos y por el uso de botadores aplicados con fuerzas excesivas, esta tuberosidad o parte de ella puede desprenderse, acompañada del molar en tales circunstancias algunas veces también podría abrirse el seno maxilar dejando una comunicación mucosinusal y por lo tanto en estos casos tendremos que conjuntar los bordes lo más que podamos y suturar a la vez.

Fractura de la Mandíbula.- es una fractura posible aunque no frecuente (en general es a nivel del tercer molar, donde la fractura se produce y la cuál se debe a la aplicación incorrecta y a las fuerzas exageradas en el acto quirúrgico de la extracción de dicho molar y otras veces a la disminución de la resistencia ósea debida al gran alveolo del molar y al cuál actúa como una causa predisponente para dicha fractura.

Lesión del Seno Maxilar.- durante la extracción de los molares y premolares superiores puede abrirse al piso del antro, y dicha perforación se adquiere en dos formas:

- a) Accidental.
- b) Instrumental.
- c) Por razones anatómicas de vecindad del molar con el piso del seno, al efectuarse la extracción de dicho diente, puede quedar la comunicación, la cuál inmediatamente se advierte, por la mucosa antral presente.

Los instrumentos de exodoncia como cucharillas, elevadores, pueden perforar el piso sinusal y desgarrando la mucosa antral, estableciéndose por este procedimiento dicha comunicación.

En la mayoría de los casos cuando dichas perforaciones obedecen tanto a razones anatómicas o por instrumentos, el coágulo se encarga de realizar o toponear la comunicación, también para proteger dicho coágulo, colocamos una torunda de gasa que nos favorezca la hemóstasis, algunas veces también es aconsejable poner un punto de sutura que acercando los bordes establezca mejores condiciones para la contención del coágulo.

Penetración de una Raíz en el Seno Maxilar.- una raíz de un molar-

superior, al fugarse de su alvéolo o penetrar en el mismo por las manobras que pretenda uno al extraerla, pueden comportarse de dos maneras - en relación con el seno maxilar, ésta penetra en el antro desgarrando la mucosa sinusal y se situa en el piso de la cavidad del mismo seno, - quedando cubierta por la mucosa y sin tener ninguna reacción, otras veces actua como cuerpo extraño con reacciones patológicas en la cuál tenemos que intervenir quirúrgicamente para la extracción de la misma.

Luxación de la Mandíbula.- consiste en la salida del cóndilo de la mandíbula de su cavidad glenóidea, accidente raro que se produce en ocasiones de las extracciones de los molares inferiores, otras veces con abrir simplemente la boca al paciente, puede producirse dicha luxación - que puede ser unilateral o bilateral. La mandíbula puede volver a ser ubicada en su sitio , colocando los dedos pulgares de ambas manos sobre las caras triturantes de los molares inferiores y los dedos restantes - de las mismas manos, sostienen el borde externo e inferior de la mandíbula y se imprimen fuertemente a este hueso tres movimientos, uno hacia abajo, otro hacia atras y por último hacia arriba.

Lesiones de las Partes Blandas.- desgarros de la mucosa gingival, lengua, labios, carrillos que se producen por falta de precaución o actuando con brusquedad por el deslizamiento de los instrumentos de la mano del operador y herir éstas partes blandas y también en los labios - por pellizcamiento de los forceps, así como las comisuras y los tejidos del piso de la boca.

Lesiones de los Troncos Nerviosos.- una extracción dentaria o una mala técnica de anestesia, puede ocasionar una lesión de gravedad variable sobre los troncos nerviosos, estas lesiones pueden radicarse en los nervios dentarios superiores e inferiores, los accidentes más importantes son los que tienen lugar sobre el nervio palatino anterior, dentario inferior y mentoneano.

El traumatismo sobre el tronco nervioso puede consistir en el seccionamiento, aplastando o desgarrando al nervio y estas lesiones se traducen por neuralgias.

Alveolitis.- también llamado alveolo seco y osteitis alveolar, es un estado de desintegración del coagulo, siendo el aspecto del alveolo al principio de un color grisaseo y cambiando continuamente de color, - desprendiendose y dejando al hueso desnudo de tejido de cicatrización,-

no hay supuración, pero si cierta fetidez, hay neuralgia y la cuál persiste durante varios días.

Etiología.- los síntomas suelen comenzar a partir del segundo al tercer día de haberse efectuado el acto quirúrgico y perdurar entre diez y cuarenta días, se afirma el diagnóstico introduciendo una cucharilla en la herida del alveolo, cuando hay alveolo seco se encuentra hueso desnudo, dolor espontaneo y a la vez a la inspección, el cuál puede proyectarse hasta el oído, no siempre se encontrará abierto el alveolo, pues a veces persiste tejido de granulación necrosado (coagulo falso), que aún no ha sido expulsado o puede estar cubierto por un colgajo blanquizco a manera que no se nota, este alveolo seco.

Causas.- la alveolitis se puede originar por diferentes factores, los cuáles pueden ser infección pre-existente al acto quirúrgico, traumatismo del hueso durante la extracción, o sea que se obliteraron al hacer nosotros un raspado en las paredes del hueso porque no hubo sangrado del alveolo, después del acto quirúrgico, y el cuál es una extracción normal no se tiene que hacer ningún raspado para provocar dicho sangrado, pues habra siempre escasa hemorragia como resultado del efecto hemostático del vaso constrictor aplicado en el anestésico local, pero una vez que cesa el efecto de éste, el sangrado aparece fisiológicamente, infección introducida después de la extracción o pérdida del coagulo por los enjuagantes o la succión hecha por el paciente, también se puede presentar aunque no hayan usado las técnicas más impecables, la asepsia y la antisepsia más minuciosa y aún con la destreza y el buen criterio del cirujano dentista. Pero en si se cree que los principales factores del alveolo seco se atribuyen a la desnutrición, por la mala alimentación y a la deficiencia de vitamina C, D, calcio y fosfatos, los cuáles impiden la cicatrización normal y a la calcificación del coagulo que se forma durante el proceso de reparación de la herida ósea.

En general se puede decir que en todo paciente desnutrido (con aparente normalidad orgánica) o que padece alguna enfermedad debilitante es más probable que se presente el alveolo seco.

Tratamiento Local del Alveolo Seco.- (inflamación del hueso alveolar) en éste existe un dolor agudo insoportable y por ésta causa, en primer lugar tendremos que anestésiar el campo herido, una vez teniendo éste anestésiado, con una cucharilla tendremos que retirar el tejido de

granulación, (falso coagulo) las esquirlas y todos los cuerpos extraños existentes sin presionar el fondo del alveolo, una vez retirados todos los cuerpos extraños lavaremos con una solución isotónica salina, ya -- limpio éste haremos un raspado ligero de las paredes del mismo para pro-- ducir en si el sangrado y una vez teniendo éste lavaremos de nuevo nues-- tro alveolo y el cuál lo prolongaremos con algodón o gasa, mientras pre-- paramos un apósito que debemos de introducir en el mismo, este apósito-- es a base de una tira pequeña de gasa en forma de acordeón impregnada de wander pack, ácido de zinc, o alvogil y el cuál se deja por espacio de 24 a 48 horas, el efecto de este medicamento, hara que el dolor que e-- xistía cece, en la siguiente cita que acuda el paciente al consultorio-- este dolor existente ya no lo tendra, pues habra cesado y tendremos que retirar nuestro apósito sin necesidad de anestésiar, como lo hicimos en la primera cita o curación, así sucesivamente tendremos que hacer cura-- ciones por espacios , cada una de ellas de 48 o 72 horas, y a la vez -- siendo retiradas hasta que consigamos nuestro objetivo, que es el teji-- do de cicatrización, pero este tratamiento local lo tendremos que lle-- var a cabo aunado a la acción de antibióticos de anti-inflamación y tam-- bién con analgésicos, por si existiera dolor.

Hemorragias.- es la extravasación de la sangre con todos sus ele-- mentos, a consecuencia de los traumatismos provocados a las paredes de los vasos, a cambios de presión bruscos en vasos de paredes alteradas y modificaciones sanguíneas que causan dicha extravasación. Cuando el va-- so lesionado es de reducido calibre, la hemorragia puede cohibirse ex-- pontaneamente, pero cuando estos son de gruesos calibres o cuando sus -- paredes no sean normales, o la coagulación de la sangre este modificada y alterada, la hemorragia no puede cohibirse expontaneamente y se debe-- de intervenir ya sea para obliterar el vaso lesionado, o para introdu-- cir al organismo a producir la hemostasia (coagulo).

Las causas más comunes de homorragias en exodoncia pueden ser:

- a) Laceración (herir, dañar), del alveolo y tejidos blandos.
- b) Retensión de tejidos granulamatoso existente en el alveolo y el cuál puede ser removido por medio de curetaje.
- c) Suturas demasiado tensas que rompen los bordes de la mucosa o -- que se desprenden rapidamente.
- d) Desintegración del coagulo, debido a una infección.

- e) Traumatismo del alveolo por un curetaje excesivo.
- f) Succión del coagulo por el paciente.
- g) Uso inmoderado de colutorios (enjuages) inmediatos a la extracción.

Las hemorragias pueden ser:

Hemorragia Arterial.- originada por un traumatismo de una arteria y la cuál produce un chorro intermitente de sangre que es de color vino rojo.

Hemorragia Venosa.- la cuál se manifiesta por una salida continua de sangre y es de color rojo obscuro.

Hemorragia Capilar.- la cuál se manifiesta por un escurrimiento de sangre continua y es de color rojo claro.

Hay tres tipos de homorragias:

Hemorragia Mecánica o Primaria.- resulta de la severa acción sobre los vasos de cualquier tamaño o calibre, el número de pequeños vasos involucrados en el trauma operatorio y además la acción de la velocidad de la sangre (venas o arterias) sobre las paredes del vaso involucrado. Algunos de los factores que intervienen para cohibir la hemorragia en los traumatismos de los vasos son: la contracción de las paredes vasculares y la coagulación de la sangre.

Hemorragia Intermedia o Recurrente.- ésta hemorragia ocurre durante las veinticuatro horas siguientes a la extracción. Generalmente el origen de ésta es la modificación de la presión sanguínea, dado que se presenta en el período operatorio un cambio de élla, esto puede deberse al estado de angustia, dolor, lipotimias y difusiones sistemáticas, que ciertos autores llaman estado de semichok y que al recuperarse el paciente tanto la presión arterial y venosa llegan al nivel normal ocasionando un aumento de éllas en el sitio operado y como consecuencia puede presentarse la hemorragia, habiendose presentado la intervención mediante el uso de anestésicos locales, se presenta una vasoconstricción de los tejidos provocados por el estímulo del propio vasoconstrictor del anestésico empleado, y que al cesar ésta acción se presenta un aflujo mayor de sangre en la región intervenida.

Hemorragia Secundaria.- ésta hemorragia puede ocurrir como en el caso anterior, en el período de las veinticuatro horas después de haber efectuado la extracción, es generalmente, el resultado de la extracción

del coagulo, atención domiciliaria adecuada, lavado excesivo de la boca con arrastre y desprendimiento del mismo, dando como resultado infección y hemorragia como consecuencia de esto.

Tratamiento Local.- la hemorragia secundaria es copiosa y la cuál el paciente en su casa, si no la puede cohibir por ningun medio, una vez presentada ésta, se le indicara que acuda a uno para tratarla en primer lugar retiraremos todo el coagulo presente que llena la boca del paciente, para poder examinar el sitio de la hemorragia, se explotara el alveolo y el sitio de la hemorragia se limpiara con torundas de algodón y suero fisiológico , eliminando en si todas las esquirilas presentes, una vez limpio se hara un taponamiento con trozos de gelfoam (gelatina absorbible porosa), o con Oxycal (celulosa oxidada), ya sea humedecida en una solución isotónica (suero fisiológico), o solo la cuál se coloca dentro del alveolo sangrante, protegiendo éste material con un pedazo de gasa o algodón que nos impide que se desaloje este material, el gelfoam forma una malla que obstaculiza la salida de sangre, es insoluble en agua, pero en los tejidos se absorbe en cuatro o seis semanas, sin dejar tejido cicatrizal y sin causar reacción tisular, lo utilizaremos únicamente cuando desiemos cohibir una hemorragia presente, por que a la vez que es un material hemostático adecuado, también lo es en sí un predisponente a la provocación de una alveolitis.

CUIDADOS PRE-OPERATORIOS Y POS-OPERATORIOS

Estos tienen como finalidad evitar síntomas desagradables antes -- y después del acto quirúrgico.

Para ello el dentista y su ayudante deben reflejar en sus mane--- ras y actuación, la seguridad de que nada molesto va a ocurrir, y que-- el paciente no tiene nada que temer.

Las jeringas y otros equipos o instrumentos que puedan inspirar te-- mor, deben mantenerse lejos de la vista.

El sillón debe inclinarse ligeramente, con el sillón en posición - tal que sostenga el peso de la cabeza sin intervención de los músculos - del cuello. La posición uniforme de la cabeza, además de suministrar - comodidad al paciente, facilita al dentista el sentido de dirección y - aumenta la seguridad al efectuar la extracción.

El sillón puede elevarse o bajarse a conveniencia y comodidad del operador.

Debe recordarse siempre la importancia de preparar debidamente a - los pacientes nerviosos y exitados.

Aunque es innecesario medicar a los pacientes en forma rutinaria, - existen casos en que la sedación preoperatoria es de gran valor.

Cuando los pacientes presentan miedo exagerado a las operaciones - dentales, la administración de un barbitúrico de corta duración, o mejor de un atarácico, no solo moderara el temor, sino que facilitara la coo- peración a la tarea del dentista.

En la preparación pre-operatoria del paciente es importante útili- zar farmacos, cuyos efectos cecen antes de que la persona abandone la - consulta o que, de producir efectos secundarios, éstos sean insignifi-- cantes. ,

Hay que recordar que en individuos sensibles, la administración de barbitúricos antes de la anestesia produce a veces síntomas de exita--- ción. .

Debemos tomar las precauciones necesarias cuando existan infeccio- nes orales generalizadas o cualquier tipo de anomalías orgánicas.

Indicaciones Pos-operatorias.

Deberemos eliminar todo lo que pueda obstaculizar la formación del coagulo sanguíneo.

Se regularizaran los bordes alveolares con el fin de que la encia- cubra perfectamente el hueso sin lastimarse.

Se presionaran digitalmente los extremos alveolares para ayudar a que recuperen sus condiciones normales.

Se colocará en el alveolo una gasita esterila que aislara la heri- da y ayudar a que el coagulo sanguineo se vaya integrando.

Dieta exenta de grasas e irritantes, preferiblemente blanda, cuan- do menos tres dias.

Se evitara hacer colutorios por lo menos ocho horas después de la intervencion.

Después de pasado éste tiempo se podran hacer colutorios de agua O xigenada rebajada (dos partes de agua y una parte de agua oxigenada).

Es preferible no tomar leche sola hasta el siguiente día de la in- tervención

Cuando la intervencion ha sido traumática es preferible tener repo- so (relativo), no asolearse.

Según el caso lo requiera, se podran administrar analgésicos, anti- bióticos, antiinflamatorios, relajantes musculares, vitaminas, etc.

FARMACOS

En exodoncia en algunos casos requerimos de los medicamentos, por ejemplo; cuando hay inflamación o infección como medida preventiva y antibioticoterapia, en extracciones múltiples y traumatismo para evitar el dolor, cuando el paciente requiere de una premedicación por presentar alguna alteración orgánica. Los medicamentos y la dosis dependera del criterio del odontologo, según la gravedad del padecimiento.

Analgésicos.- se denominan así a los medicamentos que tienen la -- propiedad de eliminar o disminuir la sensación dolorosa, actuando a nivel central, modificando el umbral del dolor.

Los analgésicos son medicamentos sintéticos y en consecuencia no actuan sobre la causa o etiología de un dolor.

La sensación dolorosa se origina por la estimulación nociva sobre receptores autónomos o terminaciones nerviosas libres.

Los estímulos nocivos pueden ser eléctricos, térmicos, químicos y mecánicos y deben tener determinada intensidad.

CLASIFICACION DE ANALGESICOS.-

Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios.

Derivados del ácido salicílico, que son fundamentalmente acetil salicilico (aspirina), salicilato de sodio, salicilamida.

Derivados de la anilina.- como fenacitina, acetaminofeny acetanilina.

Derivados de la Pirazolona.- (pirrolicos) entre éstos tenemos aminopirina como piramidón, demalgón, dipirona, neomelubrina, colmel, --- etc.

Derivados del ácido cinconinico, tenemos el cincófeno como es el athopan, neosincofeno o nobothopan, oxiquinasa prodolina.

Analgésicos no Piréticos.

Está químicamente relacionados con los narcóticos, como el destropoxifeno (darvon), athoheptazine o zactirin, pentazocine (talwin).

Analgésicos Narcóticos.- como la morfina que se considera el analgesico más potente, son depresores del sistema nervioso central, tienen acción hipótica, no son antipiréticos, alteran la reacción efectiva y - entre otras cosas provocan hábito y adicción.

Pueden provocar la muerte del paciente por depresión del centro -- respiratorio.

Generalmente en odontología hacemos combinaciones del analgésico - para:

Buscar sinergia ya sea por sumación y potenciación de los efectos.

Agregar otras propiedades al analgésico y disminuir la toxicidad - individual de cada uno de los analgésicos que forman la combinación.

Por ejemplo: combinamos analgésico con antiespasmódico, analgésico con relajante muscular, analgésico con hipnótico etc.

ANTIMICROBIANOS

Inhiben la reproducción bacteriana, se utiliza en el tratamiento -- de enfermedades e infecciones ocasionadas por gérmenes patógenos.

Los antimicrobianos son drogas quimioterapicas y comprenden a los antibióticos y quimioterapicos, (cloranfenicol, sulfas, etc.).

Los antimicrobianos fundamentalmente actuan produciendo bacterios tasis, es aquel que inhibe el crecimiento e impide que se reproduzcan - determinado germen patógeno y bacteriólisis que ocasiona destrucción o muerte del germen infectante.

Los antimicrobianos cuando se utilizan por períodos prolongados y dosis bajas producen que se desarrolle resistencia en los gérmenes in--fectantes.

Antibióticos.- Penicilina, se denomina así a los medicamentos que derivan del ácido penicílico, sintetizadas del penicilium notatum, Alejandro Flemin.

Actividad en la pared celular., penicilinas naturales como g,k,x,- f, o y todos los derivados de la dicloxacilina, de espectro estrecho, ú tiles en el germen gran positivos, muy activas, selectivas para el es--treptococo, destruyen estafilococos no productores de penicilinas, -- contra neisserias, clostridium, puede ser útil al antrax selectivo, contra los treponemas, suele actuar contra los actinimices o actinomices--o actinomicetos, se degrada en medio ácido, por lo que no se administra por vía oral, actúan en el citoplasma de la bacteria, espectro más am--plio muy activa penicilina natural como la bacitracina, nistatina, anfoteracina, polimixina, etc.

Actúan en la membrana del núcleo, penicilinas resistentes a la penicilinasasa, penicilinas específicas contra el estafilococo dorado, como el clorafenicol, tetraciclinas, macrólidos, nafcilina, oxacilina, etc.

Interfiriendo en los acs. nucleicos, como las sulfonamidas, nitrofuranos, ac. nalidixico, etc.

POSOLOGIA.- Adulto 50 mgs. X Kg. de peso X 24 Horas.

Niños 30 mgs. X Kg. de peso X 24 Horas.

Via oral, intramuscular y parenteral, endovenosa. Según el padecimiento y el criterio del cirujano dentista.

ANTI-INFLAMATORIOS

Que contra resta la inflamación (que es la respuesta de una región del organismo a un estímulo que desencadena una serie de factores que integran un fenómeno conocido como inflamación.

Esa serie de factores en una región serian:

Vasodilatación Arteriolar.

Aumento de la permeabilidad capilar.

Aumento en la célula Polimorfonucleares.

Los Signos Clínicos son:

Calor (aumento hemático de la región)

Rubor (hiperemia, aumento en la capilaridad)

Tumor (relación con el aumento de líquidos)

Dolor (sensibilidad de la región, dolor por las terminaciones nerviosas de los tejidos inflamados)

Pérdida de la Función (mecanismos de disminución de la función)

Etiología.- procesos infecciosos y traumáticos, en el organismo los anti-inflamatorios frenan el proceso inflamatorio y da regeneración tisular en algunos casos.

Entre éstas tenemos las enzimas proteolíticas, como el pangenésimo. También encontramos la combinación de enzimas y antibiótico, como peniciclina, tripsina y quimiotripsina.

Las enzimas proteolíticas lisan las proteínas.

Los anti-inflamatorios derivados de la cortizona, como son los ---- esteroides, se utilizan generalmente en procesos inflamatorios muy dolorosos o extensos.

Como ejemplo de los anti-inflamatorios más utilizados en odontología tenemos:

DOLO-TANDERIL.- Antitérmico, analgésico, anti-inflamatorio, no narcótico, solución práctica de la fiebre, el dolor y la inflamación triada sintomática que siempre acompaña a los procesos infecciosos agudos.

Contra-indicaciones. Úlcera gastrointestinal, leucopenia, diátesis hemorrágicas, hipersensibilidad a los derivados pirazólicos y el paracetamol. También en enfermos cardiacos, renales, hepaticos graves.

Posología.- Debe administrarse durante o después de los alimentos.

Adultos 4 ó 6 cápsulas o bien dos o tres supositorios al día.

Niños de 2 años en adelante de 1 a 3 supositorias al día.

NAPLON.- Antiflogístico, analgésico, la Asociación de un anti-inflamatorio con un analgésico de rápida acción constituye la terapéutica adecuada, que combate simultaneamente la inflamación y el dolor.

Indicada en Odontostomatología: para odontalgias, flemones, abscesos, pericoronitis, extracciones y cirugía odontomaxilar.

Contra indicaciones.- se aconseja no prescribir naplon en pacientes con ulcus gastroduodenal, cardiacos descompensados, hipertensos, nefropatias y hepáticos graves.

Posología.- Cápsulas Adultos, dosis media, 3 cápsulas diarias.

Niños, de una a dos cápsulas al día.

Supositorios infantil, a partir de un año, de uno a -- dos supositorias diarios.

BIBLIOGRAFIA

- ANATOMIA HUMANA. M. Prives, N. Lisenkov, V. Bushkovich.
Tomo II Angiología, Neurología, Estesiología. Segunda Edición y Tomo I
Editorial Mir. Moscú.
- ANATOMIA HUMANA Kiroz.
- MEDICINA INTERNA Harrison. Wintrobe. Thorn, Adama. Bennett
Braunwald. Peters Dorf. 4a. Edición Tomo I
La Prensa Médica Mexicana.
- CIRUJIA BUCAL Archer. Editorial Mundi.
- PATOLOGIA BUCAL S.N. Bhaskar. Guillermo A. Ries Centeno
Profesor titular consulto de la facultad de odontología. Buenos Aires. Miembro de número de la academia. Nacional de medicina.
Tercera Edición. El Ateneo. Buenos Aires
Lima, Río de Janeiro, Caracas, México.
- EXODONCIA CON BOTADORES Ernesto J. Pastori. Editorial Mundi
S.A. I.C. y R. Paraguay 2100, Buenos Aires, Argentina.

BASES FARMACO LOGICAS DE LA

TERAPEUTICA

Louis S. Goodman Alfred Gilman. Edi-
torial Interamericana.

DICCIONARIO TERMINOLOGICO

DE CIENCIAS MEDICAS

Undecima Edición Salvat Edeim, S.A.
Barcelona, Madrid, Buenos Aires.

SALUD Y ENFERMEDAD

Hernán San Martín. Ecología Humana.
Medicina Preventiva y Social
3a. Edición. La Prensa Médica
Mexicana, México.

TERMINOLOGIA ANATOMICA

Apuntes sobre anatomía y métodos
sobre anestesia de Basilea.

CATALOGO DE INSTRUMENTOS

QUIRURGICOS

S.S. WHITE.

INFORMACION DE REVISTAS DE LA ASOCIACION DENTAL MEXICANA
Y DEL ODONTOLOGO MODERNO EDICIONES DE 1981 OROSPHAERA -
SERPENTINA.