11236
205
5

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES
FACULTAD DE MEDICINA
Hospital General "Lic. Adolfo López Mateos"
ISSSTE.
Servicio Otorrinolaringología

**ANALISIS RETROSPECTIVO DE CANCER LARINGEO EN EL
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL
GENERAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS
de abril de 1971 a octubre de 1985**

TESIS DE POSTGRADO
Que para obtener el título de
Médico Especialista en Otorrinolaringología
P R E S E N T A:
DRA. MINERVA BARRAGAN CAÑEDO

MEXICO, D. F.

**TESIS CON
SALA DE ORIGEN**

1986

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CANCER DE LARINGE

INTRODUCCION.-

El presente estudio es un análisis de los casos de Cáncer de Laringe tratados en el Hospital General "Lic. Adolfo López Mateos, I.S.S.S.T.E. en el período comprendido de Abril de 1971 a Octubre de 1985. Veinte casos en total. Con el fin de hacer un estudio comparativo en cuanto a lo escrito en la Literatura Universal.

El cáncer de Laringe representa el 2 al 5% de todas las neoplasias malignas del organismo, y el 28% de los carcinomas de las vías aerodigestivas altas. En los últimos decenios ha aumentado un poco la incidencia en particular en las regiones más industrializadas. Predomina en los varones (7:1). El 80% de los cánceres de Laringe ocurren en las décadas quinta, sexta y séptima de la vida; más o menos el 40% se presentan en la sexta década, la edad media es de 59 años. La gama general de incidencias y las localizaciones son: Glóticas, 50 al 60%, Supraglóticas, 20 a 30%. Los tumores de la Subglotis son raros (1%) pero los Glóticos propagados a la Subglotis son más comunes -- 22%.

El carcinoma epidermoide comprende el 97 al 99% de todas las neoplasias malignas de Laringe.

Hasta ahora no se ha detectado con seguridad ningún factor en particular que produzca cáncer laríngeo en el ser humano. En los pacientes con cánceres de Laringe y Laringofaringe, empero son frecuentes el tabaquismo y el abuso del alcohol.

La clasificación más actualizada y que más se acepta para el carcinoma de Laringe es la que propuso la Comisión Conjunta -- Norteamericana para Etapas del Cáncer y Comunicación de Resultados finales que divide a la Laringe en tres regiones primarias: Supraglótica, Glótica y Subglótica.

CLASIFICACION TNM DEL CANCER DE LARINGE*

TUMOR PRIMARIO (T)

SUPRAGLOTIS	T _x	TUMOR QUE NO SE PUEDE ESTIMAR CON NINGUNA REGLA SIN SIGNOS DE TUMOR PRIMARIO
	T ₀	
	TIS	CARCINOMA IN SITU
	T ₁	TUMOR CONFINADO A LA REGION ORIGINARIA, CON MOVILIDAD NORMAL
	T ₂	TUMOR QUE TOMA LA SUPRAGLOTIS ADYACENTE O GLOTIS, SIN FIJACION
GLOTIS	T ₃	TUMOR LIMITADO A LA LARINGE, CON FIJACION Y/O EXTENSION AL AREA POSCRICOIDEA, PARED MEDIAL DEL SENO PIRIFORME O ESPACIO PREEPIGLOTICO
	T ₄	TUMOR MASIVO QUE SE PROPAGA MAS ALLA DE LA LARINGE, PARA TOMAR LA OROFARINGE, PARTES BLANDAS DEL CUELLO O DESTRUIR EL CARTILAGO TIROIDES
	TIS	CARCINOMA IN SITU
	T ₁	TUMOR CONFINADO A LAS CUERDAS VOCALES CON MOVILIDAD NORMAL (INCLUSO COMPROMISO DE LA COMISURA ANTERIOR O POSTERIOR)
	T ₂	PROPAGACION SUPRAGLOTICA Y/O SUBGLOTICA DEL TUMOR, CON MOVILIDAD NORMAL O ALTERADA DE LAS CUERDAS
SUBGLOTIS	T ₃	TUMOR CONFINADO A LA LARINGE, JUNTO CON FIJACION DE LAS CUERDAS
	T ₄	TUMOR MASIVO CON DESTRUCCION DEL CARTILAGO TIROIDES Y/O EXTENSION MAS ALLA DE LOS CONFINES DE LA LARINGE
	TIS	CARCINOMA IN SITU
	T ₁	TUMOR CONFINADO A LA REGION SUBGLOTICA
	T ₂	EXTENSION TUMORAL A LAS CUERDAS VOCALES CON MOVILIDAD CORDAL NORMAL O ALTERADA
	T ₃	TUMOR CONFINADO A LA LARINGE CON FIJACION CORDAL
	T ₄	TUMOR MASIVO CON DESTRUCCION DE CARTILAGO O PROPAGACION MAS ALLA DE LOS CONFINES DE LA LARINGE O AMBAS COSAS

CLASIFICACION TNM DEL CANCER DE LARINGE *

COMPROMISO GANGLIONAR (N)

N_x	NO SE PUEDEN ESTIMAR LOS GANGLIOS
N₀	NO HAY GANGLIOS CLINICAMENTE POSITIVOS
N₁	UN SOLO GANGLIO HOMOLATERAL CLINICAMENTE POSITIVO DE MENOS DE 3 CM DE DIAMETRO
N₂	UN SOLO GANGLIO HOMOLATERAL CLINICAMENTE POSITIVO DE 3 A 6 CM DE DIAMETRO O MÚLTIPLES GANGLIOS CLINICAMENTE POSITIVOS EN EL MISMO LADO, PERO NINGUNO DE MÁS DE 6 CM DE DIAMETRO
N_{2a}	UN SOLO GANGLIO HOMOLATERAL CLINICAMENTE POSITIVO DE 3 A 6 CM DE DIAMETRO
N_{2b}	MÚLTIPLES GANGLIOS HOMOLATERALES CLINICAMENTE POSITIVOS, PERO NINGUNO DE MÁS DE 6 CM DE DIAMETRO
N₃	GANGLIOS HOMOLATERALES MASIVOS, GANGLIOS BILATERALES O GANGLIOS CONTRALATERALES
N_{3a}	GANGLIOS HOMOLATERALES CLINICAMENTE POSITIVOS PERO NINGUNO MAYOR DE 6 CM DE DIAMETRO
N_{3b}	GANGLIOS BILATERALES CLINICAMENTE POSITIVOS (EN ESTA SITUACION SE DEBE ESTABLECER LA ETAPA POR SEPARADO EN CADA LADO DEL CUELLO, ES DECIR: N _{3b} , DERECHA N _{2a} , IZQUIERDA N ₁)
N_{3c}	GANGLIOS CLINICAMENTE POSITIVOS CONTRALATERALES SOLAMENTE

METASTASIS A DISTANCIA (M)

M_x	NO SE ESTIMARON
M₀	NO SE CONOCEN METASTASIS A DISTANCIA
M₁	PRESENCIA DE METASTASIS A DISTANCIA

CLASIFICACION TNM DEL CANCER DE LARINGE *

AGRUPAMIENTO POR ETAPAS

ETAPA I	T ₁ N ₀ M ₀
ETAPA II	T ₂ N ₀ M ₀
ETAPA III	T ₃ N ₀ M ₀
	T ₁ o T ₂ o T ₃ , N ₁ , M ₀
ETAPA IV	T ₄ N ₀ o N ₁ M ₀
	CUALQUIER T. N ₂ o N ₃ , M ₀
	CUALQUIER T. CUALQUIER N, M ₁
<i>TUMOR RESIDUAL (R)</i>	
R 0	SIN TUMOR RESIDUAL
R 1	TUMOR RESIDUAL MICROSCOPICO
R 2	TUMOR RESIDUAL MACROSCOPICO

* AMERICAN JOINT COMMITTEE FOR CANCER STAGING AND END-RESULTS REPORTING: MANUAL FOR STAGING OF CANCER, 1977.

La clasificación ganglionar (N) se basa en la localización y el tamaño de los ganglios linfáticos cervicales. Las metástasis a distancia (M) se clasifican por la ausencia o presencia de metástasis y su sitio específico.

Para hacer el tratamiento correcto del Cáncer Laríngeo es necesario conocer el comportamiento biológico general de las neoplasias primarias. En comparación con los cánceres de la Laringofaringe, los de la Laringe son de pronóstico más favorable, porque suelen ser más diferenciados, se mantienen localizados más tiempo y es raro que den metástasis en las etapas iniciales. Los cánceres Laringofaríngeos se caracterizan por su menor diferenciación celular, su gran propagación en la submucosa, su mayor incidencia de metástasis cervicales y su baja tasa de sobrevida. Los factores más importantes que influyen sobre el pronóstico son: 1) sitio de la lesión primaria 2) tamaño de la lesión 3) diferenciación celular y 4) presencia o no de metástasis cervicales.

REGION GLOTICA.-

Los de la región glótica son los tumores Laríngeos más comunes. Son limitados a las cuerdas vocales verdaderas. Pueden estar confinados a la porción membranosa de una cuerda (T1) o pueden extenderse hacia la comisura anterior, el aritenoides, la cuerda opuesta, o hasta 1 cm en dirección subglótica (T2).

El tercio anterior de la Glotis es la localización más común. La bilateralidad cuando esta presente, es por vía de la comisura anterior.

Los tumores son usualmente bien diferenciados y tienden a permanecer localizados debido a la pared cartilaginosa vecina y a la escasez de linfáticos. No está indicada la disección ganglionar profiláctica.

Es probable que las lesiones T1 y T2 se puedan controlar con la misma eficacia con cirugía o radioterapia, pero la ventaja de esta última es que altera poco el timbre de la voz. En las lesiones T1 la irradiación rinde una tasa de curaciones iniciales del 85 al 95%. El 80 al 100% de los fracasos de la irradiación pueden curar con cirugía. En las lesiones glóticas T2 las tasas de curaciones de la radioterapia inicial es del 60 al 80% la cirugía de los fracasos produce una tasa de curación del 65 al 100%. En general las lesiones T3 y T4 requieren Laringectomía total. Si se palpan ganglios en cuello también se debe hacer una disección radical de cuello. En las lesiones T3 más extensas sin ganglios cervicales produjo tasas de curaciones de alrededor del 70%. Las lesiones T3 N1 tienen una tasa de curaciones del 60%. Las lesiones T4 N0 tratadas con Laringectomía total tienen tasas de curaciones del 50%.

REGION SUPRAGLOTICA.-

En vista de que las lesiones supraglóticas tienen una incidencia tan grande de metástasis a los ganglios cervicales (55%) en el plan terapéutico se debe incluir la lesión primaria y las metástasis. En las lesiones T1 y T2 más pequeñas la radioterapia completa es tan eficaz como la laringectomía supraglótica. También se puede hacer radioterapia en el preoperatorio y en el posoperatorio. En las lesiones T3 y T4 más grandes, se puede hacer radioterapia completa y reservar la cirugía para los casos que no responden. O radioterapia preoperatoria, Laringectomía total y si existen ganglios palpables, disección de cuello. En las lesiones T1 y T2 sin ganglios la sobrevida es esta en el 80%, y las de T3 y T4 del 60 al 70%.

REGION SUBGLOTICA.-

En esta categoría se incluyen los cánceres que comprometen la cuerda vocal verdadera con una extensión subglótica de más de

1 cm, así como los tumores que están completamente confinados al área subglótica. Debido a la frecuente extensión a la tráquea, esta estructura debe ser resecada lo más bajo posible. - De los cánceres infraglóticos estudiados por McGavran y cols, - el 19% se asociaba con metástasis ganglionares, todas ellas no detectables clínicamente.

La localización más común de las metástasis ganglionares son - las regionales, seguidos por los pulmones. El compromiso de la glándula tiroides y de la vena yugular es usualmente el resultado de la extensión directa, esta última se ve solo en presencia de un extenso compromiso ganglionar y se acompaña de una - probabilidad alta de diseminación sistémica.

MATERIAL Y METODOS.-

Para llevar a cabo éste estudio fué revisado el siguiente material:

- 1.- Se revisaron 61,559 reportes de estudios histopatológicos del Hospital Gral. "Lic Adolfo López Mateos" ISSSTE comprendidos en el período de Abril de 1971 a Octubre de 1985, para detección de los pacientes.
- 2.- Del departamento de Estadística del hospital se tomó el dato de Consultas de primera vez en el mismo período que correspondió a 14,407, así como cirugías en nuestra especialidad realizadas durante el mismo período de tiempo con un total de 8269
- 3.- Se revisaron los expedientes clínicos de los pacientes con el diagnóstico de Cáncer de Laringe, obteniéndose de estos los siguientes datos: Edad, sexo, ocupación, antecedentes de tabaquismo, abuso de alcohol, Sintomatología como disfonía, disfagia, odinofagia, tos, expectoración, hemoptisis, disnea, dolor localizado a cuello, sensación de cuerpo extraño en faringe, astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso. Signos como tumoración (localización de la misma), movilidad de cuerdas vocales, aspecto de epiglotis, mucosa faríngea, tumoraciones en cuello, adenomegalias palpables en cuello, datos radiográficos, diagnóstico histopatológico, estadio clínico del padecimiento, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, evolución del padecimiento, estado actual del paciente.
- 4.- Se tomo el dato del número de casos y tipo histopatológico de lesiones benignas en Laringe para hacer una correlación en cuanto a la frecuencia de las mismas y del Cáncer de Laringe
- 5.- Se obtuvo un total de 20 casos, incluyendose en el estudio dos pacientes a los cuales se detecto cáncer por biopsia pero sin contar con información clínica.

RESULTADOS.-

De los 20 casos con Diagnóstico de Cáncer de Laringe, 18 correspondieron a pacientes del sexo masculino y 2 al sexo femenino - En una relación de 9:1.

El rango de edad fué de los 35 años para el paciente más joven a los 84 años de edad. Con un promedio de edad de 66.31 Presentandose la mayor incidencia del cáncer en la séptima y octava década de la vida.

El antecedente de tabaquismo fué : en 15 pacientes fuertemente positivo, moderadamente positivo en 1 paciente, Negado en 1 de los pacientes, en 3 pacientes no se contó con datos clínicos.

El consumo de alcohol fué: en 9 de los pacientes fuertemente-- positivo, moderado en 2, ocasional en 2, negado en 4 pacientes en 3 de los pacientes no se contó con la información clínica.

En cuanto a la sintomatología presentada, se observó que el -- síntoma más frecuente fué disfonía en 15 de los pacientes 75% siguiendole en frecuencia disfagia en 9 pacientes 45%, tos en 8 pacientes, 40%, odinofagia en 7 pacientes 35%, disnea en 6 pacientes 30%, sensación de cuerpo extraño en faringe en 3 pacientes 15%, expectoración hemoptoica y dolor localizado en -- cuello en 2 de los pacientes 10%.

Siendo los síntomas más frecuentes disfonía y disfagia con un tiempo de evolución mínimo de 3 meses y máximo de 24 meses.

En estos pacientes se realizaron un total de 23 biopsias haciendose una nueva toma en tres de los pacientes ya que clinicamente existía tumor. En uno de los pacientes, se decidió conducta quirúrgica con biopsia negativa, haciendose la comprobación -- histopatológica posoperatoria. 2 de las biopsias fueron en pacientes Laringectomizados y con reactivación del cáncer uno al año de la cirugía y otro 7 años después.

El diagnóstico histopatológico fué de carcinoma epidermoide bi en diferenciado en 6 pacientes, medianamente diferenciado en -

TOTAL DE PACIENTES CON CANCER LARINGEO POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES

SEXO	No. PACIENTES
MASCULINO	18
FEMENINO	2
TOTAL	20

TOTAL: 19

$\bar{X}$: 66.31

CANCER LARINGEO

		No. PACIENTES
TABAQUISMO	NEGATIVO	1 (*)
	POSITIVO	1 (*)
	FUERTEMENTE POSITIVO	15
	NO SE CUENTA CON DATOS CLINICOS	3
T O T A L		20

(*) SEXO FEMENINO

CANCER LARINGEO

		No. PACIENTES
CONSUMO DE ALCOHOL	NEGATIVO	4 (*)
	OCASIONAL	2
	POSITIVO	2
	FUERTEMENTE POSITIVO	9
	NO SE CUENTA CON DATOS CLINICOS	3
TOTAL		20

(*) 2 DEL SEXO FEMENINO

CANCER LARINGEO

SINTOMAS	Nº PACIENTES ^①	PORCENTAJE
DISFONIA	15	75%
DISFAGIA	9	45%
ODINOFAGIA	7	35%
TOS	8	40%
SENSACION DE CUERPO EXTRAÑO	3	15%
DISNEA	6	30%
EXPECTORACION HEMOPTOICA	2	10%
DOLOR LOCALIZADO A CUELLO	2	10%

① DE UN TOTAL DE 20 PACIENTES.

— EN 4 PACIENTES NO SE CONTO CON INFORMACION CLINICA DEL CUADRO DE PRESENTACION.

12 pacientes, carcinoma adenoescamoso en 1 paciente, e indiferenciado en 1 paciente.

Las Etapas clínicas del cáncer (según American Joint Committee 1977) fué el siguiente: Estadio I, un paciente, Estadio III, 13 pacientes, Estadio IV, 4 pacientes.

El tratamiento según las etapas fué el siguiente:

Estadio I Laringectomía total, Estadio III Laringectomía total 2 pacientes, Radioterapia 3 pacientes, Laringectomía total más cirugía radical de cuello, 2 pacientes, Laringectomía total — más Radioterapia, 3 pacientes, Laringectomía total, radical de cuello más Radioterapia en 1 paciente. Estadio IV Laringectomía total 1 paciente, Radioterapia 2 pacientes, Laringectomía total radical de cuello más Radioterapia 1 paciente.

La evolución de los pacientes no se siguió, ya que 9 de ellos se eniaron a otra unidad hospitalaria a Radioterapia, 5 pacientes no continúa evolución clínica en el expediente, en 2 pa -- cientes no se contó con información clínica. Un paciente fué - visto recientemente en Medicina Interna 7 meses después de habersele realizado Laringectomía total y cirugía radical de cuello, por presentar Padecimiento vascular cerebral de tipo hemorrágico, al parecer sin relación con el padecimiento neoplásico. Dos pacientes fallecieron uno 7 años después de Laringectomía total a causa de reactivación de Cáncer Laríngeo, el otro-- paciente falleció por Padecimiento vascular cerebral 4 años después del tratamiento (Laringectomía total), sin haber presentado durante ese tiempo actividad tumoral. Un paciente estuvo - en control durante 3 años, sin haber presentado datos de actividad tumoral.

Del total de consultas de primera vez durante el período mencionado 14,407 , se detectaron 20 cánceres de Laringe lo que nos indica que de cada 723 consultas de primera vez un paciente - presento Cáncer Laríngeo.

CANCER LARINGEO

DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO	No. PACIENTES
CARCINOMA EPIDERMOIDE BIEN DIFERENCIADO	6
CARCINOMA EPIDERMOIDE MEDIANAMENTE DIFERENCIADO	12
CARCINOMA ADENOESCAMOSO MEDIANAMENTE DIFERENCIADO	1
CARCINOMA INDIFERENCIADO	1
TOTAL	20

CANCER LARINGEO

ETAPAS CLINICAS	No. PACIENTES
ESTADIO I	1
ESTADIO II	0
ESTADIO III	13
ESTADIO IV	4
TOTAL	18

* EN 2 PACIENTES NO SE CUENTA
CON INFORMACION CLINICA.

DISCUSION Y COMENTARIOS.-

Mucho se escribe en la Literatura médica en cuanto al Cáncer de Laringe sobre todo referente al manejo según Etapa clínica y los resultados obtenidos con tal o cual modalidad terapéutica.

La inquietud que nos llevo a realizar este análisis fué primero que no se había realizado durante los 14 años del vida del hospital, así como observar la frecuencia de presentación del Cáncer de Laringe, analizando cada uno de los parámetros ya mencionados anteriormente.

Se obtuvieron cifras similares a otras series en cuanto a edad de presentación, sexo, antecedente de tabaquismo, abuso de alcohol, sintomatología más frecuente, grado de diferenciación histológica de la neoplasia, Etapa clínica.

Nos llamó la atención lo avanzado del padecimiento al acudir a la consulta. Si tomamos en cuenta que siempre que existe disfonía de más de 2 semanas de duración en los grupos de edad más afectados con antecedentes de tabaquismo y abuso de alcohol. En nuestra población el tiempo mínimo de evolución de los síntomas fué de 3 meses y el máximo de 24 meses. Algunos de estos pacientes fueron visto durante un tiempo en consulta general, siendo canalizados cuando había avanzado todavía más el padecimiento. Esto nos debe hacer pensar en realizar un diagnóstico más temprano del padecimiento.

La baja frecuencia de presentación del Cáncer de Laringe en nuestro hospital se puede explicar que es debido a que los pacientes fueron detectados a través de los reportes histopatológicos del Archivo de Patología. Y por años no se contó con los medios necesarios para toma de biopsias. Por lo cual los pacientes detectados por medios clínicos (aprox. el 80% de los casos se detectan por Laringoscopia indirecta), se ca-

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA UNIDAD HOSPITALARIA

nalizaron al Servicio de Oncología de otra Unidad hospitalaria.

Esto mismo se podría argumentar, en cuanto al tratamiento de los pacientes y el control de la evolución. Ya que varios de los pacientes son enviados a recibir Radioterapia a otra Unidad no siendo remitidos nuevamente a esta unidad.

CONCLUSIONES.-

El Cáncer de Laringe predomina en el sexo masculino en una relación de 9:1 respecto al sexo femenino

Las décadas más afectadas son la sexta, séptima y octava de la vida, aunque se presentaron casos desde la cuarta a la novena década.

No se ha detectado con seguridad ningún factor que produzca Cáncer de Laringe sin embargo es frecuente su asociación con tabaquismo y abuso de alcohol.

Los síntomas más frecuentes de presentación fueron en orden de frecuencia disfonía, disfagia, tos, odinofagia, disnea, sensación de cuerpo extraño.

El tiempo de evolución de los síntomas más constantes como disfonía y disfagia fué de los 3 a los 24 meses.

El carcinoma epidermoide fué practicamente el 100% de la serie con una variante de Adenoescamoso. La diferenciación histopatológica fué de Carcinoma epidermoide bien diferenciado en 33%, Medianamente diferenciado en 66%, Indiferenciado en 5% y Adenoescamoso en 5% restante.

Las Etapas clínicas de los casos de esta serie fué la siguiente. Estadio I, 1 paciente, Estadio III, 13 pacientes, Estadio IV, 4 pacientes.

En cuanto a la eficacia del tratamiento impartido no fué realmente valorado en esta serie ya que la mayoría de los pacientes son enviados a otra unidad hospitalaria a recibir Radioterapia, ya que no se cuenta con este servicio en el hospital.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Paparella-Shumrick, Otorrinolaringología
Tomo 3 Page 2491 a 2525
- 2.- Vincent T Devita ' Principles and Practice of Oncology
Page 348- 358
- 3.- Ackerman L.V. Ropai J
Surgical Pathology Page 231-235
- 4.- Bonnadonna Manual de Oncología
Page. 493-498
- 5.- William S. MacComb MD
Cancer of the Larynx.
Cancer February de 1966 pag 149 - 156
- 6.- Harold R.C. Pillsbury MD, John A. Kirchner
Clinical vs Histopathologic Staging in Laryngeal Cancer
Arch Otolaryngol Vol 105 March 1979 pag 157- 159
- 7.- A.J. Sheehan and H.J Shaw
Total Laryngectomy for squamous carcinoma of the glottis
The Journal of Laryngology and Otology
May 1979 Vol 93 pag 461- 475
- 8.- Karin Helweg-Larsen
Acta Path microbiol scand Sect A 86 1978 pag 499-504
- 9.- J. Leroux-Robert MD
Panel Discussion on Glottic tumors. A Statistical Study of
620 Laryngeal Carcinomas of the Glottic Region Personally
Operated Upon more than five years Ago
The Laryngoscope June 15 1974 pag 1441- 1452
- 10.- Bharat Mittal MD, James E Marks
Transglottic Carcinoma
Cancer 53 1984 page 151-161
- 11.- John A Kirchner Md
One Hundred Laryngeal Cancers Studied by serial section
Page 689-709
- 12.- Jeanne M Quivey MD, Robert J. Woodhouse MD
Treatment of Carcinoma of the vocal cord A review of 20 y
years experience.
The Laryngoscope 91 July 1981 pag1155-1162

- 13.- Donald G Sessions Md Joseph H Ogura MD
Carcinoma of the subglottic area
Laryngoscope September 1975 pag 1417-1433
- 14.- Therapeutic prospects in cancer of the larynx
A Ferlito , A Pederzini an M Rossi
The Journal of Laryngology and Otology
April 1980 Vol 94 pag 405-410