


# Universidad Nacional Autónoma de México



## Instituto Mexicano del Seguro Social

**Frecuencia de la Dispareunia y Disminución de la Líbido con el Uso del Dispositivo Intrauterino**



**T E S I S**

PARA OBTENER LA ESPECIALIDAD EN

**MEDICINA FAMILIAR**

P R E S E N T A

### Dra. Anavel Esvia Canel Méndez

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 1988

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

UNAM



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

# I N D I C E

RESUMEN.....	1
INTRODUCCION.....	2
MATERIAL Y METODOS.....	4
RESULTADOS.....	5
DISCUSION.....	6
CONCLUSIONES.....	7
BIBLIOGRAFIA.....	8

## R E S U M E N

Se estudiaron 50 pacientes con dispositivo intrauterino ( T de cobre), de las cuales el 76 % presentó algún tipo de alteración de la sexualidad (disminución de la libido y dispareunia), encontrándose que del 100 % de los casos el 39.50 % fueron por dispareunia, 21 % de disminución de la libido y - - 39.50 % con asociación de las dos entidades buscadas.

I N T R O D U C C I O N

Es bién conocida la importancia que en la vida del ser humano tiene la sexualidad por lo que no deja de ser extraña la falta de información acerca de la repercusión que sobre ésta tiene el uso generalizado de un anticonceptivo como es el DIU (1).- Está bien probado en cambio que el uso de anticonceptivos hormonales orales como método de planificación familiar provoca franca disminución de la libido así como dispareunia importante sin que se halle lo grado aclarar hasta el momento, si la causa de dichos fenómenos es hormonal o emocional o bién lo que es más probable la combinación de ambos factores ( 2)

A pesar de la escasa investigación en este campo (1) haciendo la correlación entre la observación clínica con la bibliografía consultada, encontramos evidente asociación entre el uso de anti - conceptivos orales con la disminución de la libido y la dispareunia no encontramos sin embargo en la literatura a nuestro alcance ésta asociación con respecto al DIU (2). Considerando que los hallazgos atribuidos a los hormonales orales podrían estar relacionados más que con la acción farmacológica con los efectos psicológicos derivados de la propia idiosincracia de las usuarias, es posible que en lo referente al uso de DIU se den las mismas alteraciones de la - -

sexualidad. Por lo anterior el objetivo del presente trabajo -  
fue determinar en mujeres de 20 a 35 años de edad, usuarias de  
dispositivo intrauterino ( DIU ) por un lapso no menor de 3 --  
meses, la frecuencia de alteraciones del tipo de la disminu -  
ción de la libido y la dispareunia.

## M A T E R I A L   Y   M E T O D O S

Se estudiaron durante dos meses a 50 mujeres entre -  
20 y 35 años de edad, con cualquier tipo de dispositivo intrau-  
terino que tuvieran no menos de 3 meses de aplicado, que acu -  
dieran al departamento de planificación familiar del Hospital -  
General de zona II con medicina familiar del Instituto Mexicano  
del Seguro Social, excluyéndose a las pacientes que curaban --  
con cualquier tipo de enfermedad inflamatoria aguda o crónica,  
local y pélvica, que tuvieran más de 3 meses de iniciada vida -  
sexual activa, sin antecedentes psiquiátricos, realizándoles --  
exploración ginecológica y posteriormente en base a ésta selec-  
ción se les aplicó un cuestionario buscando específicamente --  
dispareunia y/o disminución de la libido.

R E S U L T A D O S

De las 50 mujeres/caso estudiadas, se encontraron que el - 39.50 % cursaban con dispareunia, 21 % con disminución de la libido y 39.50 % asociadas las dos alteraciones, no encontrándose --- alteración alguna en el 24 % de ellas.

CUADRO 1

PACIENTES CON ALTERACION DE LA SEXUALIDAD

ALT.	No.PACIENTES	%
Dispareunia exclusivamente.	15	39.50
Disminución de libido exclusivamente.	8	21.00
Dispareunia + disminución de libido.	15	39.50
TOTAL:	38	100.00

CUADRO 2

TOTAL DE CASOS, CON Y SIN ALTERACIONES DE LA SEXUALIDAD.

	No.PACIENTES	%
Con alteración de la sexualidad.	38	76
Sin alteración de la sexualidad.	12	24
TOTAL:	50	100



## D I S C U S I O N

El resultado de éste trabajo fué que, al igual que los hormonales orales como método anticonceptivo; el DIU provoca también alteraciones de la sexualidad del tipo de dispareunia y disminución de la libido, encontrando que de el 100 % de casos estudiados el 24 % no reportaron alteración y el 76 % de los pacientes que presentaron alteraciones el 39.50 % tuvieron dispareunia, 21 % disminución de la libido y 39.50 % asociadas las dos alteraciones por lo que corroboramos con esto expuesto en la hipótesis. En vista que en nuestro trabajo estudiamos a las pacientes independientemente del tipo de dispositivo; suponemos pueda existir una variante en cuanto a éstos resultados encontrados de acuerdo al tipo de dispositivo que la paciente porte.

C O N C L U S I O N E S

Encontramos que el 76% de las pacientes presentaron --  
algún tipo de alteración de la sexualidad estudiadas, sin embargo  
el trabajo no es concluyente por ser una muestra pequeña, debien-  
do continuarse el estudio con muestras mayores.

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

8

## B I B L I O G R A F I A

1.- POTTS M.; WOODS C.: Nuevos conceptos en medidas anticonceptivas. El manual moderno, 1975; 88-92

2.- DLEINMAN R.; Anticoncepción sistémica, Manual de planificación familiar para médicos, publicaciones médicas de -- la federación internacional de planificación de la familia, 1981; 49-50.