

123
2e.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia



HOMEOPATIA VETERINARIA. ESTUDIO
RECAPITULATIVO.

T E S I S

Que Para Obtener el Título de:
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

P r e s e n t a :
LUZ DEL CARMEN LOPEZ LUNA

Asesores de Tesis: M.V.Z. Héctor Sumano López y
M.V.Z. Renate Thummler Blum

México, D.F.

1988



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CONTENIDO

Página

RESUMEN.....	1
INTRODUCCION.....	2
HISTORIA DE LA HOMEOPATIA.....	9
ELECCION DEL MEDICAMENTO.....	12
IDENTIFICACION DE SIGNOS Y SINTOMAS.....	74
PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS.....	75
SIMILIA, AGRAVAMIENTO Y DINAMIZACION.....	79
TRATAMIENTO DE EQUINOS CON HOMEOPATIA.....	83
TRATAMIENTO DE BOVINOS CON HOMEOPATIA.....	225
TRATAMIENTO DE OVINOS CON HOMEOPATIA.....	259
TRATAMIENTO DE CAPRINOS CON HOMEOPATIA.....	268
TRATAMIENTO DE SUINOS CON HOMEOPATIA.....	271
TRATAMIENTO DE PERROS CON HOMEOPATIA.....	283
TRATAMIENTO DE GATOS CON HOMEOPATIA.....	297
TRATAMIENTO DE AVES CON HOMEOPATIA.....	313
ANALISIS DE LA INFORMACION.....	316
LITERATURA CITADA.....	319

RESUMEN

LOPEZ LUNA, LUZ DEI CARMEN. Homeopatía Veterinaria: Estudio Recapitulativo (bajo la dirección de: M.V.Z. Ph. D. Héctor Sumano López y M.V.Z. Renate Thummler Blum).

Dado que la homeopatía veterinaria es una disciplina que no se contempla dentro del Curriculum de la carrera y debido a los múltiples informes de su eficacia en el tratamiento de las enfermedades de los animales domésticos, se llevó a cabo este estudio recapitulativo, haciendo énfasis en las alternativas para cada signo o enfermedad y resaltando las diferencias entre la homeopatía humana y la veterinaria. El estudio comprende una búsqueda retrospectiva a 10 años utilizando los servicios de informática del Centro de Información Científica y Humanística, de la biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional - Autónoma de México, así como de la Escuela Libre de Homeopatía.

INTRODUCCION.

La homeopatía es una filosofía médica que nació en los primeros años del siglo XIX. El médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) la inició. La piedra angular de esta disciplina se basa en la llamada ley de los " semejantes " : "similia similibus curentur". Esto es, curar lo semejante - con lo semejante. Hahnemann para curar las enfermedades en el ser humano, utilizaba medicamentos que probados producían los mismos signos del enfermo en un hombre sano.

La homeopatía se basa en la presentación de los signos o síntomas, sabiendo que los signos indican alteraciones en el proceso vital. Asimismo, la medicina homeopática ve a su enfermo como un todo; si existe la presencia de un mal reflejado en un síntoma en cualquier parte del cuerpo, esto indica que en conjunto algo anda mal, ya que no se puede separar la cabeza del tronco o del pie y así sucesivamente - (6).

De acuerdo con la filosofía homeopática las enfermedades no existen como entidades aisladas y más bien se procura prescribir conforme a las características del enfermo.- De tal suerte, en la filosofía homeopática clásica, existen algunos medicamentos específicos para curar cierta signología pero no una enfermedad específica. Por esta razón el medicamento que es útil para la enfermedad que padece un paciente no es útil para curar la misma enfermedad en otro paciente. Así, se desarrolla a principios de este siglo la tendencia terapéutica homeopática que intenta encontrar la "similia" del paciente. Esto es, el medicamento que más se acopla al paciente con base en la observación metódica de los efectos de dicho medicamento en un individuo sano.

La esencia de la homeopatía clásica, tiene como teoría prescribir de acuerdo a los signos o síntomas y las características de cada individuo, pero a pesar de esto no es concebible presentar un compendio de prescripciones para enfermedades específicas, las características especiales de la clínica veterinaria han dado lugar al desarrollo de una nueva tendencia en la homeopatía. Los textos de homeopatía humana presentan la información a manera de materia médica, describiendo las acciones de cada fármaco; pero la necesidad de hacer más accesible el conocimiento también se presentan varias opciones terapéuticas para cada enfermedad y en el caso especial de homeopatía veterinaria los textos disponibles procuran presentar únicamente una relación de fármacos homeopáticos específicos para enfermedades o específicos para signos. Por esta razón en este estudio se llevará un orden similar al que presentan los textos de homeopatía veterinaria (6). Sin embargo, se consideró conveniente listar los principios básicos de la homeopatía:

- I.- Ajustar toda indicación a los principios de la homeopatía.
- II.- Prescribir sólo medicamentos experimentados en el hombre sano.
- III.- Usar siempre dosis imponderables.
- IV.- Curar enfermos y no enfermedades.
- V.- Acudir a la cirugía sólo cuando la medicina sea incapaz de curar al enfermo y si indicación sea necesaria.
- VI.- Jamás emplear balísticos habiendo medicinas.
- VII.- Jamás emplear antisépticos en vivo, extractos, tónicos, purgantes o específicos alomáticos.
- VIII.- Preferir la profilaxis al medicamento.
- IX.- Anticipar la higiene a todo tratamiento.

X.- La misión del médico ha de ser de piedad y de apostolado
Todas estas leyes se reducen a dos:

I.- Ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos curativos, y

II.- Jamás perjudicar a los enfermos (36).

Los médicos homeópatas, como procedimiento base, después de realizar la observación de los signos y con la ayuda de la historia clínica seleccionan el medicamento apropiado, lo que requiere precisión en su elección. Según sus "materias médicas", los medicamentos tienen la ventaja de haber sido probados casi hasta agotar sus efectos sobre el organismo, por lo que se dice que los efectos esperados son ya un conocimiento fijo (27).

De acuerdo con la teoría homeopática, los medicamentos homeopáticos actúan directa y específicamente sobre las partes afectadas. Se utilizan cantidades mínimas e diferencia de la medicina ortodoxa. Este aspecto peculiar es en sí de gran utilidad pues si se presentara una equivocación al prescribir y medicar, al ser dosis mínimas las administradas no se produce ninguna reacción adversa. En la homeopatía no se prescribe ningún medicamento que agote las fuerzas o debilite al enfermo, como es el caso de la alopatía o medicina ortodoxa. Si no alivia la homeopatía, al menos no perjudica (18).

Al seleccionar un medicamento para elegir la dosis y frecuencia es necesario tomar en cuenta la presentación de la enfermedad, sea ésta aguda o crónica.

Una enfermedad aguda se presenta súbitamente y tiene un período breve o determinado y los signos terminan con o sin tratamiento, esto es; los pacientes sanan o mueren. De acuerdo con los principios homeopáticos, la enfermedad aguda tiene dos presentaciones: esporádica y epidémica. En la primera --

son efecto de influencias perniciosas : a las que se ha expuesto un individuo y pueden presentarse en cualquier época del año. Por el contrario una enfermedad epidémica es contagiosa, la mayoría de individuos o animales de una población o hato están expuestos a contraerla y ésta se puede presentar en ciertas épocas del año. Para este tipo de enfermedades es difícil encontrar el medicamento de elección, ya que la presentación de los signos o síntomas son poco determinados y genéricos (6).

Las enfermedades crónicas son aquellas que no tienen un periodo determinado y seguirán su curso durante años o toda la vida. Las enfermedades crónicas pueden presentarse con carácter agudo. Hay enfermedades crónicas que tienen una continuidad de un ataque agudo como es el caso de la epilepsia (6).

La forma en que los homeópatas preparan los medicamentos a partir del principio activo es de la siguiente manera:

- Maceración: presentación en forma líquida con dilución por medio de alcohol o agua, a lo que se denomina tintura madre.
- Trituración: con presentación en polvo y puede ser mezclado el principio activo con sacarosa o lactosa.
- Globulillos: es la presentación comúnmente usada y se administran de 4 a 6, pueden ser disueltos en agua y dados a intervalos cortos (6).

Las preparaciones homeopáticas se denominan de acuerdo con el nombre en latín de la sustancia o composición empleada. Ej.: Arsenicum album, generalmente se abrevia Arsen. al. Después se designa la potencia usada y precede un número que exprese el grado de potencia usada. Ejemplo : Arsen al. 3c

(3a. centesimal). Así existen dos métodos que designen el grado de potenciación presente en la medicación: decimal y centesimal y los siguientes símbolos se emplean para describir las soluciones homeopáticas:

\emptyset = para las tinturas madres.
 x o D= para escala decimal
 c o CH= para escala centesimal (26).

La escala decimal fue introducida por el Dr. Vehesemeyer y el medicamento debe estar mezclado con el vehículo en la proporción de 1 a 9 en todas las potencias. La escala centesimal fue expuesta por Hahnemann. El medicamento debe estar mezclado con el vehículo en una proporción de 1 a 99 (41).

Estas diluciones se ejemplifican a continuación:

1x= $1/10 = 10^{-1}$
 3x= $1/1000 = 10^{-3}$
 6x= $1/1000\ 000 = 10^{-6}$
 12x= $1/1000\ 000\ 000\ 000 = 10^{-12}$

Para la escala centesimal las siguientes cifras se encontraron en la literatura:

3 dilución de $1/1000\ 000 = 10^{-6}$
 6 dilución de $1/1000\ 000\ 000\ 000 = 10^{-12}$
 12 dilución de 10^{-24}
 30 dilución de 10^{-60}
 200 dilución de 10^{-400} (26).

Para la forma de administración, como ya se señaló, des-

pués de haber estudiado la presentación de la enfermedad, se debe tomar en cuenta el uso común que han descrito los homeópatas franceses. Consiste en que, de la 6a. a 12a. atenuación centesimal se usa para sustancias vegetales y de la 12a. e 30a. atenuación centesimal para las minerales. Esto es en cuanto a la composición y origen del principio activo (6).

Los homeópatas españoles, seguidores de la doctrina de el Dr. Marcues de Nuñez, usan atenuaciones altísimas de la 200 centesimal hacia arriba, sin dejar de emplear las bajas en las enfermedades crónicas y las altas en las enfermedades agudas.

Como regla general se puede decir que en personas no irritables, poco sensibles y en enfermedades cuya sensibilidad esté disminuida o casi aniquilada se utilizan atenuaciones bajas. Se utilizan altas atenuaciones en personas muy irritables y sensibles, en enfermedades donde la sensibilidad está muy aumentada (18).

En procesos agudos se recomienda dar el medicamento por un periodo corto pero más frecuente. En procesos crónicos - medicar por un periodo de diez días a un mes y poco frecuente, es decir una o dos veces al día.

Al prescribir una receta en la homeopatía utilizada para humanos se exigen ciertas restricciones en el uso de algunos alimentos como es el café, té, bebidas alcoholicas, alimentos ácidos, especias fuertes, etcétera. Esto tiene el objetivo de que no se presente ninguna reacción que pueda intervenir con la del medicamento homeopático y no llegue a inducir el efecto esperado (5).

El estudio recaricativo que se presenta a continuación toma en cuenta y tiene como objetivo primordial incorporar el área homeopática al campo veterinario mexicano como medicina alternativa (39). Es claro que existen numerosos trabajos de investigaciones que validan la eficacia de la homeopatía en la práctica veterinaria lo que se traduce en tratamientos exitosos aplicados a las diferentes especies animales.

Los estudios han sido publicados y llevados a cabo casi en su totalidad en países europeos tales como Alemania, Francia, etcétera. Por tal motivo, es pertinente decir que conociendo qué es la homeopatía y sus principios fundamentales, el médico veterinario zootecnista tendrá en sus manos una terapia complementaria, para satisfacer sus necesidades en la práctica diaria, en el área médica (17,25,46,54).

HISTORIA DE LA HOMEOPATIA

Hasta finales del siglo XIX las filosofías médicas imperantes se basaban en combatir mediante remedios heróicos las enfermedades, al considerar que lo contrario al síntoma o signo era lo que seguramente iba a curar al individuo, por ejemplo: para la diarrea un antidiarreico, para la fiebre un febrífugo; de acuerdo a la filosofía galénica que recibe en nombre de Alopátia ("contraria contrariis curantur"). A partir de este momento Samuel Friedrich Christian Hahnemann, apoyado en el concepto médico hipocrático implementa una filosofía médica totalmente opuesta a la Alopátia y que recibe el nombre de Homeopatía. En esta corriente médica se considera que las fuerzas de curación estén incluidas dentro del organismo y que los medicamentos deben facilitar o estimular dichas fuerzas. Hahnemann se encuentra influenciado por los trabajos de John Brown (1780), quien sostiene las teorías de Friedrich Anton Mesmer del "Magnetismo animal". También se dice que parte de la nueva filosofía homeopática es esta basada en la corriente establecida de Franz Joseph Gall de 1758-1828. Así, Hahnemann postula el apotegma angular de la homeopatía "similia similibus curentur". En este momento histórico se establece la dicotomía Alopátia-Homeopatía. (44).

Samuel Hahnemann, fundador de la homeopatía.

Muchos autores describen la personalidad de Samuel Friedrich Christian Hahnemann. Nació en Meissen el 10 de abril de 1755, hijo de un artista pintor de porcelana Meissen. A partir de 1775 estudió bajo una situación financiera muy precaria en Leipzig en el área de medicina e interrumpió el

estudio. Después en 1775 estuvo por nueve meses en un hospital en Viena y aprendió las ideas del Mesmerismo.

El 10 de agosto de 1779, terminó en Erlangen la carrera de medicina y se promovió con "Conspectus aefectuum spasmodicorum aetilogicus et therapeuticus" (Revisión o Vista de lo principal y tratamiento en afecciones de enfermedad). Después vivió en Dresden hasta 1788 y no se llevó bien con sus colegas. Se cambió de muchos sitios se dice que 17 veces. - Entonces empezó a hacer sus reflexiones de "Mercurius solubilis". A partir de 1811 vivió en Leipzig y trabajó como doctor general. Después de su participación en una disertación histórica médica: " De helleborismo veterum " (Uso de una raíz de Nies en los viejos) pidió Hahnemann a partir de 1812 impartir conferencias en la Universidad de Leipzig sobre homeopatía. Un farmaceuta de Leipzig lo atacó y eso le hizo que tuviera que mudarse en 1821 a Köthen, pero no perdió el contacto con homeópatas de Leipzig.

Se casó por segunda vez con una francesa de 35 años y se fue a vivir a Paris. Ahí atendió muchos pacientes y el 2 de julio de 1843 murió. Su frase principal: "Similia similibus curantur" que es el principio de la homeopatía (44).

Samuel Hahnemann y la primera generación de homeópatas veterinarios (1829-1840).

En 1833 aparece la "Isonatía de los contagiosos", idea de von Lux a consecuencia del principio de Similia y propone: "Aequalia aequalibus curantur" (del cuerpo enfermo se gana la materia, que potencialmente ayuda a su curación). Así ca ballos enfermos de muermo se curan y tratan con preparaciones de las mismas supuraciones; pacientes con lombrices se tratan con lumbricina (machacado de parásitos).

Las recomendaciones de tratamientos homeopáticos por Lux son seguidas y evaluadas en 1834 por Hertwig y colaboradores en la escuela veterinaria de Berlín. Los intentos solo traen resultados negativos. Así con estos resultados algunos científicos como Hertwig clasifican la homeopatía como el " escándalo público de la medicina de nuestro tiempo ". Y después se vio que Lux había escogido ciertas sustancias médicas y Hertwig había utilizado los fármacos equivocados, malas dosificaciones y aún potencias equivocadas (45).

ELECCION DEL MEDICAMENTO

La alopatía y la homeopatía difieren notablemente ya que en la primera se toma como base el diagnóstico, esto es el nombre de la enfermedad y su conocimiento exacto, de ahí se parte para dar el medicamento que en su criterio será el más recomendable. En cambio la homeopatía se basa en el conjunto de signos y síntomas que presenta el paciente al ser examinado, no excluye el diagnóstico totalmente, sino que le sirve sólo en el conocimiento de la gravedad de la enfermedad, así como su duración, su curso y su término. Al conocer los signos se opta por recurrir a un medicamento análogo en dosis muy pequeñas, ésto quiere decir que presentará los mismos signos del paciente en un individuo sano. Estos medicamentos utilizados han sido probados exhaustivamente y al elegir el correcto se espera la recuperación del paciente.

La materia médica homeopática cuenta con más de 600 medicamentos de origen vegetal, animal y mineral, por lo cual el médico homeópata elegirá el medicamento del que tiene un mayor conocimiento y que ha empleado con más frecuencia logrando así resultados satisfactorios. Para llegar a manejar todos los principios activos que tiene la homeopatía se requiere de un estudio prolongado que, resulta poco práctico para el clínico. Por esta razón se recomienda en la actualidad estudiar el posible tratamiento a partir de recetas establecidas.

Vale la pena mencionar en la mayoría de los casos se recomienda el uso de varios medicamentos, aunque debe verificarse si las sustancias empleadas no son antagónicas desde el

punto de vista homeopático.

Es importante señalar que estos medicamentos tienen acciones ya definidas, por ejemplo: el Aconitum napellus actúa sobre el aparato cardio-vascular, en la fiebre, en catarros, hemorragias nasales, neuralgias faciales, cefaleas, tos, - intranquilidad, úlceras diabéticas, reumatismo, cólera, icte-
ricia y otros efectos descritos en diversos libros (6). Sin-
embargo, la intención de este ensayo es dar un enfoque prác-
tico a la disciplina homeopática presentando las opciones me-
dicamentosas para las diversas patologías, con lo cual se -
pretende fomentar el uso y validación de la homeopatía.

Por otro lado, a diferencia de lo acostumbrado en los -
textos de farmacología ortodoxos, en la descripción de los
principios activos homeopáticos, no es posible definir el -
mecanismo ni el sitio donde actúan los medicamentos. Debe -
hacerse énfasis en que la homeopatía contradice a la medici-
na ortodoxa, por ejemplo: entre más diluido este el princi-
pio activo mayor será su potencia, con lo que se puede in-
ferir que el principio fármaco-receptor y dosis-respuesta -
de la farmacología moderna, resultan inadaptables.

A continuación se describen algunos medicamentos em-
pleados en la homeopatía.

Aconitum napellus

Planta de propiedades tóxicas, que se cultiva en los lugares húmedos de las montañas del Delfinado, Canauelec, la Provenza y otros puntos de Francia. Pertenece a la familia Ranunculáceas. Se le conoce comúnmente como aconito.

Actúa como antídoto de: Chamomilla, Coffea, Nux vómica, Petroleum, Sulphur, Sepia y Veratrum album.

Acción: duran sus efectos entre 8 y 48 horas.

Dosis: para los estados agudos las diluciones de uso común son la 6a. decimal.

Achillea millefolium

Es el milenrama o mil hojas, pertenece a la familia de las Compuestas; la tintura madre se prepara de la planta verde.

Análogos: Acalypha indica, Hemamelis e Inocacuhna.

Antídotos: Aurum auriatricum.

Acción: curadera y se utiliza principalmente en enfermedades crónicas, especialmente a aquellas que son la consecuencia de las caídas, desde lugares altos.

Dosis: la más usual es 30a.

Aethusa cynenium

Es la planta vulgarmente conocida con el nombre de perejil de perro, pertenece a la familia de las Umbelíferas; la tintura madre se prepara del vegetal verde en flor.

Análogos: Antimonium crudum, Arsenicum album, Calcerea carbonica y Cicuta virosa.

Antídotos: Coffea v Nitri spirit-dulcis.

Acción: de poco tiempo, pues dura 3 días y se utiliza para enfermedades agudas.

Dosis: 30a. y superiores.

Agericus muscarius

Se prepara por trituración y también por tintura madre del hongo fresco que pertenece al grupo de los venenosos, llamado-hongo de mosca, de hermosa apariencia, pero muy peligroso.

Análogos: Cannabis sativa, Indica, Cimicifuga racemosa, Coffea, Felsemium sempervirens, Hyosciamus niger y Tarentula.

Antídotos: Absinthium, Camphora, Coffea, Anemone pulsatilla y Vinum.

Acción: duración 40 días, se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 3e., 30a., 200a. y más altas.

Agnus castus

La tintura madre se prepara de las frutas maduras de una planta perteneciente a la familia de las Verbenáceas, vulgarmente llamada sauzgetillo.

Análogos: Bovista, Caladium, Cuprum metallicum, Hepar sulphuris, Natrum muriaticum, Natrum sulphuricum, Nitric acid., Oleander, Phosphorus, Platina, Selenium y Sepia.

Antídotos: Camphora.

Dosis: 30a. más usual.

Ailanthus glandulosa

La tintura se prepara de la corteza tierna, de las flores y vástagos verdes o bien, de las semillas recientemente secas, de la planta que pertenece a la familia de las Xantoxiláceas.

Análogos: Ammonium carb., Apis mellifica, Anacardium orientale, Arnica montana, Aurum triph., Baptisia tinctoria, Gelsemium sem pervirens, Hyoscyamus niger, Lachesis, Muriticum acidum y Rhus toxicodendron.

Antídotos: Nux vomica y Rhus toxicodendron.

Acción: no es duradera ni es profunda y conviene a los tipos graves de enfermedades agudas, especialmente fiebres.

Dosis: 12a. a la 6a.

Aloes socotrina

Jugo resinoso y margo de propiedades purgantes.

Antídotos: Sulphur, Alumina, Nux vomica y Lycnodium clavatum.

Acción: sus efectos duran más de 2 semanas.

Dosis: Experimentalmente son de la 3a. a la 6a.

Alumina

También llamado óxido de aluminio, químicamente puro, sirve para colorear ciertos óxidos metálicos y constituye el rubí, la esmeralda, el zafiro, etcétera. Es un antipsórico potente.

Análogos: Rórax y el Carbonato de amoníaco.

Antídotos: Bryonia alba, Chamomilla e Ipsecaculia.

Acción: duran sus efectos de 6 a 8 semanas.

Dosis: 6a, a 12a.

Allium cepa

La tintura se prepara del bulbo seco de la cebolla común, planta perteneciente a la familia de las Liliáceas. En México se le conoce también como Ku kut, Xonacatl y cebolla, en Cataluña se denomina ceba y en Euskera como Kipula.

Análogos: Chamomilla, Euphrasia, Gelsemium sempervirens, Ipecacuanha, Kali hyd., Nux vomica, Phosphorus y Anemone pulsatilla.

Antídotos: Aconitum napellus, Arnica montana, Chamomilla, Nux vomica y Veratrum album.

Son antagonistas del mismo Aloes socotrina, Allium sativus y Scuilla.

Acción: Corta en unas ocasiones y se utiliza en enfermedades agudas, pero también muchas veces, sus síntomas se prolongan y por ende se utilizará en enfermedades crónicas.

Dosis: bajas, aunque a veces se utilizan un poco más altas, de la 30a. en adelante.

Ambra grisea

Es el ambar gris, remedio calificado de Nosode, constituye una secreción morbosa de la ballena o del cachalote; se prepara por trituración.

Análogos: Perula asaeoetida, Calcarea carbonica, Chamomilla, Graphites, Lyconodium clavatum, Nux vomica, Phosphorus, Anemone pulsatilla, Sabadilla, Senecio, Delphinium staphisagria y Veratrum album.

Antídotos: Camphora, Nux vomica y Anemone pulsatilla.

Dosis: 30a.

Ammonium mur.

Es el cloruro de amoníaco que se prepara por trituración de la sal amoníaco nura.

Análogos: Calcarea carbonica, Caustica, Cyclamern, Cimex, Kreosotum, Lilium tig., Polygala senega.

Antídotos: Camphora, Causticum, Hepar sulphuris y Nux vomica.

Acción: dura hasta 7 semanas y conviene a varios casos de enfermedades crónicas.

Dosis: 3a., 6a., 12a y 30a.

Anacardium orientale

La tintura se prepara de las semillas machacadas de la planta, que pertenece a la familia de las Terebintáceas, según unos y otros dicen a la de las Anacardiáceas.

Análogos: Anacardium occidentale, Arsenicum, Calcarea carbonica, Chelidonium majus, Cypripedium, Oleander y Phosphorus ac.

Antídotos: Camphora y Nux juglans.

Acción: dura hasta 30 días y se prefiere en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a a 40a.

Anemone pulsatilla

La tintura se hace de la planta fresca, que pertenece a la familia de las Ranunculáceas.

Análogos: Antimonium crudum, Arnica montana, Atrone belladone,

Chemomilla, China, Colchicum autumnale, Ferrum, Ignatia amara,
Kali muriaticum, Sevia y Thuja.

Antídotos: Chemomilla, Coffea, Ignatia amara y Nux vomica.

Acción: dura de 4 a 5 días en casos agudos y muchas semanas en los crónicos.

Dosis: 12a., 30a. y más altas.

Juega un papel de antídoto en Agaricus muscarius, Argentum nitricum, Atropa belladonna, Chemomilla, China, Ferrum, Ignatia amara, Lyconodium clavatum y Mercurius vivus.

Antimonium crudum

Metal blanco azulado y muy arrio.

Análogos: Graphites, Carbonato de cal y Zincum.

Antídotos: Hepar sulphuris y Mercurius vivus.

Acción: dura un mes, prolongándose por mayor tiempo en las enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. a 12a.

Apis mellifica

La farmacopea homeopática posee dos productos de la abeja; Apis mellifica preparado con la abeja entera y Apis virus solamente con la nonzoña de la abeja.

Análogos: Arsenicum album, Atropa belladonna, Gentharis, Mercurius vivus.

Antídotos: Graphites, Hepar sulphuris, Iodium y Sulphur.

Acción: Variable, desde 1 a 30 o 40 días.

Dosis: Las primeras 3 trituraciones, con el uso de la 6a a 12a.

dilución se obtienen resultados favorables.

Apocynum cannabinum

La tintura se prepara de la raíz verde de la planta que pertenece a la familia de las Apocináceas. Se le conoce también como cáñamo del Canada.

Análogos: Apis mellifica, Arsenicum album, Digitalis purpurea, Helleborus niger y Strophanthus.

Antídotos: No se conocen

Acción: Duradera y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: tintura madre y las potencias bajas.

Argentum nitricum

Es el nitrato de plata, que se prepara por solución de la sal en agua destilado y de allí se sacan las diluciones.

Análogos: Arsenicum album, Aurum metallicum, China, Iodum, Mercurius vivus, Natrum muriaticum, Phosphorus, Aconitum napellus, Rhus toxicodendron, Stannum y Zincum.

Antídotos: Arsenicum album y Natrum muriaticum

Acción: duradera y de preferencia se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a, 30a. y más altas.

Arnica montana

Planta que crece en las altas montañas de Europa y posee un sabor acre, aromático y de un olor fuerte que hace estornudar.

La raíz, el tallo y las flores pueden emplearse en las preparaciones homeopáticas, pero es la raíz fresca con lo que se prepara la tintura. Se le conoce vulgarmente como árnica extranjera, tabaco de las montañas y yerba de las caídas.

Análogos: Carbo vegetabilis, Anemone pulsatilla, Nux vomica, Bryonia alba, Polygala senega y Sulphur.

Antídotos: Camphora e Ignatia amara.

Acción: dura hasta 12 días.

Dosis: dilución preferible la 6a. decimal.

Arsenicum album

De la raíz griega, arsenikos, quiere decir fuerte, vigoroso, es propiamente el ácido arsenioso, conocido también por óxido - blando o deutóxido de arsénico.

Análogos: Chamomilla, Ipecacuhna, Secale cornutum, Lachesis, Veratrum album y Heleboro blando.

Antídotos: China, Ferrum, Hepar sulphuris, Nux vomica y Sambucus nigra.

Acción: dura 30 a 40 días.

Dosis: las más usadas son la 6a. y la 12a potencia.

Arsenicum iodatum

Es el yoduro de arsénico que se prepara por trituración.

Análogos: Antimonium iodatum, Arsenicum album, Aralia, Iodum, Narthelina, Phosphorus, Sanguinaria nitrica.

Antídotos: Hepar sulphuris.

Acción: duran más de 4 semanas. Sus efectos y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: potencias bajas pero también las altas producen magníficos resultados.

Atropa belladonna

Planta indígena de Italia, narcótica y venenosa que produce un fruto semejante a la cereza y el que contiene como principio activo el alcaloide atropina. En botánica y medicina se la ha designado con otros nombres como Solanum manicum, Solanum somni ferum, Permenton, Mandragora. Pertenece a la familia de las Solanáceas (5).

Análogos: Aconitum napellus, Sulphur, Mercurius vivus, Ervonia alba, Anemone pulsatilla, China, Aurum metallicum y Ferula asafœtida.

Antídotos: Coffea, Hycosiamon niger, Currum metallicum, Ferrum y Platina.

Acción: 4 a 5 días en enfermedades agudas y hasta 2 semanas en las crónicas.

Dosis: si es muy aguda, las altas dosis como la 12a a 30a. o más. En la práctica el autor ha usado siempre de la 6a. decimal con buenos resultados.

Aurum metallicum

Es el oro metálico, que se prepara por trituración del metal recortado.

Análogos: Ferula asafœtida, Atropa belladonna, China, Currum metallicum, Mercurius vivus, Nitricum acidum, Anemone pulsatilla y Spicelia.

Antídotos: Atropa belladonna, China, Cuprum metallicum y Mercurius vivus.

A su vez actúa como antídoto de Mercurius vivus y de Spigelia.

Acción: 40 días dura su efecto y se aplica de preferencia a las enfermedades crónicas.

Dosis: Deben emplearse dosis altas de la 30a. y superiores.

Baptisia tinctoria

Se sice de la planta llamada añil silvestre, de la familia de las leguminosas; la tintura se prepara de la raíz verde de su corteza.

Análogos: Ailanthus glandulosa, Arnica montana, Arsenicum, Bryonia alba, Echinacea angustifolia, Muriticum acidum, Tyrogenium y Rhus toxicodendron.

Antídotos: No se conocen.

Acción: dura hasta 2 semanas o poco más su efecto y por consecuencia se utiliza en enfermedades agudas.

Dosis: 12a., 30a. y más altas.

Peryta carbonica

Sal que cubre muchos minerales por vía de envoltura, de propiedades tóxicas y que tiene una analogía con el arsénico.

Análogos: Graphites, Iodum, Cantharis y Arsenicum.

Antídotos: Camphora, Mercurius vivus, Atropa belladonna y Solanum dulcamara (5).

Acción: 4 semanas dura su efecto y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. decimal y 12a. en las congestiones cerebrales.

Berberis vulgaris

Es el agracejo, planta perteneciente a la familia de las Berberidáceas, la tintura madre se hace de la raíz recientemente seca o bien de la corteza fresca. Se le conoce también como agracejo, en Gatalán como coralet y en Euskera como erratz-beler (3).

Análogos: Aloes socotrina, Convolvulus, Dioscorea, Ipomea, Lyco-
podium clavatum, Nux vomica y Sarsaparilla

Antídotos: Camphora y Atrona belladonna, a su vez el Berberis vul-
garis antídota el Aconitum napellus.

Acción: cura varias semillas, por lo cual se utiliza en enfermeda-
des crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a.

Bismuthum nitricum

Es el subnitrito de bismuto que se prepara por trituración
del producto químico.

Análogos: Antimonium crudum, Arsenicum album, Coffea, Atrona be-
lladonna, Kreosotum y Veratrum album.

Antídotos: Calceola carbonica, Capsicum y Nux vomica

Acción: dura de 4 a 5 semanas y por consecuencia se utiliza en
enfermedades crónicas.

Dosis: 6a., 30a. y más altas.

Borsy

Es el bicromato de sodio, que en el comercio lleva el nombre

de altícar o atíncar y para usos homeopáticos se prepare por trituración y también por solución acuosa al centésimo.

Análogos: Calcarea carbonica, Chamomilla, Bryonia alba, Coffea, Mercurius vivus, Anemone pulsatilla y Sulphur acid.

Antídotos: Chamomilla y Coffea.

Son antagonistas del mismo Acetic acid, el vinagre y el vino.

Acción: dura hasta 4 semanas y sirve para enfermedades crónicas.

Bromum

Bromo-metalóide líquido, de color rojo y olor pungente, que se extrae principalmente de las algas marinas.

Análogos: Iodum, Sulphur acid, Calcarea carbonica y Spongia.

Antídotos: Opium, Magnesia y Camphora.

Acción: 15 a 20 días

Dosis: 6a. decimal, algunos médicos suelen elevarla hasta 30a.

Bryonia alba

Planta parásita trepadora, que crece principalmente en los setos. La raíz es la parte más activa de la planta y la que se utiliza en medicina.

Análogos: Rhus toxicodendron, Arnica montana, Aconitum napellus, Phosphorus, Atropa belladonna y Mercurius vivus.

Antídotos: Chamomilla, Ignatia amara y Nux vomica.

Acción: 4 a 5 días, por lo tanto sirve para enfermedades agudas y de 25 a 30 días en algunas crónicas.

Dosis: 6a. dilución.

Cactus grandiflorus

La tintura madre se prepara de una planta perteneciente a la familia de las Cactáceas y para el efecto, se emplean las flores y los tallos más tiernos.

Antídotos: Convalaria majalis, Crataegus oxia, Digitalis purpurea, Lithium carbonicum, Kalmia, Magnolia y Naja.

Antídotos: Aconitum napellus, Camphora y China.

Acción: se prolonga un poco más de 4 semanas y conviene a muchos casos crónicos, pero es eficaz asimismo en trastornos patológicos agudos.

Dosis: 3a., 6a. y más altas.

Calcareo carbonica

Es el carbonato de cal, obtenido de la concha de la ostra.

Antídotos: China, Mercurius vivus, Silicea, Anemone pulsatilla, Phosphorus y Utrona belladonna.

Antídotos: Camphora, Nitri-acidum y Sulphur acid.

Acción: dura de 50 a 60 días.

Dosis: 6a. a la 12a.

Calcareo fluorica

Es el fluoruro de calcio o feldespato, que para usos homeopáticos se prepara por trituración.

Antídotos: Ferrete carbonica, Ferrete muriaticum, Conium maculatum,

Hekla, Iaris y Rhus toxicodendron.

Antídotos: No se conocen.

Acción: es curadera y pasa de 6 semanas y por consecuencia se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 12a, en adelante.

Calcareo phosphorica

Es el fosfato de calcio que se prepara por trituración.

Análogos: Baryta carbonica, Berberis vulgaris, Calcareo carbonica, Fluoric acidum, Nitric acid, Phosphorus, Ruta, Silicea y Sulphur acid.

Antídotos: Gambhora, Hepar sulphuris, Inecacuahua, Nitric acid y Nux vomica. Son antagonistas del mismo Ferronia alba y Sulphur.

Acción: curadera de muchas semillas por lo cual se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: deben ser de las más altas, de la 30a. en adelante.

Calcareo sulphurica

Es el sulfato de calcio yeso que se prepara por trituración.

Análogos: Hepar sulphuris, Silicea y Calendula officinalis.

Antídotos: Gambhora, Inecacuahua y Nux vomica.

Acción: de varias semanas y conviene en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. y superiores a ésta.

Calendula officinalis

La tintura se prepara de una planta perteneciente a la fami-

lia de las comuestas. Se le conoce como mercadela y maravilla (5). En Cataluña como calendula y en Euskera como illen (3).

Análogos: Arnica montana, Hemmamellis, Calceas phosphorica, Hypericum, Rhus toxicodendron y Simchitum.

Antídotos: Chelidonium majus y Rheum; y completa sus efectos - Heber sulphuris.

Acción: de 1 a 3 semanas y se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: Jugo acuoso de la calendula puro, la tintura madre, en agua y el cerato; para las enfermedades internas, las potencias 6a. y 30a.

Camphora

El alcanfor es una sustancia aromática cristalizada que se extrae de las ramas y raíces de un árbol del Jorón que se llama alcanforero.

Análogos: Gertharis, Chamomilla, Cocculus, Hyosciamus niger y Veratrum album.

Juega un papel importante como antídoto de gran número de sustancias vegetales y minerales.

Cannabis sativa

Es el cáñamo, cultivado en las regiones de Europa, habiendo una segunda especie que es el índico con el cual se fabrica el hachich, narcótico cuyo uso repetido constituye un vicio de trascendencia como el opio, cocaina y morfina. Una variedad de cáñamo es el que produce la marihuana que se encuentra generalizada en México. Se le conoce también con el nombre de Juanita o Doña

Juanita (5).

Análogos: Arnica montana, Cantharis y Stannum.

Antídotos: Camphora.

Acción: 2 e 3 días en enfermedades agudas y de 15 e 20 en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. a 12a.

Cantharis

La tintura se hace con el insecto muerto que pertenece al orden de los Coleópteros.

Análogos : Aconitum napellus, Apis mellifica, Arsenicum album, Atropa belladonna, Camphora, Cannabis sativa, Carbo vegetalis, Coffea, Ledum, Lyconodium clavatum, Mercurius corrosivus y Rhus toxicodendron.

Antídotos: Aconitum napellus, Camphora y Anemone pulsatilla.

Actúan como antagonista del mismo: Coffea y lo complementa Camphora.

Acción: dura hasta 20 días y por consecuencia se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 30a. y superiores a ésta y en las uemaduras se usa el cerato cantaridiano.

Capsicum annuum

La tintura madre se prepara de una planta perteneciente a la familia de las Solanáceas. En México se conoce como Ahuyac tla tencuaye (5). También se le conoce como pimienta, en Catalán como pebroter y en Euskera como piber (3).

Análogos: Arnica montana, Atropa belladonna, Caladium, China, Cina, Ignatia amara, Nux vomica, Anemone pulsatilla y Veratrum album.

Antídotos: Caladium, Camphora y Cina.

Acción: dura más de 3 semanas de preferencia se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. y superiores a ésta.

Carbo animalis - Carbo vegetalis

El carbón es el producto que se obtiene de la incineración, al abrigo del aire, de la madera o del hueso, constituyendo en ese estado el carbono, casi puro.

Análogos: Arsenicum album, Mercurius vivus, Phosphorus, Secale cornutum, Euphrasia y Delphinium staphisagria.

Antídotos: Chamomilla, Coffea y Lachesis.

Acción: duran sus efectos 6 semanas.

Dosis: 6a. a 12a. decimal.

Gaulophyllum

La tintura se prepara de la raíz verde de la planta que pertenece a la familia de las Berberidáceas.

Análogos: Cimicifuga racemosa, Colocynthis, Gelsemium semnervirens, Magnesia phosphorica, Anemone pulsatilla, Senia y Viola odor.

Antídotos: No se conocen. Encuentra su antagonista o incompatible en Coffea.

Dosis: Deben ser bajas en concepto de varios autores, pero otros aconsejan las altas.

Causticum

Preparación obtenida por destilación de una masa de cal viva, de bisulfuro de potasa y de agua, es la designada como principio cáustico de la cal y que en latin se conoce como Causticum.
 Análogos: Mercurius vivus, Sepia, Graphites, Phosphorus y Silicea.
 Antídotos: Coffea, Golocynthis y Nux vomica.
 Acción: duran sus efectos 6 semanas.
 Dosis: ca. a 30a.

Cicuta virosa

La cicuta es una planta parecida al perejil, de gran actividad tóxica e histórica por haber sido el veneno que Sócrates apuró cuando se le condenó al último suplicio.
 Análogos: Nux vomica, Conium maculatum, Lycopodium clavatum, Opium y Veratrum album.
 Antídotos: Arnica montana y Tabacum.
 Acción: 30a 35 días en las enfermedades crónicas.
 Dosis: 6a. a la 18a. decimal.

Cimicifuge racemosa

La tintura se prepara de la raíz verde de la planta que pertenece a la familia de las Ranunculáceas. Contiene el alcaloide denominado macrotina. En México se conoce como hierba de la chinche (5).
 Análogos: Actea spic., Arnica montana, Aconitum napellus, Bryonia alba, Caulophyllum, Gelsemium sempervirens y Anemone pulsatilla.

Antídotos: Aconitum napellus, Baptisia, Caulophyllum, Gelsemium sempervirens y Anemone pulsatilla.

Acción: es duradera y se utiliza en los tipos crónicos.

Dosis: 6a. y más altas.

Cina

Es el semen contra de Alepo, planta perteneciente a la familia de las Compuestas; la tintura se hace de los botones secos de las flores.

Análogos: Arnica montana, Atropa belladonna, Calcarea carbonica, Capsicum, Chamomilla, China, Ferrum, Hepar sulphuris, Ignatia amara, Ipecacuahna, Phosphorus, Sabailla y sobre todo, Pilix mas.

Antídotos: Camphora y Capsicum.

Acción: dura hasta 21 días y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 9a. a la 30a. potencia.

Clematis erecta

La tintura se prepara de las hojas verdes de una planta que pertenece a la familia de las Ranunculáceas.

Análogos: Atropa belladonna, Bryonia alba, Cantharis, Oleander, Petroleum, Phosphoric acid, Anemone pulsatilla, Sarsaparilla, Sepia, Silicea y Coffea.

Antídotos: Bryonia alba y Camphora.

Acción: es de 6 semanas y por consecuencia es útil en enfermedades crónicas.

Dosis: 40a. y más altas.

Cocculus.

La coca de Levante, es una fruta venisífraca de Oriente y de la cual se extrae el alcaloide cocinaína.

Análogos: Mercurius vivus, Arsenicum, Cannabis, Antimonium, Aneurolepis, Castoreum y Carto vegetalis.

Antídotos: Cannabiorum y Nux vomica.

Acción: dura 1 mes.

Dosis: ca. decimal.

Coccus cacti.

Es la cochinitilla del opal, insecto perteneciente al grupo de los Hemipteros; la tintura se prepara de los animales muertos puestos en alcohol, previamente lavados en agua caliente.

Análogos: Cactus, Cantuaris, Corallium rubrum, Hepar sul muris, Iouva, Lecyura, Kali bicromicum, Kali iocatum, Sarsaparilla y Spongia.

Antídotos: no se conocen.

Acción: es breve, algunas veces y otras es de varias semanas y por lo cual se aplica a enfermedades agudas como crónicas.

Dosis: generalmente se usan las potencias c. j. s.

Coffea.

Designación latina del café, sevilla del café, de origen árabe y en cuyo idioma se llama café.

Análogos: Vanilla, Guaiacum, Spice y Nux vomica.

Antídotos: Atropa belladonna, Opium, Pulsatilla y Taconia.

Acción: de corto tiempo, no dura de 10 días ni en las enfermedades

des agudas.

Dosis: 5a. dilución.

Colchicum autumnale

La tintura se prepare del bulbo cogido antes de la floración o bien de las semillas secas y pulverizada de la planta que pertenece a la familia de las Colchicáceas. Se le conoce vulgarmente como calchico (5). También es conocido como coluico, en Catalán coluic y en Euskera como azpedar (3).

Análogos: Aconitum napellus, Arnica montana, Cerbera peruviana, - China, Lilium, Mercurius vivus, Natrum muriaticum, Nux vomica, Opium, Anemone pulsatilla, Seni y Veratrum album.

Antídotos: Cambora, Cocculus, Nux vomica, Anemone pulsatilla y Thuja.

Acción: se prolonga hasta por 40 días y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 3a. a la 30a.

Colocynthis

La colocynthis es una planta cucurbitácea de origen sirio, especie de pepino y de fruto muy amargo.

Conium maculatum

La tintura madre se hace de la planta verde al comenzar a florecer: pertenece a la familia botánica de las Umbelíferas. Se le conoce como cicuta (5). En Euskera como Otzerri-belsr y en Catalán como cicuta (3).

Análogos: Arnica montana, Perula asafotida, Atropa belladonna, Coffea, Condurango, Digitalis purpurea, Solanum dulcamara, Gravitas, Iodum, Lycopodium clavatum, Nux vomica, Anemone pulsatilla y Teucrium.

Antídotos: Coffea y Nitri spirit dulcis.

Acción: dura hasta 40 días y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: potencias altas, de la 30a. en adelante.

Corallium

Es el coral rojo que forma rocas en el mar y que es producto del animal que corresponde al grupo de Pólipos; se prepara por trituración, reducido antes a polvo fino el coral.

Análogos: Atropa belladonna, Drosera rotundifolia, Ipecacuahna, Mephitis y Spongia.

Antídotos: Hepar sulphuris.

Acción: duradera y se emplea en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. en adelante.

Crocus sativus

Es el azafrán, la tintura madre se saca de las estigmas de la flor seca; la planta pertenece a la familia de las Iridáceas; el preparado asimismo se hace por trituración. Se le conoce también como zafran (3).

Análogos: Aconitum napellus, Atropa belladonna, China, Ignatia amara, Ipecacuahna, Moschus, Opium, Platina, Sabina y Trillium.

Antídotos: Atropa belladonna y Opium.

Acción: dura hasta 20 días y aún poco más y se usa tanto en tipos agudos como crónicos.

Dosis: 3a. a la 30a.

Crotalus horridus

Es la llamada serpiente de cascabel; el veneno se prepara por trituración.

Análogos: Ancistrodon, Bothrops, Bungarus, Lachesis, Naja y Phosphorus.

Antídotos: Alcohol, Simaba cedron y Lachesis.

Acción: dura muchas semanas y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. y de la 30a. en adelante.

Croton tiglium

La tintura madre se hace de las semillas secas de la planta, la cual pertenece a la familia de las Aurorbiáceas o bien, se trituran las semillas. Se le conoce como semillas de croton (5).

Análogos: Anacardium orientale, Anagalis, Rhus toxicodendron y Sepia.

Antídotos: Antimonium tartaricum

Acción: duradera, pero en otras ocasiones es rápida de lo cual se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 30a. y superiores a ésta.

Cuprum metallicum

Es el cobre metálico, puro, pulverizado y que se prepara por trituración.

Análogos: Atropa belladonna, Calcarea carbonica, China, Cocculus, Drosera rotundifolia, Solanum dulcamara, Hepar sulphuris, Iodum, Ipecacuahna, Mercurius vivus, Nux vomica, Anemone pulsatilla, Sulphur y Veratrum album.

Antídotos: Atropa belladonna, Camphora, China, Cocculus, Conium, Solanum dulcamara, Hepar sulphuris, Ipecacuahna, Mercurius vivus, Nux vomica y Staphisagria.

Acción: dura hasta 30 días poco más y se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Chamomilla

Es la manzanilla, tan vulgarmente conocida y cuya planta de flores amarillas se usa mucho, aunque erróneamente en ciertos casos como estomacal.

Análogos: Aconitum napellus, Ignatia amara y Anemone pulsatilla.

Antídotos: Cocculus, Coffea y Nux vomica

Acción: dura poco, pero tomada repetidamente si así lo exige la enfermedad, se prolonga por algunos días.

Dosis: 6a. decimal.

Chelidonium majus

La tintura madre se prepara de la raíz verde de una planta perteneciente a la familia de las Papaveráceas. Se conoce esta planta como celidonia (5). En Catalán se conoce como celidonia y en Euskera como zaran (3).

Análogos: Arsenicum album, Bryonia alba, Lycopodium clavatum, Nux vomica, Opium, Podophyllum, Sanguinaria y Sulphur.

Completan su acción Bryonia alba, Lycopodium clavatum y Sulphur acid y es antagónico Chamomilla.

Acción: puede durar hasta 4 semanas o poco más y conviene a las formas crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a.

China

Es la corteza de un árbol que se llama Quino y que pertenece a la familia de las Rubiáceas, se produce en América del Sur y el conocimiento de sus propiedades medicinales se debe a la Condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú que gobernaba ese país en la primera mitad del siglo XVII. Son varias las especies de quina que se conocen, pero la que se ha experimentado es la llamada Loja o quina amarilla real, que contiene a la quinina.

Análogos: Arsenicum album, Rhus toxicodendron, Sulphur acid, Mercurius vivus, Lycopodium clavatum, Atropa belladonna, Calcarea carbonica, Carbo vegetabilis y Veratrum album.

Antídotos: Arnica montana, Capsicum, Ipecacuahna y Ferrum.

Acción: dura 6 semanas y por lo cual se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: la dilución mínima que debe usarse la China es la 6a. decimal.

Chininum sulphuricum

Es el sulfato de quinina que se prepara por trituración.

Análogos: Arnica montana, Arsenicum album, Calcarea carbonica, Graphites, Ipecacuahna, Natrum muriaticum, Phosphoric acid y Veratrum album.

Antídotos: Arnica montana, Arsenicum album, Calcarea carbonica, Atropa belladonna, Carbo vegetalis, Ipecacuanha, Lachesis, Natrum muriaticum y Anemone pulsatilla.

Acción: dura hasta 40 días y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. en adelante.

Datura stramonium

La tintura se prepara de la planta fresca; en México se le llama toloache o yerba hedionda. Perteneció a la familia de las Solanáceas. También se le conoce como mixitl, nacazcul, tanate, tecomaxochitl, tepate, tlama, tlancatl, tohku, toloachi, tolcatzin, toloazin, tolohuexihuitl (5). En Catalán le llaman estramoni y en Euskera como samabelar (3).

Análogos: Atropa belladonna, Cantharis, Pelleborus niger, Hyoscyamus niger, Nux vomica, Opium, Plumum, Veratrum album y Zincum.

Antídotos: Citricum acidum, Atropa belladonna, Nux vomica, Tabacum y todos los ácidos vegetales.

Acción: puede ser muy corta; por lo común, se prolonga en tiempo hasta por 10 semanas y los casos de envenenamiento casi siempre son incurribles; en consecuencia se utiliza en enfermedades agudas, pero más en las crónicas.

Dosis: -

Delphinium stachisgria

La tintura de este medicamento se prepara de las semillas de una planta que pertenece a la familia de las Ranunculáceas, llamada yerba piojera o albarraz o estafisgria.

Análogos: Colocynthis, Mercurius vivus, Phosphorus acid, Anemo-

ne nulsatilla v Thuja.

Antídotos: Camphora y es antagonista del mismo Ranunculus bulbosus.

Acción: cura hasta por 5 semanas y se utiliza en enfermedades - agudas y crónicas.

Dosis: 30a.

Digitalis purpurea

Es la dedalera púrpura, de la cual se sacaba antes la tinctura de Tiro, la planta pertenece a la familia de las Escrofulariáceas; la tinctura se prepara de las hojas verdes de la planta silvestre, cogidas antes de la floración. Se conoce también con el nombre de digital o digital de Puebla (5).

Análogos: Arsenicum album, Atrona belladone, Colchicum, Conium, Helleborus niger, Nux vomica, Opium, Petroleum, Anemone nulsatilla, Spigelia, Spongia v Sulphur acid.

Antídotos: Camphora, Nux vomica, Opium y Serpenteria. Es antagonista del mismo China.

Acción: cura hasta 5 semanas por lo cual se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 30a. en solvente.

Dioscorea villosa

La tinctura madre se prepara de la raíz verde de la planta - que pertenece a la familia de las Dioscoreáceas.

Análogos: Bryonia alba, Chamomilla, Colocynthis y Magnesia ros.

Antídotos: Camphora y Chamomilla.

Acción: puede ser curadora, hasta de varias semanas o disolverse pronto y por esto se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 3a. potencia en adelante.

Drosera rotundifolia

Planta droserífera carnívora, cuyas flores se cierran y aprisionan a los insectos y los digieren. Se le llama drosera de hojas redondas y también rocío del sol. Se la da esta denominación a causa de las gotas que salpican la superficie de sus hojas y que son el producto de una secreción.

Análogos: Prunella alba, Aconitum napellus, Currum, Spongia y Veratrum album.

Antídoto: Opium.

Acción: cort: no pasa de 1 semana.

Dosis: 6a. dilución.

Echinacea angustifolia

Es vegetal del Norte de América, que pertenece a la familia de las Comuestas; para la tintura madre se emplea toda la planta fresca en la época de su floración, de manera que se corta en los meses de julio y agosto.

Análogos: Arsenicum album, Fraxinus, Pothos, Calendula officinalis, Hemiphus, Lachesis y Rhus toxicodendron.

Antídotos: se desconocen.

Acción: puede ser curderr o no, así se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: Usarlo en potencias más altas de la 30a. por más que es común usar este remedio en tintura madre para el uso de las superficies que supuran.

Eupatorium perfoliatum

La tintura se prepara de la planta fresca al florecer, pertenece a la familia de las Compuestas.

Análogos: Bryonia alba, Chelidonium majus, Muriaticum acid, Nyctanthes arbor tistis y Sepia.

Antídotos: se desconocen

Acción: dura hasta 3 semanas y poco más y por lo cual se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a.

Euphrasia

Planta pequeña de la familia de las Crofulariáceas y cuyo nombre griego quiere decir alegría. Se encuentra en Europa y América del Norte, florece de junio a septiembre y sus hojas son axilares, forman frondosas y pequeñas espigas en la extremidad de sus ramas. La corola es blanca, con estrías de un rojo púrpura. Se le conoce como eufrasia y en Euskera como begi-belar (3).

Análogos: Apis mellifica, Argenum nitricum, Arsenicum, Hepar sulphuris y Mercurius solubilis

Antídoto: Anemone pulsatilla.

Acción: dura 3 semanas.

Dosis: 6a. decimal

Ferula asa-foetida

Planta Umbelífera de la que se extrae una gomorresina amarillenta de olor fétido y sabor nauseabundo.

Análogos: Coffea, Nux vomica, Ignatia amara, Mercurius vivus y Phosphorus acidum.

Antídotos: Causticum y China.

Acción: de 3 a 5 semanas.

Dosis: dilución media es la 6a. decimal.

Ferrum

El hierro es un metal de color gris azulaco, muy dúctil, maleable y resistente.

Análogos: Sulphur acid, Sepia, Platinum, Iodum, Arsenicum album y Silicea.

Antídotos: Arnica montana, Atropa bellaadona, Ipecacuahna y Mercurius vivus.

Acción: 6 a 7 semanas.

Dosis: 6a. a la 18a. decimal

Ferrum phos.

Es el fosfato ferroso férrico que se prepara por trituración; pertenece al grupo de los doce remedios de los tejidos de Schuessler.

Análogos: Aconitum napellus, Ferrum metallicum y Gelsemium

Antídotos: Arsenicum y Hepar sulphuris.

Acción: puede ser de varios días o semanas y conviene a enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 3a., 12a. y más altas.

Fluoricum acidum

Es el ácido fluorhídrico; la tintura madre se prepara por solución acuosa al centésimo. este ácido es sumamente venenoso y necesita conservarse la tintura madre en frascos de gutapercha o

ceresina, porque destruye el vidrio.

Análogos: Calcarea fluorica y Silicea.

Antídotos: Hepar sulphuris y toda clase de medicamentos de los llamados alcalinos.

Acción: duradera por lo cual se aplica en pacientes que presentan curso crónico.

Dosis: 30a. en adelante.

Gelsemium sempervirens

Es el jazmín de la Carolina; pertenece a la familia de las Longariáceas; la tintura madre se prepara de la raíz fresca, cuando todavía no tiene más gueso que el del cañón de una pluma. Se le conoce como gelsemio, jazmín amarillo, jazmín silvestre y - raíz de felsemio (5).

Análogos: Aconitum napellus, Baptisia tinctoria, Atropa belladonna, Cimicifuga racemosa, Ignatia amara, Ipecacuanha y Magnesia phosphorica.

Antídotos: China, Coffea y Digitalis purpurea.

Acción: Se prolonga por 3 semanas y de preferencia se utiliza en formas graves y violentas de las enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: las más usuales son las bajas, pero Nash, cree que deben utilizarse las altas de la 30a. en adelante.

Glonoinum

La tintura se prepara disolviendo una parte de la trinitrina o sea la nitroglicerina pura en nueve de alcohol de 95°.

Análogos: Aconitum napellus, Amyl nit., Atropa belladonna, Opium, Datura stramonium y Veratrum viride.

Antídoto: Aconitum napellus.

Acción: es rápida, dura solo 3 días y conviene a enfermedades agudas.

Dosis: se emplea en potencias bajas y también en altas.

Graphites

El grafito también llamado plumbagina o lápiz plomo, es el carbono natural cristalizado, de textura compacta, color agrisado y lustráceo que sirve para hacer lápices, crisoles, reflectores, etcétera. Tiene una acción selectiva sobre el sistema cutáneo y el venoso.

Análogos: Peryte carbonica, Anemone pulsatilla, Carbo vegetalis, Lycorodium clavatum y Phosphorus acidum.

Antídotos: Arsenicum y Nux vomica.

Dosis: 6a. a 30a.

Acción: 30 días dura y se utiliza en enfermedades crónicas.

Helleborus niger

El hellebore negro o rosa de Noel, es una planta ranunculácea, de raíz fétida y muy amarga.

Análogos: Atropa belladonna, Bryonia alba, Chamomilla, Izmetia - emere y Veratrum album.

Antídotos: Camphora y China.

Acción: en enfermedades crónicas dura 4 a 5 semanas.

Dosis: 6a. decimal.

Hepar sulphuris

El sulfuro de cal, llamado también hígado de azufre calcáreo,

es una preparación hecha con una mezcla a partes iguales de conchas de ostra reducidas a polvo fino y flor de azufre pura y caldada al rojo blanco.

Análogos: Antimonium crudum, China, Bryonia alba, Chamomilla, Cyprus metallicum, Mercurius vivus, Lachesis y Spongia.

Antídotos: Aconitum napellus y Atropa belladonna.

Acción: Si se emplean altas diluciones, dura cerca de 2 meses, en los casos crónicos.

Dosis: 6a. a 30a.

Hycosiamus niger.

El beleño es una planta narcótica, de olor nauseabundo, hojas viscosas y flores amarillentas. Se le llama comúnmente beleño negro o hierba de los sabañones y de la tiña, muerte de las gallinas y marranitos (5). En Catalán se le llama jusquiam y en Euskera xerri-baba.

Análogos: Aconitum napellus, Atropa belladonna, Chamomilla, Graphites, Ignatia amara, Lachesis Y Veratrum album.

Antídotos: Camphora y China.

Acción: dura de 1 a 2 semanas.

Dosis: 6a.

Ignatia amara.

Género de Loganiáceas de las Islas Filipinas y de Conchinchina, se llama haba de San Ignacio. Sus sinónimos: ataychaos ignati. Su acción tóxica se debe a 3 alcaloides que contiene: estricnina, brucina e igusarina. Fue descubierta y descrita en 1699 - por el jesuita Camelli, sabio botánico, que ha dado su nombre a

las camelias.

Análogos: Arnica montana, Causticum, Chamomilla, Coffea, Nux vomica, Ipecacuahna, Hyosciemus niger, Sulphur acid, Zincum y Veratrum album.

Antídotos: Camphora, Cocculus y Anemone pulsatilla.

Acción: corta no dura más de 1 semana.

Dosis: 6a. a la 30a.

Iodum

El iodo, descubierto por Courtois a principios del siglo pasado, es un cuerpo simple, de color gris negruzco y brillo metálico, extraído de las cenizas de plantas marinas, volátil a temperatura poco elevada y que desprende al arder vapores de color azul violeta.

Análogos: Arsenicum, Cocculus, Cuprum metallicum, Mercurius vivus y Sulphur acid.

Antídotos: Camphora, China, Coffea y Spongia.

Acción: cura hasta cincuenta días en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. decimal.

Ipecacuahna

Planta del género de las Rubiáceas, originaria del Brasil donde fue conocida en 1648 e importada a Europa en 1660 para servir al tratamiento de la disentería. En medicina se emplea la ipecacuahna anillana que tiene por alcaliote al emetina y que ha servido para establecer experimentalmente la acción fisiológica y terapéutica de este medicamento.

Análogos: Aconitum napellus, Arnica montana, Arsenicum, Carbo ve-

gatalis, Chamomilla, Ignatia amara, Nux vomica y Veratrum album.

Antídotos: China, Cuprum metallicum, Opium y Tartarus.

Acción: a dosis fuertes dura 2 días y a más pequeñas no pasa de 2 horas.

Dosis: 6a. decimal.

Iris versicolor.

La tintura se prepara de una planta perteneciente a la familia de las Irídeas.

Análogos: Calcarea carbonica, Kali Bichromicum y Natrum phosphoricum.

Antídotos: Nux vomica.

Dosis: 6a., 30a. y más altas.

Jalapa.

La tintura de este remedio se saca de una planta perteneciente a la familia de las Convolvuláceas. Entra en la preparación de el llamado alcohol alemán.

Acción: dura pocos días y es útil para casos agudos de cólicos infantiles.

Dosis: 6a. a la 12a.

Juniperus sabina.

Es la planta llamada sabino, perteneciente a la familia de las Coníferas, la tintura se hace de las hojas verdes.

Análogos: Arnica montana, Atropa belladonna, Calcarea carbonica, Gaulophyllum, Erigeron, Ipecacuana, Achillea millefolium y Tri-

llium-pend

Antídotos: Camphora y Anemone pulsatilla.

Acción: dura de 3 a 4 semanas y conviene asía a trastornos agudos y crónicos.

Dosis: 30a. en adelante.

Kali bichromicum

Este remedio se prepara de la sal llamada bicromato de potasio. Este medicamento antidotiza los malos efectos causados por los vapores de arsénico.

Análogos: Hepar sulphuris e Hidrastis.

Acción: duradera, persistente y por esto conviene a las manifestaciones crónicas de los padecimientos.

Dosis: 6a. a la 30a.

Kali carbonicum

Se prepara de la sal química llamada carbonato de potasio.

Análogos: Ammonium phos., Bryonia alba, Calcarea carbonica, Natrium carbonicum, Phosphorus y Spigelia.

Antídotos: Camphora, Coffea y Nitri spirit.

Dosis: 6a. a la 30a. y más elevadas.

Kali muriaticum

Preparado a partir del cloruro de potasio.

Análogos: Bryonia alba, Mercurius vivus, Anemone pulsatilla y Sulphur acid.

Antídoto: Hepar sulphuris.

Dosis: 6a. a la 12a.

Kali phosphoricum

Se prepara de la sal llamada fosfato de potasio.

Análogos: China, Cimicifuga racemosa, Gelsemium, Lachesis, Muriale
ticum acidum y Zinc.

Antídotos: Hepar sulphuris y Calcareum

Dosis: 6a. a 30a.

Kali sulphuricum

Se prepara de la sal llamada sulfato de potasio.

Análogos: Anemone pulsatilla

Acción: es duradera y conviene a las enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a.

Kalmia latifolia

Se prepara el remedio de una planta perteneciente a la familia de las Ericáceas, llamada laurel de la montaña.

Análogos: Abrotanum, Anemone pulsatilla Y Spigelia.

Antídotos: Aconitum napellus y Atropa belladonna

Dosis: 6a. a 12a.

Kreosotum

Se prepara del alquitrán de haya.

Análogos: Carbonic acid, Iodum, Lachesis y Delphinium staphisagria.

Antídotos: Chamomilla y Nux vomica

Acción: de 4 a 5 días y aún de varias semanas.

Dosis: 12a. a la 200a.

Lachesis

Preparado a partir de la trituración del veneno de la serpiente llamada surucocu o hierro de lanza del Brasil.

Análogos: Cotyleon, Crotalus, Naja, Muriaticum acium y Acid nitricum

Antídotos: Alcohol, sal de cocina o Natrum muriaticum, Arsenicum y Mercurius vivus.

Acción: profunda, dura muchas semanas.

Dosis: 6a. a la 30a. y más altas.

Leucum palustre

La tintura madre se prepara de la planta denominada romero silvestre, perteneciente a la familia de las Ericáceas, Tiene acción como antídoto de Rhus toxicodendron.

Análogos: Arnica montana, Bellism Hamamelis y Ruta.

Antídotos: Gamphora

Acción: 6 a 7 semanas y se emplea en las enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. a la 200a. y a veces la 6a.

Lycopodium clavatum

Se prepara de un criptógama vascular, de la familia de las Licopodiáceas y se conoce con el nombre de licopodio.

Análogos: Alumina, Bryonia alba, Calcarea carbonica, Nux vomica

Phosphorus.

Antídotos: Camphora, Causticum y Anemona pulsatilla.

Acción: 7 semanas dura y buen remedio curativo en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a y más altas obran con más eficacia.

Magnesia carbonica

Se prepara por trituración del carbonato de magnesio

Análogos: Aloe socotrina, Kreosotum, Cheiranthus, Rheum palmatum.

Antídotos: Arsenicum album y Mercurius vivus.

Acción: Dura más de siete semanas, se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a. y la 200a.

Magnesia phosphorica

Se prepara por trituración del producto químico fosfato de magnesio.

Análogos: Colocynthis, Dioscorea villosa, Kali, Phosphorus y Silicea.

Antídotos: Atrou belladonna, Selenium y Ichasia.

Acción: se aplica a las enfermedades agudas, pero también a las crónicas, porque su acción puede ser duradera hasta de 6 semanas.

Dosis: 6a y 12a. son las más usuales, pero son mejores las altas.

Mercurius solubilis o vivus

Se prepara triturando el mercurio soluble de Hehnenmann o -

bien el vivo metálico o sea el azogue, o el jodatus flavus o el Jodatus ruber con azúcar de leche. El corrosivus y el cyanatus pueden ser trituraciones o soluciones alcohólicas al 1%.

Antídotos: Hepar sulphuris, China, Lachesis y Nitricum acidum-

Mercurius cyanatus

Se utiliza en casos graves de afecciones respiratorias.

Mercurius Iodatus flavus (Protoyoduro de mercurio)

Mercurius Iodatus ruber. (Biyoduro de mercurio)

Mercurius sublimatus corrosivus (Sublimado corrosivo o bicloruro de mercurio.

Análogos: Otros mercuriales como son Kali muriaticum y Mezereum.

Antídotos: Arnica montana, Ferula asafoetida, Aurum, Qinchona, Hepar sulphuris, Kali hydroiodicum, Kali chloricum, Lachesis, Lycopodium clavatum, Mezereum, Nitri acid, Opium, Zarzaparilla. y Staphisagria.

Para el mercurialismo agudo el mejor es Hepar sulphuris y para el crónico es Ferula asafoetida, China, Nitric acid y Opium
Acción: Son de larga duración hasta de 7 semanas, en consecuencia se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 3a., 12a. y 30a., pero obran mucho mejor otras más altas.

Muriaticum acidum

Es el ácido clorhídrico, que se prepara por solución en agua destilada y de allí se sacan las diluciones.

Análogos: Arsenicum album, Baptisia y Phosphorus acidum.

Antídotos: Bryonia alba.

Acción: experimentalmente se prolonga hasta por 5 semanas de manera que conviene a las enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a.

Natrum carbonicum

El carbonato de sodio, preparado por trituración o solución acuosa.

Análogos: Graphites, Ignatia amara, Sepia y Thuja, también son Arnica montana, Arsenicum album, Bryonia alba, Glonoinum, Mercurius vivus, Natrum muriaticum, Nux vomica y Anemone pulsatilla.

Antídoto: Camphora.

Acción: puede durar hasta 40 días, se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 12a., 30a. y más altas.

Natrum muriaticum

Es el cloruro de sodio puro, se prepara por trituración o por solución en agua y de ésta se sacan las diluciones.

Análogos: Cimex, Graphites, Ignatia amara, Sepia y Thuja.

Antídotos: Arsenicum, Camphora, Nitri spirit d. y Phosphorus.

Acción: Se prolonga por 50 días, es útil para curar los padecimientos crónicos.

Dosis: 12a., 30a. y más altas.

Natrum phosphoricum

Es el fosfato de sodio que se prepara por trituración.

Análogos: Calcareas carbonica y Rheum.

Acción: Se prolonga por semanas enteras y conviene a enfermedades crónicas.

Dosis: 6a., 21a., 30a. y más altas.

Este medicamento combate con éxito el hábito vicioso de la morfina, así como las consecuencias funestas del yodismo.

Natrum sulphuricum

Sal química llamada sulfato de sodio o de glauberio, se prepara por trituración y por solución acuosa con la cual se hacen las diluciones.

Análogos: Aranea dia, Solanum dulcamara, Rhus toxicodendron y Thuja.

Acción: duradera y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a., 12a y más altas.

Nicotiana tabacum

Es el tabaco que se prepara de las hojas secas de la planta habanera que pertenece a la familia de las Solanáceas. En México se le conoce con los nombres comunes de Kuutz, picietl, quauhyetl y tabaco (5).

Análogos: Atropa belladonna, Cina, Cocculus, Nux vomica, Opium, Stramonium y Veratrum album.

Antídotos: Arsenicum, Camphora, Ignatia amara, Inecacuahna, Lycopodium clavatum y Nux vomica; hacen aborrecer al tabaco el Caladium y Plantago, sobre todo.

Acción: Indefinida y conviene a enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. y más altas.

Nitricum acidum

Es el ácido nítrico puro, del cual se hace la solución acuosa y de esta se sacan las diluciones.

Análogos: Calcarea carbonica, Hepar sulphuris, Kali carbonicum y Thuja, es antagonista Lachesis.

Antídotos: Calcarea carbonica, Camphora, Conium, Hepar sulphuris, Mezereum, Petroleum y Sulphur acid.

Acción: Experimentalmente dura hasta 8 semanas y corresponde por lo mismo a enfermedades crónicas.

Dosis: 6a., 12a., 30a. y más altas.

Nux moschata

Es la nuez moscada, medicamento que se prepara por tintura-madre o por trituración de las semillas de esta planta, que pertenece a la familia de las Miristicáceas.

Análogos: Perula asafoetida, Ignatia amara, Nux vomica, Anemone pulsatilla, Rhus toxicodendron y Valeriana.

Antídotos: Semina cœri carmi, o sean los cominos y también Camphora, Gelsemium sempervirens y Valeriana.

Acción: Duradera.

Dosis: 30a. pero dosis más altas darán mejores resultados.

Nux vomica

La tintura se hace de una semilla de una planta perteneciente a la familia de las Loganiáceas. Se le conoce como Nuez vómica.

Análogos: Bryonia alba, Graphites, Kali carbonicum y Anemone pul-

satilla.

Antídotos: Aconitum napellus, alcohol, Camphora, Chamomilla, Cocculus, Coffea, Ignatia amara, Anemone pulsatilla y Vinum.

Acción: de 15, 20 y más días y se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 15a., 24a. y más altas.

Opium

La tintura se prepara con el jugo que se extrae de las cápsulas de una planta llamada adormidera, de la familia de las Papaveráceas.

Análogos: Apis mellifica, Arnica montana, Baptisia, Atrona bella dona, Gelsemium, Helleborus niger, Hyosciamus niger y Lycopodium clavatum.

Antídotos: Camphora, Calcarea carbonica, Conium, Hepar sulphuris, Mezereum, Petroleum, Sulphur acid y sobre todo el mejor Ipecacuanha.

Acción: De 1 día a 5 y en la mayoría de los casos conviene a enfermedades agudas.

Dosis: 6a., 15a y 30a.

Petroleum

Se prepara por trituration o solución alcohólica del petróleo puro.

Análogos: Carbo vegetalis, Cocculus, Graphites, Mezereum y Sulphur acid.

Antídotos: Aconitum napellus y Nux vomica

Acción: Dura hasta por 50 días y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 18a., 50a y más altas.

Phosphorus

Cuerpo extraído químicamente, tiene dos formas, en una, las partículas están muy unidas y forman el fósforo rojo o amorfo y en la otra, sus moléculas están más distanciadas, pues hay cristalización y se le llama blanco y debe estar en agua por arder con el aire. A estas formas, con aspectos diversos, del Phosphorus se llaman estados alotrópicos; la forma cristalina es la empleada para la tintura; también ella se tritura, más al prepararla, hay que tomar precauciones, pues un leve descuido la echa a perder, es preferible la tintura o solución al milésimo. El phosphorus neutraliza los efectos del cloroformo y del éter.

Análogos: Antimonium ars., Calcareo carbonica, China, Lycopodium clavatum, Sepia y Sulphur acid.

Antídotos: Camphora, Coffea, Nux vomica y Vinum.

Acción: Corta, de 3 a 5 días o bien durar 7 semanas. Se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 30a. y más altas.

Phosphoric acidum

Es el ácido fosfórico, obtenido químicamente y disuelto en agua, para derivar de allí las diluciones.

Análogos: Ferula asafoetida, China, Lachesis, Lycopodium clavatum, Opium, Delphinium staphisagria y Rhus toxicodendron.

Antídotos: Camphora y Coffea.

Acción: 3 a 4 días en casos leves y en los serios 6 a 7 semanas.

Dosis: 6a., 30a y más altas.

Phytolacca decandra

La tintura madre se prepara de la raíz fresca de una planta de la familia de las Pitolacáceas. En México existe una variedad que es la octandra, llamada cóngora o amole. Se le conoce también como hierba carmín (5).

Análogos: Bryonia alba, Conium maculatum, Kali hyd., Mercurius vivus, Rhus toxicodendron y Sanguinaria.

Antídotos: Atropa belladonna, leche, Mezereum y Natrum muriaticum

Acción: varias semanas, se usa en enfermedades crónicas.

Dosis: las altas son siempre mejores que las bajas.

Platina

Es el platino tratado con el agua regia que da el cloruro, en donde se sumerge una barra de hierro pulimentada, ésta se apodera del cloro y el platino se precipita al fondo en forma pulverulenta; se lava el precipitado varias veces con agua destilada y se prepara en seguida por trituración. Destruye las malas consecuencias del plomo.

Análogos: Ferula asafoetida, Crocus, Anemone pulsatilla, Sabadilla y Datura stremonium.

Antídoto: Anemone pulsatilla

Dosis: 3a., 30a. y más altas.

Plumbum metallicum

Es el metal reducido a polvo, se tritura éste para derivar, después de trituraciones sucesivas las diluciones.

Análogos: Alumina, Atropa belladonna, China, Natrum muriaticum, Nux vomica, Anemone pulstilla y Zinc.

Antídotos: Alumina, Atropa belladonna, Hyosciamus niger, Opium, Platina, Datura stramonium y las corrientes eléctricas.

Acción: Experimentalmente dura hasta 6 semanas y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: más usual es la 30a.

Polygala senega

La tintura se hace de la raíz seca, de una planta perteneciente a la familia de las Fligaláceas. Se conoce con el nombre vulgar de poligala de virginia.

Análogos: Atropa belladonna, Bryonia alba y Datura stramonium.

Antídotos: Arnica montana, Atropa belladonna, Bryonia alba y Camphora.

Acción: dura 5 semanas

Dosis: la tintura madre, 3a. decimal, aunque se aconseja la 30a.

Psorinum

Es el nosode o producto de la psora, preparado por trituración.

Análogos: Calcarea carbonica, carbón, Natrum, Arsenicatum, Silicea y Sulphur acid.

Antídotos : no se conocen.

Acción: es duradera de muchas semanas.

Dosis: 200a. y superiores a ésta y no deben repetirse sino al cabo de mucho tiempo.

Rheum palmatum

La tintura se prepara de la raíz seca de una planta perteneciente a la familia de las Fligonáceas. Se conoce como ruibarbo palmeado (5).

Análogos: Arsenicum, Calcarea carbonica, Chamomilla, Natrum phos phoricum y Nux vomica.

Antídotos: Camphora, Chamomilla y Nux vomica.

Acción: es corta apenas si dura 3 días.

Dosis: 12a., 30a. y más altas.

Rhododendron ferrugineum

La tintura se hace de una planta perteneciente a la familia de las Ericáceas y se le conoce vulgarmente como rododendro.

Análogos: Calcarea carbonica, Carbo animalis, Carbo vegetalis, Clematis y Rhus toxicodendron.

Antídotos: Camphora, Clematis y rhus toxicodendron.

Acción: dura entre 4 y 6 semanas y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 12a., 18a. y 30a.

Rhus toxicodendron

Se prepara de una planta que pertenece a la familia de las Terebintáceas. En México a esta planta se le llama mela mujer o bemberecua o bembericua, tetlatlia y zumaque (5).

Análogos: Arnica montana, Arsenicum, Causticum, Solanum dulcamara y Lycopodium clavatum.

Antídotos: Bryonia alba, Camphora, Coffea y Sulphur acid.

Acción: dura de 3 a 6 semanas y es útil en enfermedades agudas y

crónicas.

Dosis: 6a., 30a. y más altas.

Rumex crispus

Se prepara de la raíz de una planta perteneciente a la familia de las Poligonáceas.

Análogos: Atrapa belladona, Spongia, Sulphur acid y Mercur sulphuris.

Antídotos: no se conocen.

Acción: es duradera.

Dosis: 6a., 12a. y más altas.

Ruta graveolens

Es la ruta común, planta perteneciente a la familia de las Rutáceas: la tintura se hace de la planta verde.

Análogos: Aconitum napellus, Acte sn., Ammonium carbonicum, Arnica montana, Igmetia amara y Rhus toxicodendron.

Antídoto: Gemphora.

acción: 15 días, es conveniente en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 12a., 30a. y más altas.

Sesbucua nigra

Es el saúco, planta perteneciente a la familia de las Carri foliáceas y la tintura se hace de las hojas verdes y de las flores.

Análogos: Arnica montana, Arsenicum, China, Mercur sulphuris, Ipe-

cacuahna, Nux vomica y Rhus toxicodendron.

Antídotos: Arsenicum y Camphora.

Acción: en algunos casos es rápida por lo cual es útil en enfermedades agudas y se adapta a enfermedades crónicas porque a veces su acción es larga.

Dosis: 30a. y superiores a ésta.

Sanguinaria canadense

Planta perteneciente a la familia de las papaveráceas; la tintura se hace de la raíz fresca de la misma.

Análogos: Atropa belladonna, Iris versicolor, Ferrum y Melilotus.

Acción: es duradera y se utiliza en enfermedades crónicas.

Antídotos: Opium y Rhus toxicodendron.

Dosis: 3a. y superiores a ésta, aunque también beneficia la 6a.

Secale cornutum

Es el cornecillo, hongo o tizón del centeno; de este hongo se hace la tintura madre.

Análogos: Arnica montana, Camphora, Ignatia amara, Laurocerasus y Veratrum album.

Antídotos: Camphora, Opium y Solanum nigrum

Acción: dura 7 semanas.

Dosis: 30a. y más altas.

Serria

Es la tina del calamar, molusco cefalópodo, productor de secreción que arroja cuando se ve perseguido por otros animales ma

rinos, pues enturbia el agua, evita su captura. Se prepara la tinte, por tintura madre o por trituración.

Análogos: Asprula, Lilium tig., Murex, Silicea y Sulphur acid.

Antídotos: Aconitum napellus, Nitri spirit. dul. y Tartarus emeticus.

Acción: dura hasta 8 semanas.

Dosis: 30a. y superiores a ésta.

Silicea

Es el sílice o curazo, que se prepara por trituración.

Análogos: Alumina, Calcareo carbonica, Carto vegetalis, Graphites, Hepar sulphuris, Lachesis, Lycomodium clavatum, Mercurius vivus, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Seris, Sulphur acid y - sobre todo Calcareo sulphurica.

Antídotos: Camphora y Hepar sulphuris.

Acción: experimentalmente dura hasta 8 semanas, su uso es útil en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. y más altas.

Simba cedron

Es el simba cedrón una planta perteneciente a la familia de las Simbrubas y se prepara por trituración de la planta seca o también por tintura de la misma. En México se le conoce por cedrón o cedrón de oaxaca (5).

Análogos: ingenicum, Arnica montana, China, Gelsemium, Lachesis, y Ledum.

Antídoto: Lachesis.

Acción: duradera y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: en el meludismo y neuralgias palúdicas este medicamento se emplea en potencias altas, de la 30a. y superiores a ésta, en tanto que en las mordeduras de las serpientes se aplica la tintura sobre las heridas.

Solanum dulcamara

Se prepara la tintura de las hojas y tallos verdes de la planta antes de que florezca; pertenece a la familia de las Solanáceas. Se denomina vulgarmente dulcamara (5). En Catalán se conoce como morella y en Euskera por moreno belar (3).

Análogos: Aconitum napellus, Aranea dia, Arsenicum, Atropa belladonna, Bryonia alba, Cimicifuga racemosa, Calcarea carbonica, Cuprum, Inecacuahna, Lachesis, Mercurius vivus, Natrum sulphuricum, Anemone pulsatilla, Rhus toxicodendron y Thuja.

Antídotos: Camphora, Cuprum metallicum, Inecacuahna y Mercurius vivus y son antagonistas del mismo remedio, Atropa belladonna y Lachesis.

Acción: se prolonga y puede durar hasta 50 días y se utiliza - sobre todo en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a y superiores a ésta.

Snigelia

La tintura madre se prepara de la planta recientemente seca, pertenece a la familia de las Loganiáceas. Existen dos especies: S. entelmia, conocida como hierba de la lombricera y ocolintecuitca. S. longiflora conocida como hierba del burro y sangre de toro (5).

Análogos: Aconitum napellus, Arnica montana, Cactus, Cimicifuga

racemosa, Cinnabaris, Naja, Sanguinaria, Sabadilla y Spongia.

Antídotos: Camphora y Anemone pulsatilla.

Acción: dura hasta por 5 semanas, se usa en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a. y en procesos inflamatorios más bajas.

Spongia tosta

La tintura se hace de la esponja turca, tostada más no quemada.

Análogos: Aconitum napellus, Arsenicum, Drosera, Hepar sulphuris, Phosphorus y Spigelia.

Antídotos: no se conocen.

Acción: dura hasta 4 semanas conviene tanto en enfermedades agudas como en crónicas.

Dosis: bajas, 2a. y 3a, aunque otros autores usan la 200a. con brillante éxito.

Stannum

Es el estaño que se prepara por trituración.

Análogos: China, Anemone pulsatilla y Senega.

Antídotos: Anemone pulsatilla (a la vez los complementa)

Acción: duradera hasta por 7 semanas.

Dosis: 30a.

Sulphur

Es el azufre puro, que se prepara por trituración y por solución alcoholica al centesimo, que es la tintura madre.

Análogos: Arsenicum, Calcarea carbonica, China, Cuprum metallicum, Lycopodium clavatum, Nitricum acidum, Nux vomica, Psorinum, Anemone pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sarsaparilla, Sepia y Silicea.
 Antídotos: Aconitum napellus, Gamphora, Chamomilla, China, Mercurius vivus, Nux vomica, Anemone pulsatilla y Sepia.

Acción: dura hasta 50 días y se utiliza en enfermedades crónicas
 Dosis: 30a. en adelante.

Sulphur acid

Es el ácido sulfúrico, que se prepara por solución acuosa y de allí se sacan las diluciones.

Análogos: Arnica montana, Digitalis purpurea, Calcarea carbonica, Natrum phosphoricum, Anemone pulsatilla y Sulphur acid.

Antídotos: Calcarea carbonica y la complementa Anemone pulsatilla

Acción: dura hasta por 6 semanas y de preferencia se aplica a - animales con enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. y la 30a., en casos de excitación estomacal de los alcohólicos se puede administrar la 3a. decimal.

Symphytum officinale

La tintura se prepara de la raíz verde de la planta que pertenece a la familia de las Boragináceas y lleva el nombre vulgar de consuelda real o suelda con suelda. También se le conoce como raíz de sinfito (5).

Análogos: Arnica montana, Calcarea phosphorica, Hypericum y Thuja.

Antídotos: no se conocen.

Acción: puede ser rápida o bien duradera y por lo tanto se aplica a pacientes con enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: Se usa externamente en tintura y al interior en potencias

bajas en la 3a., 6a. y 12a.

Tarentula hispanica

Es el veneno de la tarántula española, introducido en la materia médica por el Dr. Nuñez, de Madrid, y se prepara por trituración.

Análogos: Agaricus, Atropa belladonna, Cocculus, Cuprum, Cimicifuga racemosa, Gelsemium sempervirens, Lachesis, Magnesia phosphoricum, Anemone pulsatilla y Secale cornutum.

Antídotos: Lachesis y Phosphorus sobre todo.

Acción: duradera hasta por 50 días, por lo cual se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. y 30a.

Tartarus emeticus

Es el tártaro estibiado, que se prepara por trituración y también por solución acuosa al centésimo.

Análogos: Baryta carbonica, Ipecacuahna, Anemone pulsatilla, Opium y Sepia.

Antídotos: Cocculus, Ipecacuahna y Anemone pulsatilla y a su vez Tartarus emeticus antidotiza a Sepia.

Acción: hasta 5 semanas y se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 30a. y superiores a ésta.

Thuja occidentalis

Se prepara de las hojas verdes de una planta perteneciente

a la familia de las Coníferas. Se le conoce como Tuia (5).

Análogos: Arenea, Diadema, Ferula asafoetida, Eryonia alba, Cannabis sativa, China, Solanum dulcamara, Lycopodium clavatum, Mercurius vivus, Natrum sulphuricum, Rhus toxicodendron y Silicea.

Antídotos: Camphora, Mercurius vivus, Pulsatilla, Sabina y Thea.

Acción: dura hasta 5 semanas y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 6a. a la 30a. y más altas, localmente a menudo se utiliza la tintura madre y el cerato.

Trillium pendulum

La tintura se prepara de una planta que pertenece a la familia de las Esmiláceas.

Análogos: Hamamelis, China, Erigerón, Ipecacuahna, Lachesis, Lilium tig., Achillea millefolium, Sabina y Secale cornutum.

Antídotos: no se conocen.

Acción: puede ser duradera, se utiliza en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: más usuales son, en muchos casos la tintura y las potencias bajas pero también convienen las altas.

Tuberculinum

Es un medicamento del grupo de los nosodes, que se prepara por trituración.

Análogos: Bacillinum, Calcarea carbonica, Hepar sulphuris, Kala-gua, Lachesis, Phellandrium, Psorinum, Spongia y Sulphur acid.

Antídotos: no se conocen.

Acción: duración larga y conviene a tipos crónicos.

Dosis: solo debe emplearse en altísimas potencias, nunca menores de la 200a. y antes de administrarlo, es preciso cerciorarse del estado del corazón, las dosis sólo se repiten a intervalos muy largos.

Ustilago maydis

Es el hongo del maíz o cuitlacoche que se prepara por trituration del hongo seco o bien por tintura madre del propio vegetal fresco. Se le conoce también como carbón del maíz, huitlacoche, popoyault (5).

Análogos: Sabina, Secale cornutum, Trillium pendulum.

Antídotos: Camphora y Opium.

Acción: larga duración, se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: bajas 3a. y 6a.

Uva ursi

Es la uva de oso jayuya; la tintura madre se hace de las hojas verdes de la planta, perteneciente a la familia de las Ericáceas.

Análogos: Apis mellifica, Atropa belladonna, Camphora, Graphites, Kalmia y Sarsaparilla.

Antídotos: no se conocen.

Acción: duradera y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: tintura madre, 3a. y 6a. potencias.

Valeriana officinalis

La tintura madre se prepara de la raíz seca de una planta de

la familia de las Valerianáceas. Se le conoce como valeriana extranjera, en Catalán como valeriana y en Euskera: ardi-belam (3).

Análogos: Arnica montana, Atropa belladonna, Chamomilla, Cocculus, Coffea, Conium, Ignatia emara, Mercurius vivus, Nux vomica, Platina, Anemone pulsatilla y Stannum.

Antídotos: Camphora y Coffea.

Acción: dura de 10 días o un poco más, útil en enfermedades agudas y crónicas.

Dosis: 12a. y la 30a.

Veratrum album

La tintura se prepara de la raíz seca o verde de la planta, el vegetal pertenece a la familia de las Colchicáceas. Se le conoce como vedegambre (5). En Catalán como veratre y en Euskera como baladre (3).

Análogos: Arsenicum album, Arnica montana, Cuprum, Drosera rotundifolia, Hyoscyamus niger, Ibexacuahna, Opium, Phosphorus acid, Sepia y Datura stramonium.

Antídotos: Aconitum napellus, Camphora, China y Coffea. A su vez Veratrum album destruye los efectos de Arsenicum, China y Ferrum.

Acción: duran hasta 3 semanas sus efectos y se utiliza de preferencia en enfermedades agudas, pero también conviene a las crónicas cerebrales.

Dosis: 12a. y 30a.

Veratrum viride

La tintura se prepara de la raíz seca o fresca de la planta perteneciente a la familia de las Colchicáceas.

Análogos: Aconitum napellus, Baptisia, Atropa belladonna, Ferrum

phosphoricum y Gelsemium sempervirens.

Antídotos: Strychninum.

Acción: poco duradera por lo general se utiliza en enfermedades agudas, pero casos crónicos como los cardiacos o los epileptiformes podrán curarse con el remedio.

Dosis: 6a. a la 30a.

Verbascum thapsus

Es el gordolobo, la tintura se prepara de la planta verde, que pertenece a la familia de las Escrofulariáceas. En Catalán se le conoce como blenera y en Euskera como ostaza (3).

Análogos: Causticum, Platina y Rhus aromatica.

Antídoto: Camphora.

Acción: de varias semanas y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: bajas hasta la 3a. y para las afecciones del oído se usa la tintura madre.

Viburnum opulus

Se hace la tintura de la corteza verde de la raíz, la planta pertenece a la familia de las Caprifoliáceas.

Análogos: Caulophyllum, Cimicifuga racemosa, Gelsemium sempervirens, Secale cornutum, Sepia y Xantoxilum.

Antídotos: no se conocen

Acción: duradera y se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: tintura madre y las potencias bajas.

Zincum metallicum

Se prepara por trituration.

Análogos: Agaricus muscarius, Antimonium crudum, Bryonia alba, Cuprum metallicum, Cobaltum, Carbo vegetalis, Hepar sulphuris, Ignatia amara, Psorinum, Datura stramonium y Sulphur acid.

Antídotos: Camphora, Hepar sulphuris, Ignatia amara, el vino y los estimulantes agravan de un modo horrible los fenómenos patogénicos de Zincum metallicum.

Acción: dura de 30 a 40 días, se utiliza en enfermedades crónicas.

Dosis: 30a. en adelante.

IDENTIFICACION DE SIGNOS Y SINTOMAS

En la medicina homeopática la identificación de signos y síntomas dentro de una entidad patológica definida puede ser de capital importancia para la elección del medicamento y debido a la filosofía de la medicina homeopática se exige que el clínico practique una observación que es superior a la requerida por la medicina ortodoxa. Así, el homeópata no solamente identificará la enfermedad sino procurará identificar las influencias tanto medio ambientales, de nutrición, - como también temperamento del paciente que contribuyeron a la presentación del síndrome en cuestión. Por ejemplo si un médico veterinario procura tratar una mastitis, no solamente deberá elegir el medicamento conforme a la semiología sino que tratará de encontrar la relación con factores tales como estrés, nutrición inadecuada, higiene y aún las características raciales del individuo. Así, algunos factores tan diversos como vientos dominantes y presencia de humedad, número de horas día y muchos otros factores modificarán la elección de un medicamento homeopático.

Por otro lado es necesario hacer inciar en que la homeopatía, al igual que la acupuntura no se ocupa exclusivamente de curar enfermedades como entidades independientes, sino que trata de resolver una enfermedad mediante la cura de los signos más evidentes. Este enfoque curiosamente se manifiesta en los libros de homeopatía en donde se presentan alternativas medicas para curar la tos, flujo nasal, histeria, leucorrea, estreñimiento, etcétera, con resultados terapéuticos integrales. Es esta peculiaridad de la homeopatía la que contribuye a su poca aceptación por la comunidad médica ortodoxa. (Véase Análisis de la información).

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

La prescripción homeopática debe respetar ciertas reglas basadas en:

- Elección de uno o varios medicamentos.
- La dilución de cada uno.
- La repetición de las dosis.
- La forma galénica que mejor se adapta a cada animal (32).

En la actualidad se encuentran diferentes formas farmacéuticas de los medicamentos homeopáticos a saber:

- Glóbulos
- Gránulos
- Trituraciones
- Supositorias
- Colirios
- Pomadas (32)
- Gotas (34)
- Anovetas inyectables y oreles (34).

La homeopatía es un método terapéutico utilizado como medio de acción de las sustancias farmacodinámicas activas a dosis débiles, tóxicas o infinitesimales y dinámicas. Estas sustancias son prescritas respetando la regla de similitud, la homeopatía sin embargo, tiene en cuenta las posibilidades reaccionaria de la enfermedad (31).

Como se sabe los remedios homeopáticos son inofensivos, dependen únicamente de la sensibilidad del enfermo y al seleccionar éstos uno se basa en la semiología presente del enfermo. Es necesario ayudarse por medio de series de interrogaciones en la consulta para investigar los signos psíquicos, generales y locales, no debe omitirse nada, ni el pres-

do ni el presente, ya que lleva a la individualización (32).

Si la analogía es extensa, es más el interés a utilizar las diluciones elevadas, 15-30CH e inversamente. Si no se encuentra algún signo local se elige por las diluciones bajas 4-5 CH. Las diluciones altas son necesarias para actuar en sujetos sensibles, su acción es rápida, profunda y durable.

Para la repetición de las dosis, una regla debe respetarse: Si la acción favorable es obtenida, es conveniente de espaciar las tomas del medicamento o incluso cesar la medicación según el carácter más o menos crónico del caso.

Para la elección de la dilución o potencia del medicamento debe tenerse en cuenta en el sentido de la reacción terapéutica requerida en la sensibilidad reactiva del animal el uso se le da en nombre de factores de individualización: edad, temperamento modo de vida, alimentación, raza, etcétera. En la práctica, se aconseja de iniciar con la dilución 7 CH (si los casos son agudos o crónicos) y si la similitud es clara (32).

En las enfermedades agudas la acción del remedio se agota rápidamente a escoger:

- La dilución 5 CH, si la analogía no es muy clara, 3 gránulos cada 2 horas.
- La dilución 7 CH si la analogía es más evidente, 3 gránulos 3 veces al día.
- Las diluciones 9, 15, 30 CH, si los signos sínclicos son superiores a los signos generales.

En las enfermedades crónicas se elevan las diluciones más escrupulosas. En enfermedades funcionales, en un síndrome característico es preferible comenzar por una 5 Ch. Si

el medicamento es claramente elegido subir progresivamente las diluciones 9, 12, 15, 30 cH por 3 o 4 días.

En enfermedades por lesiones las diluciones 9, 15 cH son recomendables. En enfermedades mentales, en función a la similitud uno da directamente una dosis 30 cH.

En episodios agudos en un terreno crónico (asma, eczema), se aconseja una dosis 15 cH, una vez por semana.

La prescripción de uno o varios remedios y la dilución de cada uno será el resultado de una observación profunda de la enfermedad.

La redacción de una receta es un acto importante, el médico debe respetar siempre la ley de Hahnemann. La búsqueda de medicamentos (a partir de la Materia Médica), la posología, la dilución, la repetición de las dosis, obedecen a leyes que, a pesar de todo, son función del enfermo, de sus reacciones y de la enfermedad, aguda o crónica (32)

A continuación se presentan ciertas características para facilitar la comprensión del uso de las diferentes potencias (55).

FORMA O ESTADO DE LA ENFERMEDAD (PRESENTACION)

A) AGUDA

1.- Basando el tratamiento en la semiología predominante:

Tratamiento inicial

Potencias profundas

Vegetal
Animal D2-D3
Mineral D3-D4

Tratamiento en el curso

Potencias medias

Vegetal
Animal D4-D8
Mineral D6-D12

2.- Basando el tratamiento en las características individua-

les del paciente.

Tratamiento inicial

Potencias profundas

Vegetal

Animal D15 - D30 (D200)

Mineral D30 (D200)

Tratamiento en el curso

Potencia media

Vegetal

Animal D12 - D15

Mineral D12 - D15

B) CRONICA

1.- Sin tomar en cuenta el sistema de reacción general.

Al comienzo 1 vez subcutánea

Sulphur D12

Tratamiento inicial

Potencias profundas

Vegetal

Animal D1 - D2

Mineral D3

Tratamiento en el curso

Potencia media

Vegetal

Animal D4 - D6

Mineral D4 - D6

2.- Tomando en cuenta el sistema de reacción general.

Al comienzo 1 vez subcutánea

Sulphur D30

Tratamiento inicial

Potencias profundas

Vegetal

Animal D30

Mineral D30

Tratamiento en el curso

Potencias medias

Vegetal

Animal D12 - D15

Mineral D8 - D12

SIMILIA, AGRAVAMIENTO Y DINAMIZACION

A continuación se describen tres conceptos homeopáticos que pueden calificarse de diametralmente ajenos al concepto de la farmacología ortodoxa.

De acuerdo con los principios de la filosofía médica homeopática, para una enfermedad o conjunto de signos determinados existe un medicamento capaz de reproducirlos casi en forma idéntica. Por lo tanto ese medicamento puede curar la enfermedad en cuestión basándose en el principio "similia similibus curantur", sin embargo, se ha descrito para medicina homeopática humana, que los medicamentos tienen un carácter definido y si este carácter es similar al del paciente entonces, casi cualquier enfermedad podrá ser curada con el mismo principio activo. En el último de los casos el carácter del medicamento influirá en la elección del principio activo a utilizar. Así, se describe que la pulsatilla se administre de preferencia a mujeres rubias de carácter dócil, sentimental y cuya enfermedad tenga tendencia a localizarse en el lado izquierdo (6). Es evidente que este tipo de efectos, a parte de ser totalmente ajenos a la medicina veterinaria resulta en extremo difíciles de comprobar y por lo tanto no se considera dentro del listado de medicamentos recomendados para cada enfermedad.

También derivado del principio "similia similibus curantur", se detecta en ocasiones lo que definen los homeopatas como agravamiento. Como su nombre lo indica este fenómeno se refiere al recrudecimiento de la semiología a tratar. Empero, este efecto es temporal y generalmente seguido de una notable mejoría. La duración del agravamiento fluctúa de 6 a

48 horas dependiendo de la condición si es aguda o crónica. Es importante no descontinuar el tratamiento homeopático a pesar de que se note el agravamiento ya que esto puede provocar que el médico califique de inútil su terapéutica homeopática. El agravamiento se manifiesta con más frecuencia cuando se utilizan altas potencias (200 centesimal a 1000 centesimal) o cuando el animal a tratar con homeopatía a recibido tratamiento alopático por mucho tiempo.

Para atenuar un agravamiento se puede inyectar cafeína a un animal.

La dinamización de los medicamentos en la homeopatía implican la agitación de cada paso en la dilución de la tintura madre. Esto es, la dilución deberá "dinamizarse", agitando vigorosamente la dilución por lo menos unas 200 veces. De acuerdo con la práctica homeopática el resultado clínico de utilizar un medicamento dinamizado es notablemente superior al uso de un medicamento que simplemente se ha diluido. Tal es la creencia de los homeópatas en este fenómeno que existen máquinas diseñadas para facilitar la fabricación de una dilución elevada (19). Evidentemente, esta característica resulta difícil de teorizar con los conocimientos que se tienen de la química, en especial si se considera que en altas diluciones ya no existen moléculas del principio activo de acuerdo con el número de abogadro (19). Sin embargo, es factible llevar a cabo evaluaciones comparativas experimentales con medicamentos dinamizados y sin dinamizar.

TRATAMIENTOS

A continuación se listan los tratamientos encontrados en el material bibliográfico recopilado. Como se menciona en la identificación de signos y síntomas, no se listan únicamente enfermedades, sino que se entremezclan algunos signos, ya que la homeopatía se vale de ambas variables para guiar su tratamiento.

Se anota primero el fármaco, luego se especifica la dilución y finalmente se anota la forma de administración por ejemplo: glóbulos, gotas, pastillas, píldoras o inyecciones.

Cuando es necesario se añade una nota aclaratoria que hará la terapéutica homeopática más específica. (Vease Fig. 1).




Fig. 1. Ordenamiento de la terminación homeopática recopilada.

Por lo general los resultados de las altas potencias son rápidos y, aunque las respuestas de cada individuo y en cada enfermedad serán distintas, se estima que las respuestas favorables deben observarse dentro de las primeras 24 a 48 horas.

La duración de los tratamientos es variable. Se aconseja que en enfermedades crónicas se establezca un tratamiento crónico y lo contrario puede aplicarse a las enfermedades agudas.

Evidentemente, los accesos agudos de una enfermedad dan lugar a una terapéutica aguda seguida del tratamiento de la condición crónica inicial.

TRATAMIENTO DE EQUINOS CON HOMEOPATIA

ABORTO

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis por hora (darlo inmediatamente a los primeros signos de aborto).
- Arnica montana 30c, 3 dosis cada 3 horas (aborto como resultado de un golpe)(26). 6 gotas tres veces al día (40)
- Secale cornutum, 4 gotas u 8 globulillos cada 1/2, 1 o 2 horas (prolapso vaginal, descargas de sangre y debilidad)(40). Secale cornutum 200c, 4 dosis cada 3 horas (ayuda el control de la hemorragia postaborto cuando esta acompañada de tensión. Sangre espesa y coagulada) (26).
- China officinalis 30c, 4 dosis cada 2 horas (gran cantidad de sangre, debilidad)(26). China 6 gotas cada 1/2, 1 o 2 horas (40).
- Sabina 6c, 4 dosis cada 3 horas (hemorragia con sangre brillante, en parte coagulada)(26). Sabina 4 gotas o - 8 globulillos cada 1/2, 1 o 2 horas (signos de dolor, - hemorragia)(40).
- Pyrogenium 1M, 4 dosis cada 3 horas (aborto séptico - asociado con retención de membranas fetales, produciendo grado bajo de fiebre caracterizado por discrepancia de pulso y temperatura: pulso débil y aumento de temperatura o pulso pleno y disminución de temperatura)(26).
- Anemone pulsatilla 6 gotas cada 15 minutos (signos de aborto)
- Rhus toxicodendron 6 gotas, 3 veces al día (si signos de aborto son producidos por un esfuerzo)(40).

ABORTO POR SALMONELLA EN YEGUAS

- Caulophyllum 200c, 1 vez al mes hasta el mes final de gestación una dosis con 2 semanas de intervalo. La preñez puede estar controlada con este remedio (26).
- Sabina 6c, 4 dosis cada hora, cuando el aborto ha ocurrido, ayuda a evacuar las descargas y expulsar la placenta.
- Secale cornutum 30c, cada 4 horas por un día. (Descargas postaborto contaminadas y teñidas de sangre obscura)(26).

ABSCEOS

- Hepar sulphuris (35) 30c, 4 dosis cada 2 horas (abscesos agudos, área sensible al tacto y dolor severo)(26) Cuatro gotas o 6 glóbulos cada 4 horas (si es progresivo y produce supuración cuando la resolución no se ha obtenido. Si el color de la descarga es normal solo limpiar con agua tibia 1 o 2 veces al día)(40).
- Mercurius corrosivus 200c, 3 veces diariamente por 2 días (abscesos con pus verdosa y sangre. Ulceras necróticas)(26).
- Kali bichromicum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Pus amarillenta, dificultad para arrojarla)(26).
- Silicea (35) 200c, 1 vez al día por 7 días (abscesos crónicos, pus tenue y cremosa)(26).
- Sulphur iodatum 6c, en la mañana y noche por 5 días (abscesos múltiples en todo el cuerpo).
- Antreacinum 30c, 1 vez diariamente por 4 días (abscesos circundados por piel dura y descolorida).
- Tarentula cubensis 30c, 4 dosis durante 2 horas (estado general séptico, abscesos con color púrpura y amenaza de necrosis del tejido)(26). Externamente loción Calendula

- y loción Hypericum, después de haber debridado, aplicar las una o dos veces diariamente (26).
- Aconitum napellus (35) 6 gotas o glóbulos cada 4 horas hasta que la inflamación descienda o el absceso este formado (40).
 - Bryonia alba (35).
 - Arsenicum (supuración de olor fétido)(35). Seis gotas o 6 glóbulos una vez al día (si hay demasiada inflamación y la pus tiene mal olor, úlceras duras y dolorosas) (40)
 - Mercurius vivus (35). 6 gotas o 6 glóbulos una vez al día (pus aguada y oscura)(40).
 - Arnica montana 6 gotas internamente 4 veces al día y lavar la parte afectada 3 o 4 veces al día con una solución de Arnica montana en la proporción de 1 en 3 de agua (si fue el producto de una lesión y se formó un absceso)(40).
 - Chamomilla (35)
 - Baryta carbonica (35).

ACNE

- Hepar sulphuris 200c, primera dosis: mañana y noche por 1 semana (es probable que este remedio, dado cuando los signos no son complicados puede repetirse incrementando altas potencias)
- Sulphur iodatum 6c, mañana y noche por 1 semana (eczema asociado con enrojecimiento de la piel).
- Arsenicum album 1M, 1 vez al día por 2 semanas (sudoración con lesiones que aparecen rápidamente y penetran el tejido subcutáneo)
- Kali bromatum 6c, día y noche por 1 semana (cuando --

las lesiones afectan hombros y cabeza, la piel esta sensible al dolor).

- Ledum 6c, mañana y noche por 1 semana (Acné asociado - con eczema facial, comezón empeora por parásitos).
- Hyohocotyle 6c, mañana y noche por 1 semana (Pustulas - en el pecho, asociados con descamación de la piel y severa comezón).
- Antimonium crudum 6c, mañana y noche por 5 días. (Piel seca y verrugosa, costras duras aparecen sobre las pustulas)(26).

AFECCIONES EN PIEL

- Arsenicum album, 6 gotas o 6 glóbulos tres veces al día hasta que mejore (debilidad, parches duros y emaciación).
- Antimonium crudum 6 gotas en poca agua, dos veces al día. (Escamas asperas, pérdida de apetito y excesiva sed).
- Mercurius vivus, 6 gotas o 6 globulillos, mañana y noche. (Escalofríos, pérdida de pelo, piel opaca, apetito voraz y pervertido).
- Sulphur acid. 2 veces a la semana, 6 gotas en poca agua (40).

AFTAS

- Acidum phosphoricum
- Staphysagria
- Mercurius solubilis (babeo de olor fétido)(35).
- Sulphuris tintura, 6 gotas en la mañana y noche hasta - mejoría.
- Acidum phosphoricum, 6 gotas en la mañana y en la noche.
- Squilla, 4 gotas dos veces al día hasta que no exista in flamación. (Util cuando hay fiebre e inflamación).

- Arsenicum album, 6 gotas, tres veces al día (40).

ALOPECIA

- Lycopodium 200c, mañana y noche por 1 semana (frecuente ulceración dérmica junto con desordenes gástricos y hepáticos).
- Pix liquida 6c, mañana y noche por 5 días (irritación de la piel acompañada por desordenes respiratorios).
- Calcarea fluorica 6c, 3 veces al día por tres días. (Util en condiciones cuando la piel cicatriza lentamente).
- Thyroidinum 200c, 1 vez al día por 2 semanas (en alopecia generalizada cuando se sospecha de un desperfecto de la glándula tiroides). Nota: Puede ser necesario continuar el tratamiento a potencias altas y por un periodo prolongado. Si hay solamente mejoramiento parcial con alguno de los otros remedios (26).
- Bryonia alba (enfriamiento).
- Sepia y Silicea (erupción).
- Kali carbonicum (prurito).
- Iodium (enflaquecimiento).
- Agaricus muscarius (alrededor de los ojos)
- Sulphur acid (después de alguno de los anteriores)(40).

ANASARCA

- Lycopodium clavatum
- Arsenicum y Anemone pulsatilla (si es consecuencia de papera)
- Bryonia alba (enfriamiento)
- Colchicum autumnale (estreñimiento, tos seca).
- Solanum dulcamara (signos de papera).

- Atropa belladonna (crepitación y pastocidad)
- Sepia
- Secale cornutum alternado con Arsenicum album.
- China con el anterior (35).

ANEMIA

- China officinalis 30c, 4 dosis cada 2 horas. (Debilidad extrema y cuando se sospecha de escape lento de sangre).
- Arsenicum album 200c, 3 veces al día por 3 días. (Buen remedio en casos crónicos o estados de anemia perniciosa. El animal esta agotado e inquieto, sed predomina y toma en pequeñas cantidades).
- Trinitrotoluene 30c, 3 veces al día por 5 días. (Asociado con ictericia y hemoglobinuria, debilidad y palpitación son signos comunes, la orina esta altamente coloreada).
- Natrum muriaticum 1M, en la mañana y noche por 5 días. (Indicado en estadios largos dependiendo de deficiente metabolismo).
- Silicea 1M, 2 veces a la semana por 4 semanas. (Cuando hay un aumento de leucocitos conduciendo a una interferencia con la función de la hemoglobina)(26).

ANEMIA HEMOLITICA DEL RECIEN NACIDO

- Transfusión sanguínea.
- China officinalis 30c, 4 dosis cada 2 horas (ayuda a recuperar la fuerza y regular los latidos cardiacos y respiración del potro).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 2 días. (Ayudará a promover la salud, circulación periférica y restaurar la función hepática). Nota: Si hay causa para creer que es-

ta enfermedad puede presentarse por una historia de vacunación de neumonía, los remedios mencionados deben darse al potro inmediatamente al nacer y reemplazar la sangre previamente. Reemplazo de vacunación ortodoxa o alopática por una vacuna oral homeopática o nosoden el cual reducirá la probabilidad de que la enfermedad ocurra (26).

ANEMIA INFECCIOSA ECUINA

- No hay tratamiento específico, pero los siguientes remedios aliviarán los síntomas.
- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. En estadios febriles iniciales.
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 3 días. (Hemorragias peteciales en membranas mucosas).
- Chelidonium 20c, mañana y noche por 4 días. Ictericia, - posible rigidez en el área del hombro.
- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 2 días. En estados edematosos este remedio puede ayudar a controlar la cantidad de fluido en los tejidos. Combinado con otros remedios.
- China officinalis 6c, 3 veces al día por 3 días. Estados anémicos. Nota: Si es posible hacer un nosode de la sangre infectada tomada del paciente el día 15o. posinfección cuando la reacción febril esta en su apogeo. El nosode puede ser usado profilácticamente y terapéutica(26).

ANEURISMA VERMINOSA

- Veratrum viride 200c, en la mañana y noche por 4 días. (Pulso intermitente débil, puede haber contracción muscular y congestión pulmonar, el animal esta sediento y la

piel muestra regiones sudorosas, orina escasa).

- Lycopodium clavatum 200c, 4 dosis tres veces al día. (Espitacion en sujetos delgados mostrando predisposicion a desordenes hepáticos).
- Calcarea fluorica 30c, en la mañana y noche por 4 días. (Inflamación glandular con incremento de acción del corazón puede estar asociado con insuficiencia valvular (26)).

ANHIDROSIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora (estado febril).
- Arsenicum album 1M, 3 veces al día por 3 días (piel seca)
- Arsenicum iodatum 6c, 4 dosis cada 3 horas (signos respiratorios, disnea).
- Calcarea carbonica 200c, una dosis por día por 4 días.
- Alumina 30c, mañana y noche por 4 días. Excesiva resequeidad de la piel con prurito. Tendencia a constipación.
- Berberis aquifolium 6c, 3 veces al día por 10 días (este remedio promoverá la actividad glandular y ayudará a promover la sudoración).
- Petroleum 6c, 3 veces al día por 5 días. (Resequeidad, pirexia. El remedio estimula las glándulas sudoríparas)
- Nux moschata 6c, 3 veces al día por 5 días. (Resequeidad extrema de la piel acompañada por debilidad y paso vacilante)(26).

ANOREXIA

- Nux vomica 6c, 3 veces al día por 3 días. (La condición depende de mala digestión).
- Ornithogalum 1x, 4 dosis cada hora (signos de dolor abdo

minal en la región estomacal debido a estenosis o espasmo del píloro).

- Vitamina B12 3x, 3 veces al día por 3 días (restablece el apetito).
- Anacardium 30c, 3 veces al día por 3 días (en casos donde otros medicamentos no han dado resultado).
- Arsenicum album 1M, 1 vez al día por 1 semana (sed y bebe pequeños sorbos).
- Hydrastis 6c, 3 veces al día por 3 días. (Condiciones catarrales como coriza y lagrimeo purulento, la anorexia es debido a gastritis catarral).
- China officinalis 30c, 4 dosis, 1 dosis cada 3 horas. (Debilidad, abdomen distendido, hinchazón disminuye por el movimiento)(26).

APETITO DEPRAVADO

- China
- Nux vomica
- Anemone pulsatilla (35).

APOPLEJIA

- Aconitum napellus (35).

ARTERITIS

- Calcarea fuorica 30c, 3 veces al día por 3 días. (Usado para remover depositos de fibrina en el endotelio de la arteria).
- Kali hydrodicum 200c, 3 veces al día por 5 días. (Infiltración hemorrágica de la piel). Nota: en todos los casos de arteritis afectando la arteria mesenterica y la iliaca, deberá prestar atención para remover los pará-

sitos (*Strongylus*)(26).

ARTERITIS VIRAL EQUINA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis, 1 cada hora. (Dar en estado febril).
- Arsenicum album 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Rinitis y diarrea. El animal esta sediento y decaido).
- Kali hydriodicum 200c, 3 veces al día por 4 días. (Conjuntivitis y lagrimeo. Edema pulmonar).
- Antimonium tartaricum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Tos acompaña a la congestión pulmonar. Predomina estertores).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 3 días. (Hemorragias peteciales, ictericia e involucreción del hígado).
- Achillea millefolium 6c, 3 veces al día por 3 días. (Hemorragias generalizadas con tendencia a continuar estados febriles).
- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 2 días. (Este remedio ayudará al control del edema).
- Crotalus horridus 30c, 3 veces al día por 3 días. (Ayuda al control de hemorragias especialmente equimóticas y tendrá un valor en el control de afecciones uterinas)(26).

ARTRITIS

- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas. En estadios tempranos. Articulación hinchada y aumenta el líquido sinovial.
- Rhus toxicodendron 30c, día y noche por 4 días. (La claudicación mejora con el ejercicio, rigidez de músculos y tendones).

- Atropa belladonna 200c, 4 dosis cada 2 horas. (Articulaciones calientes e hinchadas sin exceso de fluido articular. Afectadas simultáneamente varias articulaciones).
- Bryonia 30c, mañana y noche por 4 días. Presión sobre la articulación alivia. El animal empeora al movimiento.
Nota: La brucelosis es una enfermedad que ha llegado a ser reconocida ahora como causa de artritis bacteriana en el caballo. En bursa atlanto-occipital, navicular y en otras articulaciones vertebrales antes de comenzar cualquiera de los remedios ya mencionados administrar - una dosis de Brucella abortus nosode 30c (26).
- Symphytum D2 y Viscum album D3 (56).

ASCITIS

- Solanum dulcamara
- Helleborus niger
- Arsenicum album
- China (35).

ATAXIA ENZOOTICA

- Conium 30c, 3 veces al día por 3 días. (Debilidad incoordinación de miembros, dificultad al levantarse).
- Gelsemium sempervirens 200c, 3 veces al día por 3 días. (Tendencia a la recumbencia).
- Lathyrus sativa 30c, 3 veces al día por 4 días. (Movimientos espasmódicos acompañados por rigidez de músculos, dificultad para levantarse recto).
- Agaricus muscarius 6c, 3 veces al día por 3 días. (Dolor bajo, con tambaleo al andar)(26).

ATROFIA MUSCULAR

- Arnica montana 30c, 2 dosis cada 2 horas. En todos los casos.
- Gelsemium sempervirens 200c, 3 veces al día por 4 días. (Parálisis local del nervio, sin daño permanente).
- Gurare 30c, 3 veces al día por 4 días. (Parálisis muscular asociada con temblor de miembros posteriores y varios grupos musculares).
- Lathyrus sativa 200c, 3 veces al día por 5 días. (Atrofia de los músculos glúteos).
- Plumbum 1M, una dosis diaria por 7 días. (Parálisis generalizada, afectando varios grupos de músculos. Cascos hinchados. Remedio indicado para cuando se encuentran afectados los músculos extensores).
- Thallium 30c, 2 veces al día por 5 días. Parálisis de los miembros posteriores. Atrofia. Dolores recurrentes.
- Abrotanum 6c, 3 veces al día por 4 días, marcada emaciación de los miembros posteriores. Rigidez de las articulaciones.
- Acetic acid 6c, 2 veces al día por 7 días. Emaciación de los músculos acompañados de edema de cascós y piernas (26).

BABESIOSIS

- China officinalis 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Util en estados anémicos, ayuda a mantener la fuerza y control de pirexia).
- Ferrum arsenicum 6c, día y noche por 1 semana. Esplenomegalia y piel reseca.
- Phosphorus 200c día y noche por 4 días. (Hemorragias petequiales).
- Silicea 1M, 1 vez a la semana por 4 semanas. (Ayuda a la

restauración de células rojas y estimula la hemopoyesis)
(26).

BARROS, GRANOS

- Aconitum napellus
- Arsenicum album
- Solanum dulcamara
- Sulphur acid
- Rhus toxicodendron (35).

BLEFARITIS

- Mercurius solubilis y clematis
- Digitalis y Spigelia (párpado inflamado y borde enrojecido).
- Ignatia amara (inflamación en el párpado superior).
- Chamomilla (inflamación en el párpado inferior)(35).

BOTULISMO

- Empezar siempre el tratamiento con Clostridium nosode 3 veces al día por 3 días.
- Conium 30c, 3 veces al día por 3 días (parálisis ascendente, es necesario dar potencias ascendentes en intervalos cortos).
- Gelsemium sempervirens 200c, 3 veces al día por 3 días. (Debilidad y parálisis de la región de la cabeza).
- Plumbum metallicum 200c, día y noche por 5 días (parálisis acompañada por escalofríos de miembros posteriores y asociado con ataques de cólicos)(26).

BRADICARDIA

- Abies nigra 30c, 3 veces al día por 4 días (cuando hay disnea con sibilos de colocamiento en la garganta, tos frecuente)
- Veratrum viride 6c, 3 veces al día por 3 días. (ruido lento puede sentirse en algunos vasos superficiales, disnea y congestión pulmonar)
- Opium 1M, 3 veces al día por 3 días (estado de somnolencia, acompañado por constipación severa y estertores al respirar, superficie corporal caliente)
- Gelsemium sem. virgineum (23) 200c, día y noche por 4 días (ruido lento con movimientos espasmódicos de los músculos de la garganta, principalmente dificultad para tragar, signos viscerales predominan)
- Aconitum 6c, 3 veces al día por 3 días (disfunción cardíaca, disfunción renética, acción del corazón fuerte, signos primarios predominan)
- Arnica 6c, 3 veces al día por 3 días (ruido débil y lento, con rigidez muscular especialmente sobre la región lumbar)
- Procyonum 6c, 3 veces al día por 3 o 6 días (insuficiencia valvular y espasmos oscuros de membranas mucosas visuales)(20).

BRONQUITIS

- Aconitum napellus o gotas u 8 globulos, 3 veces al día (al comienzo de la enfermedad o los otros indican inflamación y tisis)(14).
- Aconitum napellus 6c, 3 dosis de 6 gotas (estado terrenal, signos febriles, expresión de ansiedad, piel seca)(26).

- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas (pulso total, dilatación de pupilas, sudoración y excitación)(26).
Atropa belladonna 4 gotas, 3 veces al día (cuando garganta esta afectada y existe mucosidad, el animal parece sofocarse si se presiona la garganta)(40).
- Antimonium tartaricum 30c, 3 veces al día por 3 días.
(Tos fuerte y seca, pleura llega a afectarse).
- Solanum dulcamara 6c, 3 veces al día por 3 días (puede deberse por lugares húmedos, la tos empeora después del ejercicio)(26).
- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días. (Tos fuerte y seca, pleura llega a afectarse. Alivio al presionar - área pulmonar)(26).
Bryonia alba, 4 gotas 3 o 4 veces al día (40).
- Kali bichromicum 200c, 3 veces al día por 3 días (flemas en tubos bronquiales con dificultad para expulsarlas, descarga nasal).
- Drosera rotundifolia 6c, 3 veces al día por 3 días (tos llega a ser de carácter espasmódico, paroxismos seguidos)
- Scuilla 6c, 3 veces al día por 4 días (tos acompañada - por coriza y demasiados estornudos, tos produce expectoración limosa ocasionada por alguna clase de ejercicio o al beber).
- Arsenicum iodatum 6c, día y noche por 4 días (casos crónicos con periodos de reposo alternados con ataques de tos. Usado en condiciones bronquiales)(26).
- Phosporus 6 gotas día y noche (si remedios anteriores no actúan, respiraciones ruidosas, el beber provoca tos y garganta llena de flemas)(40).
- Spongia 6c, 4 dosis tres veces al día (ataques de tos ocasionados al beber o comer empeora por exposición al -

aire frío) (26).

- Spongia 6 gotas dos veces al día (respiración es difícil y acompañada de un estertor) (40).
- Sulphur 30c, una vez al día por 5 días (dar como remedio constitucional cuando la recuperación toma lugar) (26).
- Arsenicum, 6 gotas u 8 glóbulos, 2 veces al día (si existe demasiado frío y el animal esta muy débil).
- Anemone pulsatilla, 4 gotas o 6 glóbulos cada 1, 2 o 3 - horas (si hay vómito, estremecimiento) (40).

BRUCELOSIS

- Brucellosis abortus y Brucellosis melitensis nosode 30c, día y noche por 3 días. El uso continuado de estos nosodes esta siempre indicado al principio del tratamiento.
- Hepar Sulphuris 30c, 4 dosis cada 3 horas (si es necesario continuar el tratamiento a intervalos regulares con potencias mayores o ascendentes. La brucelosis es una -- infección piogena, este remedio produce buenos resultados cuando la enfermedad esta acompañada de sensibilidad al frío y al viento, dolor en fistulas de la cruz).
- Silicea 200c, una vez al día por 7 días. Casos crónicos, formación de abscesos, tejido necrotico alrededor de fistulas.
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas (sinovitis aguda dolor, hinchazón y calor).
- Rhus toxicodendron 1M, día y noche por una semana (ligamentos articulares involucrados, mejora con el ejercicio)
- Eryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días (inflamación articular aguda y firme, empeora con el movimiento) (26)

BURSITIS

- Bryonia alba D4
- Ginkgo biloba D2 (D3) (si hay tendinitis)
- Symphytum D3 (D12) y Viscum album D4 o
- Symphytum D3 (D12) y Hekla lave D4 (combinación de bursitis, tendinitis y osteoporosis (56).

BURSITIS AGUDA

- Bryonia alba 30c 4 dosis cada 3 horas (en estados inflamatorios iniciales existe alivio con presión y empeora con el movimiento.
- Apis mellifica 6c 4 dosis cada 2 horas (Exceso de fluido formado por la inflamación).
- Hepar sulphuris 200c, 4 dosis cada 3 horas (Bursitis purulenta, extremadamente doloroso y sensible al tocar) -- (26).

BURSITIS DE LA ARTICULACION OCCIPITAL-ATLANTOIDEA

- Brucella abortus nosde 30c una vez al día por 3 días (Deberán darse el comienzo del tratamiento).
- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora (Darse en estados febriles tempranos).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas (Si la sinovitis de la articulación se sospecha en la etapa aguda, este remedio alivia el dolor y reduce el fluido en la articulación).
- Hepar sulphuris 30c, 4 dosis cada 2 horas (Util si se da en la etapa inflamatoria, mostrando extrema sensibilidad al dolor o cuando la supuración se estableció).
- Silicea 200c, una vez al día por 7 días (Util en los casos crónicos, una vez que hay fístulas presentes con el

desarrollo de canales turbulentos.

Externamente, compresas de loción de Hypericum y Celastrum (20).

ENFERMEDADES ESQUELÉNICAS

- Ruta graveolens 6c, 3 veces al día por 3 días (lesiones músculos flexores y tendones. Puede haber periostitis)
- Arnica 30c, 3 dosis, repetidas por 12 horas (dar como rutina)
- Apis mellifica 6c, 4 dosis durante 2 horas (sinovitis de la bolsa)
- Renouil acid 6c, 3 dosis durante 2 horas (Nefritis con irrit. ofensiva)
- Erugonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días (el animal se recupera al presionar sobre la región de la bolsa y los signos aparecen al movimiento)
- Salix purpurascens 30c, 3 veces al día por 3 días (articulación hinchada, involucrando áreas contiguas)
- Hypericum 11c, 1 vez al día por 2 días (Demo. en terminación nerviosa) (20)

ENFERMEDADES Oculares

- Salsaparilla fluorica 30c, 2 veces al día por 7 días, - también se usa con la misma dosis por 3 semanas. Muy útil por largos períodos. Es benéfico (inflamación)
- Apis mellifica 6c, 2 veces al día por 7 días (Forma vírica con exceso de fluido) (20).

BURSITIS EN EL TENDON DE EL MUSCULO GLUTEO MEDIO

- Apis mellifica 30c, 4 dosis cada 2 horas. (Sinovitis, edema de la bursa).
- Bryonia alba 30c, 4 dosis cada 2 horas (empeoran los signos al movimiento; alivio a la presión).
- Ruta graveolens 200c, día y noche por 3 días (tendencia a periostitis).

Nota: la posibilidad de infección por Prucella abortus como una causa de esta enfermedad no debe olvidarse. El uso de el nosode en el tratamiento ayudará considerablemente en este caso. (26).

CALLOS

- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas (darlo primeramente, como el callo usualmente se desarrolla debido a una lesión).
- Calcarea fluorica 30c, una vez a la semana por 4 semanas (este remedio ayudará a la absorción de tejido duro y promueve el crecimiento de tejido sano.)
- Silicea 30c, una vez al día por 10 días (En callos supurativos, este remedio controlará la infección y previene la necrosis del tejido) (26).

CARPITIS (MIEMBROS ANTERIORES)

- Ruta graveolens 30c, 3 veces al día por 3 días (Con--periostitis).
- Rhus toxicodendron 1M, una vez al día por una semana (Artritis leve, cuando el animal muestra mejoramiento al ejercicio).
- Calcarea fluorica 30c, día y noche por 3 días, seguido por una dosis diaria por 3 semanas (Desarrollo de exostosis).

- Silicea 200c, una vez al día por 10 días (Tejido fibroso se presenta en casos crónicos).
- Hekla lava 12c, 2 veces diariamente por 1 semana (26).

CATARATAS

- Silicea 200c, una vez a la semana por 4 semanas (ayuda a absorber tejido cicatrizal, usarlo cuando esta acompañado de úlcera corneal).
- Argentum nitricum 30c, una vez al día por 2 semanas. --- (Cuando es el resultado de una oftalmia aguda).
- Natrum muriaticum 200c, una vez al día por 2 semanas --- (Asociado con desgaste y sed a consecuencia de una nefritis crónica).
- Naphtaline 6c, en la mañana y noche por una semana (Retinitis y opacidad corneal).
- Phosphorus 200c, una vez al día por una semana (Opacidad muy blanca y edema periorbital, signos de disturbios del hígado pueden estar presentes).
- Externamente una aplicación de loción Cineraria ayudará pero deberá de continuarse por algún tiempo considerable (26).

CATARRO O RESFRIADO COMUN

- Aconitum napellus 6 gotas o 6 glóbulos cada 3 horas hasta que mejore (usarlo en el comienzo de la enfermedad, - si hay fiebre, inquietud, respiración apresurada, sed, - descargas nasales).
- Nux vomica, 6 gotas o 6 glóbulos, 2 veces al día. (Prevención de vientos, y si la boca esta seca, lengua blanquecina y alitosis, descarga nasal de agua o sangre).

- Solanum dulcamara, 6 gotas o 6 glóbulos dos veces al día. (Si fue producido por exposición a la humedad y el animal esta perezoso y somnoliento).
- Rhus toxicodendron, 4 gotas o 6 glóbulos 3 veces al día - (Tos seca, gran acumulación de moco nasal, estornudos e inquietud).
- Bryonia alba, 4 gotas o 6 glóbulos, 3 veces al día. (Si hay dificultad al respirar, tos seca y espasmódica, hinchazón de la nariz, coriza o costras de moco duro en nariz).
- Arsenicum album, 6 gotas, 2 veces al día. Si continúan -- descargas nasales por largo tiempo, ollares lastimados -- tos seca, estornudos con descargas de moco agudo).
- Mercurius vivus, 6 gotas o 6 glóbulos, 3 veces al día. -- (primer estado de enfermedad, si hay hinchazón de la nariz, coriza con demasiados estornudos).
- Anemone pulsatilla, 6 gotas o 6 glóbulos, 3 veces al día. (Si la tos es constante, descargas nasales con material -- fétido y verdoso, estornudos) (40).

CISTITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis en una hora (Estados febriles, cuando hay pulso y respiración rumentada) (26).
- Aconitum napellus 2 O 3 dosis en espacio de una hora (35).
- Cantharis 30c, mañana y noche en casos crónicos por una semana. Una dosis cada hora para 4 dosis. (Esfuerzos y -- escases de orina hay excitabilidad y signos de irritabilidad sexual) (26).
- Cantharis una dosis (35).
- Thlaspi bursa 6c, 3 veces al día por una semana (Cistitis crónica cuando la orina es de color ladrillo y sedimentos).

- Copaiva 6c, 3 veces al día por 3 días (Cistitis catarral moco en orina. "olor en el área de la vejiga y la orina presenta un olor dulzón).
- Nux vomica 30c, 3 veces al día por 2 días (Cuando hay in capacidad para orinar y se encuentra asociado problema - digestivo).
- Gamphor 6c, 4 dosis en cada hora (Colapso general, pulso lento y cuerpo frío).
- Cubebs 6c 3 veces al día por 3 días. (poliuria e inflamación catarral del tracto urogenital. Gran cantidad de moco en orina).
- Solanum dulcamara 30c 3 veces al día por 3 días (Cistitis catarral como resultado a una exposición al frío o - humedad. Orina contiene moco denso o sedimento purulento).
- Eucalyptus 6c, 4 veces al día con 3 horas de separación por un día. (Inflamación catarral aunque contiene sangre y nua la orina. Micción profusa).
- Eupatorium purpureum 6c, 3 veces al día por 3 días (El animal muestra preocupación al paso de orina la cual -- puede ser profusa y lechosa).
- Oleum santali 1x, 3 veces al día por una semana (Casos - crónicos. Orina muestra depósitos densos o terrales).
- Uva ursi 6c, 3 veces al día por una semana. (Estado crónico donde la orina esta delgada y acompañada de color y tenesmo).
- Sabina 6c día y noche por una semana (Orina con sangre. Dolor sobre la región del riñón y vejiga. Puede actuar - mejor en yeguas y potrancas cuando se presentan primero signos uterinos) (26).

- Aconitum napellus 6c, 3 dosis cada hora. (En etapa temprana de enfermedad, signos febriles).
- Arsenicum album 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Diarrea, Especialmente si las heces estan olorosas. Empeora despues de la media noche).
- Ipecacuanha 30c, 3 veces al día por 3 días. (Infección por protozoarios en el intestino, heces contienen abundante moco, pedazos de mucosa y sangre usualmente roja brillante).
- Achillea millefolium 6c, 3 veces al día por 3 días. --- (Acompañando hemorragias del tracto urinario y de la nariz).
- China officinalis 30c, 3 veces al día por 2 días. (Pérdida de fuerza despues de la pérdida de sangre).
- Mercurius corrosivus 200c, 3 veces al día por 3 días. - (Util para cuando se presentan tenesmos. Heces sangui-- nolentas, excesivo moco y ocurre más a menudo durante la noche) (26).

COLIBACILOSIS. INFECCION POR E. coli

- E. coli nosode 30c 3 veces al día por 2 días. El uso de este nosode ha dado buenos resultados, una peculiaridad es que funciona aún cuando no se ha preparado con la cepa de organismos causales de la enfermedad. La experiencia demuestra que la nosode hecha de diferentes cepas es efectiva.
- Arsenicum album 6c, 3 veces al día por 3 días. (Diarrea acuosa y teñida, excitación, sed, empeora despues de media noche).
- Ipecacuanha 30c, 3 veces al día por 2 días. (Casos menos agudos, heces menos acuosas, verdosas).

- Colchicum autumnale 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Signos de timpanismo y cólico).
- Colocynthis 6c, 2 dosis cada hora. (Dolor abdominal severo y evidente. El animal viendo sus flancos - autoauscultación).
- China officinales 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Heces mucosas profusas, gran debilidad).
- Mercurius corrosivus 200c, 3 veces al día por 2 días. -- (Forma de enteritis severa, deyecciones débilmente teñidas de sangre, salivación. Evacuaciones más frecuentes - durante la noche) (26).

COLICO

- Aconitum napellus (35), 4 gotas o 6 glóbulos cada 15 o - 30 minutos. (Al comienzo de la enfermedad) (40).
- Aconitum napellus 6c, una dosis cada hora para 4 dosis. -- (Al comienzo de la enfermedad) (26).
- Atropa belladonna (22) 1M, 4 dosis cada 2 horas (pulso rígido, sudoración, pupilas dilatadas, piel caliente) (26).
- Colchicum autumnale (35). 6c, 3 dosis cada hora (abdomen distendido y ruidos intestinales, animal tiende a permanecer de pie) (26). Colchicum autumnale, 6 gotas cada una o dos horas. (Si es causado por alimento verde y hay distensión y flatulencia abdominal) (40).
- Arsenicum album (2.), 6 gotas cada media, 1 o 2 horas -- (Si depende de una indigestión, alimento de mala calidad, beber agua fría o constipación intestinal) (40).
Después dar 2 o 3 dosis de Aconitum nap. Dan buen resultado alternándose los (35).

- Opium 4 gotas o 6 glóbulos cada 1, 2 o 3 horas (Si Nux vomica falla para quitar la constipación o si las heces están muy secas, duras y de un color oscuro. Si el animal permanece echado como si estuviera muerto):- (40).
- Cantharis, 6 gotas cada 1 o 2 horas (Si hay problemas de retención de orina, orina gotas) (40).
- Colocynthis (Cólico fuerte, el dolor viene por momentos) D4, inyección rápida junto con Chelidonium y Nux vomica) (22).
- Colocynthis 1M, 4 dosis cada 4 horas (Cólico espasmódico como resultado de la ingestión de alimento verde) (26).
- Nux vomica D4, inyección, de inmediato en la mayoría de los casos, darla junto con Chelidonium D3 y Colocynthis D4. (Inanetencia, dolor cortante, animal no defeca, es tómagο recargado, tenesmo intestinal y biliar) (22).
- Nux vomica (35), 6c, 4 dosis cada 2 horas (producido por alimento no digerido, esfuerzo al pasar orina, animal echado sobre un lado, mirando el flanco) (26).
- Nux vomica 6 gotas cada media, 1 o 2 horas (cólico causado por constipación, camina lento y de repente se deja caer, aparecen hinchados uno o ambos flancos) (40).
- Chelidonium majus D3, junto con Colocynthis y Nux vomica D4 en inyección. (Inanetencia, cólico con ictericia, problemas hepatofuncionales, recarga estomacal, mareo, también en Lentospirosis) (22).
- Ammonium causticum 6c, 4 dosis cada 2 horas (respiraciones laboriosas y cortas con descargas mucosas) Nota: En casos extremos agudos puede ser necesario administrar

- la medicina cada 10 o 15 minutos. Generalmente 5 o 6 dosis son suficientes (26).
- Chamomilla (vientre abultado) (35). La sustancia de elección en potros y en un cólico hipersensible, el animal muestra dolor e inquietud (22).
 - Chamomilla, 6 gotas cada 1 o 2 horas (de acuerdo a la severidad, si intestino está relajado, si el animal está muy inquieto, dolor seguido de evacuar, --- abdomen inflamado y extremidades frías)(40).
 - Hyoscyamus niger (retención de orina) (35). Trastornos en la masticación, hipersensibilidad a la luz y --- ruido, debilidad y parálisis, miedo al agua, temblores, rechinar de dientes, dificultad para tragar (22).
 - Plumbum aceticum (consticción intestinal, paresis -- intestinal y biliar, meteorismo, flatulencia, piel externa fría, inquietud, hipersensibilidad táctil) - (22).
 - Rhus toxicodendron (22). Util en inflamación abdominal (35).
 - Lachesis (22).
 - China (Tenias)
 - Marum verum (tenias)
 - Cina, Mercurius solubilis y absinthium (lombrices)
 - Digitalis, Ignatia amara (ascarides)
 - Valeriana (Oestrus) (35).

COLITIS

- Arsenicum album 1M, 4 o 5 dosis cada hora.
- Arnica montana 30c, 4 dosis cada hora (cólico y tránsito de sangre roja brillante).
- Baptisia 200c, 3 veces al día por 3 días (signos tím

pánicos, especialmente del lado derecho. Puede haber flatulencia, heces oscuras y agudas). --

- Mercurius corrosivus 200c, 4 dosis cada 2 horas (heces con moco limoso y mucosa intestinal. Signos empeoran en la noche. Cólico severo) (26).

CONGESTION PULMONAR

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora (remedio preliminar tan pronto como la condición es sospechada).
- Ammonium causticum 6c, 3 veces al día por 3 días (incrementa el moco y la tos húmeda, agotamiento y debilidad muscular).
- Atropa belladonna 200c, 4 dosis cada 2 horas (piel -- caliente y seca, pupilas dilatadas, excitabilidad, -- pulso pleno).
- Ferrum phosphoricum 6c, 3 veces al día por 3 días -- (Hemoptisis y la condición decrece en severidad como la noche aparece).
- Veratrum viride 6c, 3 veces al día por 2 días (Congestión acompañada por orina escasa, pulso rápido).
- Apis mellifica 30c, en la mañana y noche por 4 días. Severo edema pulmonar, acompañada por expansión del edema en el área laríngea. (26).

CONJUNTIVITIS

- Aconitum napellus 6c, cada 4 horas para 4 dosis (Estado temprano mostrando signos febriles).
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas (pupilas dilatadas, pulso rápido, animal excitado).
- Euphrasia 6c, 3 veces al día por 2 días (lagrimación profusa y fotofobia).

- Mercurius solubilis 30c, 3 veces al día por 2 días (de cargas purulentas con tinte verduzco, salivación, puede haber diarrea).
- Nux vomica 6c, 3 veces al día por 2 días (trastornos digestivos acompañan la condición).
- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas (Cuando el origen fue por una herida o lesión).
- Hypericum LM, 4 dosis cada 2 horas (signos de dolor, vasos conjuntivales congestionados).
- Externamente una loción de Hypericum y Calendula, usado en una potencia de 1 en 10, promueven rápidamente alivio (26).

CONSTIPACION

- Nux vomica 6c, 3 dosis cada 2 horas (cuando hay indigestión y son casos leves). Animales sujetos a casos crónicos dar 1 M mañana y noche por 2 días.
- Sulphur acid 6c, (Abdomen sensible a la presión y signos de cólicos se presentan después de beber. Este medicamento puede ser muy útil si se combina con Nux vomica y se dan alternados).
- O-ium LM, 2 dosis cada 2 horas (Somnolencia y carece de esfuerzo abdominal. Animal se presenta en recumbencia).
- Hydrastis 30c, 3 veces al día por 3 días (Estado general catarral, rigidez de la región lumbar, disfunción hepática e ictericia).
- Alumina 200c, 3 veces al día por 3 días (sangrado rectal esfuerzo seco y dificultad para pasar orina).
- Magnesia muristica 6c, 3 veces al día por 3 días (Disfunción hepática, lengua amarillenta y otros signos de ictericia, heces peuosas y desmoronables).

- Collinsonia 6c, 3 veces al día por 4 días (animales jóvenes con tendencia a prolapso rectal, con posible irritación anal y flatulencia).
- Erionia alba 6c, 3 veces al día por 3 días (Heces duras grandes con sangre, especialmente en animales jóvenes).
- Peraffinum 6c, 3 veces al día por 4 días (Esfuerzo, particularmente en potros y caballos jóvenes) (26).

CONTRACCION DE FLEXOR DIGITAL SUPERFICIAL

- Ruta graveolens 6c, 3 veces al día por una semana (afectado periostio, si la condición es adquirida debido a una lesión).
- Rhus toxicodendron 1M, día y noche por 4 días (Contracción companda por calor y sensibilidad al dolor, mejora con el ejercicio).
- Arnica montana 30c, 2 dosis durante 12 horas (Condición asociada con lesiones y shock).
- Externamente, la aplicación de loción de Arnica y Ruta es benéfico (26).

CONTUSION, GOLPE (EN MIEMBROS)

- Arnica montana (internamente y externamente) (35). Es el mejor remedio para este problema y se usa igual que Clendula, con la excepción si el sujeto es irritable y excitado fácilmente o si la herida está en la cabeza. La loción de Arnica debe ser usada diluida en 30 partes de agua la tintura de arnica y después lavar las partes afectadas (40).
- Squilla y Aconitum napellus (inflamación extensa).
- Acidum phosphoricum y Arsenicum album (Si hay dolor) -- (35).

CONTUSION DEL GLOBO OCULAR

- Arnica montana 30c, 2 dosis con un lapso de 3 horas. (Darla después del daño).
- Hypericum LM, 3 veces al día por 2 días (intenso dolor asociado con herida en nervios y estructuras blandas).
- Externamente, una loción hecha de Calendula e Hypericum será benéfico ayudando a la acción de los remedios internos. La dilución será 1 en 10 y aplicarla 2 o 3 veces al día hasta que se presente mejoramiento (26).

CORIZA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora (animal sediento, fiebre, mucosas secas y calientes, usarlo en estadios tempranos).
- Arsenicum album LM, 4 dosis cada 2 horas (párpados hinchados, descarga color café, sed, empeora después de la medianoche).
- Allium cepa 6c, 4 dosis cada hora (descargas acuosas, ojos irritados, lagrimación y fotofobia).
- Hepar sulphuris 200c, 3 veces al día por 2 días (ulceración de ollares, descarga gruesa y purulenta, mal oliente, sensible al dolor, estornudos).
- Natrum muriaticum LM, 4 dosis cada 2 horas (descargas blancuecinas de apariencia albuminosa, estornudo violento).
- Hydrastis 30c, 3 veces al día por 2 días (descarga catarral blanda).
- Kali bichromicum 200c, 2 veces al día por 5 días (descarga crónica con tendencia a ser gruesa y dura).
- Mercurius dulcis 6c, 4 veces al día por 1 día (involucrada la garganta, descarga nasal verdosa y delgada)

- Silicea 200c, una vez al día por 6 días (descarga delgada, grisácea, asociada con cerias del septo nasal y estructuras vecinas, formación de costras dentro de la nariz) (26).

DACRIOCISTITIS

- Iodum 6c, día y noche por una semana (Caso agudo con dilatación de pupilas, globo ocular en constante movimiento, profuso lagrimeo).
- Silicea 200c, una vez al día por 5 días (Inflamación del saco acompañado con una condición similar del ducto, asociado con úlcera corneal).
- Fluoric acid 30c, día y noche por 2 semanas (asociado con fístula lagrimal).
- Natrum muriaticum 200c, una vez al día por 10 días. (tendencia a estenosis de el ducto lagrimal) (26).

DAÑOS EN LOS OJOS.

- Arnica montana en forma de loción (1 parte de Arnica en 3 partes de agua), lavar el ojo 3 veces al día y dar internamente 6 gotas, 2 veces al día (si fue producido por una causa mecánica).
- Aconitum napellus, 6 gotas 3 veces al día hasta que la inflamación disminuya.
- Atropa belladonna y Conium alternados, 6 gotas o 6 glóbulos en la mañana y noche (si hay alguna opacidad o se presenta borroso el ojo izquierdo). Algunas veces la paja o heno, cáscaras, etc. pueden penetrar al ojo y causar irritación, lo primero será quitar la causa inicial de la condición y después aplicar la loción de Arnica. (40).

DEFICIENCIA DE CALCIO

- Calcarea phosphorica 30c, día y noche por 2 semanas --
(Util para restablecer l. salud y metabolismo del calcio) (26).

DEFICIENCIA DE COBRE

- Cuprum metallicum 200c, una vez al día por una semana.--
Después dar una dosis 2 veces r 1: semana por 4 semanas (26).

DEFICIENCIA DE IODO

- Iodum 6c, debe darse 2 veces diariamente por una semana pero si es necesario continuar el tratamiento por periodos largos dependiendo de la respuesta.
- Kali hydriodicum 12x. El yoduro de potasio es una preparación conveniente para glándulas (26).

DERMATITIS

- Arsenicum album 1M, una dosis por día por 10 días (dermatitis seca, animal sediento e inquieto, empuja después de medianoche).
- Rhus toxicodendron 1M, una dosis 3 veces al día por 2 - días (Se forman vesículas en estado temprano eritematoso y ardidez de la articulación).
- Antimonium tartaricum 30c, una dosis en la mañana y noche por 2 días (formación vesicular en estado temprano, signos respiratorios a veces (compañer la condición).
- Arnica montana 30c, 2 dosis, una cada 2 horas -- de shock en estado temprano).
- Aconitum napellus 6c, 4 dosis, una dosis cada 2 horas -- (signos febriles y toxemia).
- Thuja occidentalis 200c, una dosis por día por 2 semanas --

(Estado crónico, mostrando engrosamiento de la piel) (26).

DERMATITIS ALERGICA

- Arsenicum album 30c, una vez al día por 10 días (Debe darse en potencias altas progresivas).
- Sulphur iodatum 6c, 3 veces al día por una semana (útil en casos largos, mostrando una tendencia a infección secundaria).
- Hepar sulphuris 200c, día y noche por una semana (indicado si los folículos pilosos están infectados y hay supuración. Util cuando las lesiones son sensibles al ser tocadas).
- Meserum 30c, 3 veces al día por 2 días, seguido por una dosis diaria por 5 días (este remedio se encuentra útil en casos descuidados donde se desarrolló la formación de costras circundando la lesión) (26).

DERMATITIS MICOTICA - ESPOROTRICOISIS

- Sepia 30c, una vez al día por 2 semanas.
- Bacillinum 200c 3 dosis una vez a la semana.
- Arsenicum album 1M, una vez al día por 10 días (puede combinarse con otros remedios).
- Calcarea iodata 200c, una vez al día por 5 días (Cuando la condición esta combinada con inflamación de las glándulas asociadas).
- Silicea 200c, una vez al día por una semana (cuando los nodulos arrojen pus y las úlceras tardan en cicatrizar) (26).

DERMATITIS PUSTULAR CONTAGIOSA. AGNE CONTAGIOSO

- Arsenicum album 1M, una vez al día por una semana (animal muestra inquietud y sed, empeora a la medianoche).
- Antimonium crudum 6c, 3 veces al día por 3 días (acompañado de síntomas gástricos, la comezón empeora con el calor).
- Hepar sulphuris 200c, día y noche por 5 días (tendencia a supurar).
- Sulphur acid 6c, día y noche por 3 días (buen remedio para ser usado como un constitucional y ayuda a la eliminación de toxinas puede combinarse con otros medicamentos).
- Sulphur iodatum 6c, día y noche por 10 días (afecciones intermitentes de la garganta, piel roja con comezón) -- (26).

DERMATOMICOSIS-TIÑA

- Hydrocotyle 6c, día y noche por una semana (cuando hay costras en el tronco, hay exfoliación de costras de la piel).
- Bacillinum 200c, 3 dosis una vez por semana (piel seca y áspera. Darlo como un remedio constitucional).
- Sanic 1M, 4 dosis una vez a la semana (asociado con olor desagradable).
- Pix liquida 6c, día y noche por una semana (tendencia a alopecia, erupciones costras y pruríticas) (26).

DESHIDRATACION

- China officinalis 30c, 3 veces al día por 3 días. Ayuda a restablecer la fuerza y promueve el regreso a una condición física normal (26).

DIABETES INSIPIDA-POLIURIA

- Phosphoric acid 6c, 3 veces al día por 5 días, (Poliuria empeora en la noche. Orina contiene fosfatos y tiene apariencia lechosa).
- Acetic acid, 6c, 3 veces al día por 5 días (Sed excesiva y debilidad, signos abdominales como ascitis).
- Alfalfa 1x, 4 veces al día por 3 días (incremento en la cantidad de urea y fosfatos en la orina, poliuria).
- Uranium nitricum 6c, 3 veces al día por 5 días (incremento en azúcar en la orina y flujo, emaciación e hidropesía).
- Argentum metallicum 30c, día y noche por 3 días (orina turbia con olor dulzón).
- Eupatorium purpureum 6c, 3 veces al día por 2 días (orina con apariencia lechosa y puede contener sangre).
- Helonias 6c, 3 veces al día por 4 días (orina albuminosa profusa y clara. Este remedio está indicado especialmente en yeguas y potrancas).
- Sinapis nigra 6c, 4 veces al día por un día (26).

DIARREA

- Mercurius corrosivus 200c, 4 dosis cada 2 horas (evacuación limosa y puede contener pequeñas cantidades de sangre, la condición a menudo empeora en la noche) (26).
- Arsenicum album 1M, 4 dosis cada 2 horas (evacuación pálida, excoriación en piel alrededor del ano, dolor abdominal, heces pestilentas, debilidad, empeora en la noche) (26).
- Arsenicum album 6 gotas u 8 glóbulos (por ingestión de alimento verde o putrefacto y las descargas son agudas con o sin dolor) (40).

- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días (provocada por vientos fríos o cambios de temperatura o por beber gran cantidad de agua fría) (26).
- Bryonia alba, 6 gotas u 8 glóbulos cada 3 o 4 horas - (si hay diarrea y constipación o por cambios repentinos de temperatura) (40).
- Nux vomica 6c, (sobrealimentación o alimento no digerible, diarrea precedida por ataques de cólicos) (26).
- Sulphur y Arsenicum, 6 gotas o 3 glóbulos cada 3 o 4 horas (pueden darse alternados, si las evacuaciones contienen sangre. En casos crónicos) (40).
- Carbo vegetabilis, 6 gotas u 8 glóbulos cada 4 o 6 horas (si evacuaciones son muy ofensivas) (40).
- Chromomilla, 6 gotas u 8 glóbulos cada 3 o 4 horas --- (si hay inflamación del abdomen, evacuaciones verdosas y el animal esta inquieto).
- Anemone pulsatilla, 6 gotas u 8 glóbulos 3 o 4 veces al día (si las evacuaciones son frecuentes, flatulencia) (40).
- Solanum dulcamara 200c, 4 dosis cada 2 horas (diarrea por exposición a humedad, heces verdosas, prevalece en verano, cambios de temperatura) (26).
- Solanum dulcamara, 6 gotas u 8 glóbulos, 3 o 4 veces al día (evacuaciones son agudas y acompañadas con cólicos) (40).
- Colocynthis 6c, 4 dosis cada media hora, seguido de 2 dosis (una cada 4 horas) (dolor abdominal, animal hechado, alimento y aguas producen heces limosas, auto_uscultación) (26).
- Colocynthis 6gotas cada 1, 2 o 3 horas (se aproxima a

- disenteria, cólico y las evacuaciones consisten de moco y sangre) (40).
- Croton tiglium 6c, 3 veces al día por 2 días (diarrea - severa, expulsión al moverse) (26).
 - China officinalis 30c, 3 veces al día por 3 días (útil en casos crónicos, debilidad debido a la pérdida de líquidos corporales) (26).
 - China officinalis, 6 gotas u 8 glóbulos, 3 o 4 veces al día (si la diarrea es de carácter intermitente) (40).
 - Podophyllum 6c, 3 veces al día por 3 días (casos crónicos, heces líquidas y fétidas, empeora en la mañana, -- puede haber prolapso rectal, útil en animales jóvenes) (26).

DISENTERIA

- Aconitum napellus 6c, 3 dosis cada hora (signos febriles, pulso rápido y expresión ansiosa).
- Mercurius cerosus 6c, 3 veces al día por 2 días (salivación empeora en la noche).
- Ipecacuanha 30c, 3 veces al día por 3 días (partículas de alimento en heces, tos).
- Arsenicum album 1M, 4 dosis cada 3 horas (animal inquieto, evacuaciones aguadas y descoloridas, sangre en heces empeora a la medianoche).
- Colocynthis 6c, 4 dosis cada 2 horas (cólico, inquietud, distensión abdominal, animal se encuentra echado, autoscultación).
- Phosphoric acid 30c, 4 dosis cada 2 horas (animales jóvenes muestran signos agudos, animal delgado, puede mostrar irritación en piel).
- Alce 200c, 3 veces al día por 2 días, heces gelatinosas,

grumosas con sangrado rectal, flatulencias, regón hepática sensible).

- Cantharis 6c, 4 dosis cada 3 horas (Tenesmos excesivos, heces con moco y sangre, pequeñas gotas de sangre en orina).
- Trombidium 30c, 3 dosis cada 2 horas (dolorertes y después de defecar, evacuación después de comer, heces escasas con esfuerzo). (26).

DISTENSION DEL TENDON

- Arnica montana externamente y Rhus toxicodendron internamente (35).

DURINA

- Apis mellifica 6c, 3 veces el día por 5 días (edema genital, placas edematosas en la piel).
- Urtica urens 6c, 3 veces al día por 5 días (comezón acompañada la formación de áreas edematosas)
- Rhus toxicodendron 1M, 4 dosis cada 3 horas (piel del escroto llega a estar eritematosa, comezón con hinchazón).
- Conium 200c, día y noche por una semana (parálisis. -- Este remedio ayuda a prevenir la atrofia del cuarto trimestre) (26).

ECIMPSIA - TETANIA A LA LACTACION DE YEGUAS

- Suplementar el uso de inyecciones de calcio, que normalmente promueve la recuperación.
- Calcarea carbonica 200c, 4 dosis durante cada hora (especial para yeguas gordas que presentan abundante sudoración).
- Magnesium phosphoricum 6c, 4 dosis durante cada hora --

- (Puede usarse alternado con el anterior, para casos asociados con hipomagnesemia).
- Cuprum metallicum 6c, 4 dosis durante cada 2 horas (útil para el control de músculos acalambrados, asociados con rigidez).
 - Atropa belladonna 1M, 4 dosis durante cada hora (indicada en casos convulsivos, animal muestra excitación, pupilas dilatadas, cabeza la sacude y el pulso es intenso).
 - Agaricus muscarius 6c, 4 dosis durante cada 2 horas (cuando los animales tienden a dejarse caer o irse de lado. - Si se de temprenamente puede prevenir las convulsiones).
- (26).

ECZEMA

- Suplhur acid 30c, día y noche por 5 días. (lesión roja y - apariencia humeda, comezón intensa, empeora con el calor).
- Arsenicum album 1M, una vez al día por 2 semanas (Eczema - seco. Animal se encuentra sediento y busca el calor, signos empeoran a la medianoche).
- Rhus toxicodendron 1M, una vez al día por 5 días (condición es vesicular y prurítica, la rigidez se mejora al movimiento).
- Bovista 6c, 3 veces al día por 4 días (erupción granulosa con formaciones de costras y dolor anormal).
- Anitmonium crudum 6c, día y noche por 3 días (Eczema acompañado de trastorno estomacal. Empeora en la noche).
- Anacardium 200c, día y noche por 5 días (Nerviosismo, piel rojiza con mucha comezón, erupción vesicular).
- Petroleum 200c, día y noche por una semana (erunciones ampulosas con tendencia a supuración de piel agrietada la cual sangre facilmente. Piel usualmente seca).
- Psorinum 30c, día y noche por una semana (piel seca, brillante con prurito severo, las glándulas linfáticas aso----

- ciadas estan hinchadas, algunas veces en la piel gruesa hay ulceración, la cual cicatriza lentamente, olor desagradable acompaña el eczema).
- Graphites 6c, 3 veces al día por 3 días (descargas de fluido color miel y pegajoso).
 - Gantharis 200c, día y noche por 5 días. (Eczema vesicular severo. Hematuria)
 - Kali arsenicum 30c, día y noche por 10 días. (En estados crónicos severos, el prurito empeora con cambios de temperatura. Lesión seca y escamosa)(26).

EDEMA

- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 3 días. (Principal remedio en estados edematosos si la actividad de la inflamación pasiva es en afecciones crónicas de pleura).
- Antimonium tartaricum 30c, 4 dosis cada 2 horas (edema afecta el tejido pulmonar, asociado con gran incremento de moco).
- Prunus spinosa 6c, 3 veces al día por 3 días. (Usado en anasarca y partes dependientes como pies y miembros).
- Digitalis 6c, 3 veces al día por 5 días (indicado si hay acción débil del corazón)(26).

EDEMA ANGIONEUROTICO

- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Util para inflamación edematosa, aparece alrededor de los ojos).
- Hypericum 1M, 4 dosis cada 3 horas (indicado en casos asociados con prurito subcutáneo y tendencia a fotosensibilización).
- Urtica urens 6c, 4 dosis cada 3 horas (indicado cuando la hinchazón está caliente y prurito, hay urticaria general).

- Vespa 30c, 4 dosis cada 3 horas (remedio útil cuando están involucrados y confinados el área de los ojos y cara, garganta y boca severamente hinchadas).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 2 días (útil cuando la inflamación edematosa está infiltrada con sangre como un resultado de hemorragias color púrpura).
- Antipyrine 6c, 3 veces al día por 3 días (asociado con intenso prurito y urticaria) (26).

ENCEFALITIS

- Aconitum napellus (35) 6c, 4 dosis cada hora. Darse en estados febriles (26). Aconite 6 gotas cada 20 minutos - hasta que los signos violentos hayan cesado (si es al comienzo de la enfermedad y el pulso está acelerado, fígado, congestión cerebral, temblores del cuerpo) (40).
- Atropa belladonna (35), 1M, 4 dosis cada hora (pulso plano, pupilas dilatadas y piel caliente) (26).
- Atropa belladonna 6 gotas puestas sobre la lengua cada 15 o 30 minutos hasta que la violencia del ataque haya cedido (estado furioso, mirada fija, e inconsciencia que indica una congestión violenta del cerebro) (40).
- Delphinium ajacis 30c, 4 veces al día por 2 días (cuando signos de vértigo aparecen: tambaleo, ojos abiertos, iridodilatación de la pupila, temblores musculares, puede haber trastornos abdominales).
- Hyoscyamus niger 200c, 3 veces al día por 3 días (sacudimiento de cabeza, temblores musculares, puede haber trastornos abdominales), mostrando una tendencia a repetirse, el animal queda intranquilo después del acceso).
- Aethusa 30c, 3 veces al día por 3 días (fotofobia y signos agudos abdominales).

- Camphora 6c, 4 dosis cada 2 horas (superficie corporal llega a estar fría y hay tendencia a colapso, heces líquidas pueden acompañar la condición)
- Cannrum aceticum 6c, 4 dosis cada 3 horas (tenesmos violentos, dificultad al respirar y mueve la lengua adentro y fuera de la boca)
- Solanum nigrum 30c, 3 veces al día por 3 días (asociado con coriza y signos de ojos tales como dilatación y contracción de pupilas)
- Zincum metallicum 6c, 3 veces al día por 3 días (tendencia a mover la cabeza de un lado a otro, hiperexcitabilidad e hiperestesia)(26)
- Veratrum album (35) o gotas sobre la lengua cada 15 o 30 minutos hasta que el ataraxia cede. Si piernas y orejas están frías, heladas y hay temblores en todo el cuerpo (40)
- Opium 6 gotas cada media, 1 o 2 horas de acuerdo a las circunstancias (si después de el proximo el animal permanece inmóvil, con ojos fijos y lengua de un color negro)(40).

ENCEFALOMIELITIS VIRAL

- Aconitum napellus 6c, 1 dosis cada hora para 4 dosis (dar en estado virémico)
- Hyoscyamus niger 30c, 3 veces al día por 3 días (ayuda al control de hipersensibilidad y signos nerviosos)
- Agaricus muscerius 6c, 3 veces al día por 3 días (vértigo y depresión)
- Strychninum 200c, 3 veces al día por 3 días (temblores musculares)
- Opium 200c, 2 veces en 24 horas (atacos inconcientes, asociados con parálisis de movimientos intestinales)

- Plumbum metallicum 30c, día y noche por 4 días (estado general paralítico, empeora en la noche. Extrema hiperestesia, asociado con ataques de dolor).
- Gelsemium 200c, 3 veces al día por 2 días. Seguido por una dosis semanal de potencia 1M por 3 semanas. (Parálisis de cabeza y lengua son los signos predominantes).
- Conium 30c, 3 veces al día por 3 días. Si se encuentra necesario el uso de elevar la potencia después de un intervalo. (Parálisis ascendente, iniciando en los miembros posteriores)(26).

ENDOCARDITIS

- Calcarea fluorica 30c, día y noche por 5 días (depósitos de fibrina en válvulas y promueve su absorción este remedio).
- Lycopus 30c, día y noche por 5 días (palpitación acompañada de pulso débil e intermitente, sonidos cardiacos intensos, tos sonora puede estar presente).
- Naja 6c, 3 veces al día por 4 días (lesión ocurre después de una enfermedad bacteriana o viral, indicado para ambos casos: agudo y crónico. Pulso irregular y cuerpo frío).
- Convallaria 6c, 3 veces al día por 5 días (pulso extremadamente rápido e irregular, predomina estasis venosa).
- Adonis vernalis 6c, 3 veces al día por 5 días. (Si se sospecha de enfermedad reumática con signos de vértigo, se sospecha plétora venosa).
- Kalmia 6c, 3 veces al día por 1 semana. (Acción cardiaca tumultuosa, involucrados frecuentemente los riñones, signos de dolor en la región izquierda del hombro).
- Aconitum napellus 6c, 5 dosis cada 2 horas. (Pulso pleno pulsaciones de arterias carótidas, ansiedad con intran-

ouillidad y signos de dolor).

- Cactus grandiflorus 6c, 3 veces al día por 1 semana (insuficiencia de válvula mitral, puede estar frío y sudoroso, signos de dolor al moverse, presión sanguínea baja y sonidos cardiacos estan aumentados).
- Spigelia 6c, 3 veces al día por 4 días. (Disnea principalmente. Animal con tendencia a echarse sobre el lado derecho debido al dolor que produce el área izquierda a la altura del hombro, el mínimo movimiento agrava la condición)(26).

ENDOMETRITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. Dar en estadios tempranos, estados febriles. Animal ansioso e inquieto
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas. Casos agudos, pulso lleno, dilatación de pupilas piel caliente y pastosa.
- Echinacea angustifolia 6x, 2 dosis cada 2 horas. Fiebre puerperal o septicemia en aborto o retención de placenta.
- Sabina 6c, 3 veces al día por 4 días. (Descargas de sangre brillante, grumosa o coagulada. Util en abortos, orina teñida de sangre).
- Secale cornutum 30c, 3 veces al día por 4 días. (Metritis puerperal después del aborto, descargas de sangre oscura y fluida).
- Arsenicum album 200c, 1 dosis al día por 10 días. (Endometritis crónica cuando el cervix esta particularmente afectado y empieza a inflamarse).
- Sulphur acid 200c, 1 dosis semanal por varias semanas (3) Util en casos crónicos combinado con otros remedios. Nota: Esta condición esta frecuentemente asociada con infección estreptococica. Prevención combinando el tratamiento con

Strptococcus Nosode, 1 dosis el día por 3 días (26)

ENFERMEDAD AFRICANA EQUINA

- Aconitum napelleus 6c, 4 dosis cada hora. En estados febriles iniciales.
- Antimonium tartaricum 30c, 3 veces al día por 3 días. Signos pulmonares, risnes y tos.
- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 2 días. Estados edematosos.
- Kali bchromicum 200c, 3 veces al día por 3 días. Descargas nasales amarillentas.
- Phos-horus 200c, 3 veces al día por 2 días. Hemorragias peteciales en membranas mucosas.
- Conium 200c, 3 veces al día por 2 días. Incoordinación a la marcha, debilidad de cuartos posteriores. Nota: Un nosode puede ser hecho de la sangre infectada, el virus está presente en la corriente sanguínea del primer día hasta los signos clínicos. Puede ser usada profiláctica y terapéuticamente (26).

ENFERMEDAD DE BORNA

- Hyoscyamus niger 30c, 3 veces al día por 3 días (Hiperestesia con sacudimiento de cabeza)
- Strychninum 200c, 3 veces al día por 3 días (temblores musculares con tendencia a rigidez muscular)
- Selenium 200c, día y noche por 3 días (predomina parálisis motora en la región del cuello).
- Conium 200c, día y noche por 4 o 5 días (Parálisis de miembros posteriores mostrando una tendencia ascendente).
- Americus muscerius 6c, 3 veces al día por 3 días (la-situd, hiperestesia y vértigo)(26).

ENFERMEDAD NAVICULAR

- Bryonia alba 200c, 4 dosis cada hora. (Caso agudo, estado inflamatorio).
- Ruta graveolens 200c, 2 veces al día por 3 días. (Periostitis presente).
- Apis mellifica 30c, 4 dosis cada hora. (Se sospecha de sinovitis).
- Calcarea fluorica 30c, 1 vez a la semana por 4 semanas. (Casos establecidos. Este remedio ayudará al control de exostosis y cambios en el hueso).
- Silicea 200c, 1 vez al día por 5 días. (Adhesión de tejido fibroso en la bolsa).
- Brucella abortus nosode 30c, 1 vez a la semana por 3 semanas. (Deberá darse como rutina junto con otro remedio indicado).
- Hepar sulphuris 200c, día y noche por 2 días. (Casos agudos, estado inflamatorio. Este remedio será también benéfico en bursitis establecida, si hay problemas de brucelosis implicados)(26).

ENFERMEDAD PIRAMIDAL

- Calcarea fluorica 30c, 1 vez a la semana por 4 semanas.
- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas.
- Ruta graveolens 200c, día y noche por 4 días. (Ayuda al control de periostitis).
- Silicea 30c, 1 vez al día por 2 semanas (figrosis).
- Externamente unguento de Ruta y Arnica ayudará en los estadios tempranos (26).

ENFERMEDAD DEL POTRO PURA SANGHE

- Asociada con interferencia del cordón umbilical suprimiendo el aporte sanguíneo al potro.

- Agaricus muscarius 6c, 5 dosis cada hora. (Dar en la sos pecha de desarrollo de la enfermedad).
- Atropa belladonna 1M, 5 dosis cada hora. (Convulsiones y el potro puede golpear la cabeza en el piso).
- Datura stramonium 1M, 1 dosis cada 2 horas, dar 4 dosis solamente, también cuando ocurren ataques.
- Opium 200c, 2 dosis separadas por 4 horas. (Para estado comatoso. Animal usualmente vive perfectamente inmóvil).
- Hyoscyamus niger 200c, 2 dosis separadas por 3 horas. (Cuando sobreviene ceguera y los signos nerviosos aparecen tempranamente tal como sacudidas de cabeza y movimientos sin propósito)(26).

ENFERMEDADES VALVULARES (ESTENOSIS E INSUFICIENCIA VALVULAR)

- Lycopus 6c, 3 veces al día por 4 días. (Acción tumuctuosa del corazón, acompañada con tos y sangre).
- Naja 6c, 3 veces al día por 5 días. (Usarlo después de enfermedades infecciosas, pulso irregular y cuerpo frío).
- Adonis vernalis 6c, 3 veces al día por 5 o 6 días. (Plétora venosa con signos asmáticos y palpitación).
- Crataegus 6c, 3 veces al día por 6 o 7 días. (Debilidad de músculos del corazón con pulso lento y débil).
- Spongia tosta 6c, 3 veces al día por 6 días. (Insuficiencia valvular con dificultad al respirar y ansiedad, tos seca y fuerte, venas periféricas están prominentes).
- Spigelia 6c, 3 veces al día por 5 días. (El movimiento agrava y el animal se echa en el lado derecho, dolor y sensibilidad es evidente en el área del hombro izquierdo).
- Strophanthus 6c, 3 veces al día por 5 días. (Debilidad de músculos cardíacos, insuficiencia y signos urinarios).

- Convallaria 6c, 3 veces al día por 7 días. (Pulso rápido e irregular).
- Laurocerasus 6c, 3 veces al día por 5 días. (Insuficiencia mitral, membrana mucosa bucal y fosas nasales cianóticas y oscuras)(26).

ENFLAQUECIMIENTO

- Arsenicum album
- Nux vomica
- China
- Sulphuris, Magnesia carbonica, Yodum y Sulphur (Casos crónicos)(35).

ENFRIAMIENTO

- Aconitum napellus
- Solanum dulcamara (35)

ENGROSAMIENTO DE LA PARTE POSTERIOR DEL HUESO TARSO-PERONEO

- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas. (Condición debido a violentos ejercicios, contusiones o lesiones).
- Rhus toxicodendron 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Estadio de inflamación aguda, especialmente si hay mejoría al ejercicio).
- Ruta graveolens 200c, día y noche por 3 días. (Periostitis. Ayuda a prevenir la deposición de hueso nuevo).
- Silicea 200c, 1 vez al día por 5 días. (En casos crónicos este remedio acelerará la absorción de tejido cicatrizal).
- Externamente la aplicación de Arnica, Ruta y Rhus linimentos pueden ser benéficos (26).

ENTERITIS

- Aconitum napellus (35) 6c, 4 dosis, 1 cada hora. (Estados tempranos, animal inquieto y ansioso)(26).
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Pulso aumentado, pupilas dilatadas, nariz internamente se encuentra enrojecida, conjuntiva descolorida).
- Mercurius corrosivus 30c, 4 veces al día con separación de 3 horas. (Sed y salivación, heces con hilos de sangre, transpiración fría).
- Arsenicum album 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Animal sediento, toma en pequeñas cantidades, inquieto, pulso débil y fino, signos empeoran después de medianoche, piernas y orejas frías, olor cadavérico).
- Colocynthis 6c, 4 veces al día con separación de 3 horas por 2 días. (Gran dolor, animal echado, cabeza inclinada hacia el abdomen heces limosas producidas por comer o beber).
- Croton tiglium 30c, 4 veces con separación de 3 horas, solamente un día. (Diarrea severa como resultado de la inflamación del intestino, heces aguadas y expulsadas a la fuerza).
- Sulphur acid 6c, 3 veces al día por 3 días. (Casos crónicos, membrana mucosa de labios y boca enrojecida)(26).
- Nux vomica (estreñimiento)
- Cantharides (si hay retención de orina)(35).

ENVENENAMIENTO POR "COLA DE CABALLO" (Planta)

- Agaricus muscarius 6c, 4 dosis cada 2 horas. (En etapa temprana, asociado con temores y temblores musculares).
- Strychninum 200c, 4 veces al día por 2 días. (Indicado para el control de una tendencia de opistotonos y también ayudará a temblores musculares severos).

- Gelsemium sempervirens 200c, 3 veces al día por 3 días. (Incoordinación muscular, este medicamento ayudará a - prevenir la parálisis).
- Opium 200c, 3 dosis cada 2 horas. (indicado cuando hay signos de estado de inconciencia o signos de coma)(26).

ENVENENAMIENTO POR PLOMO

- Gelsemium sempervirens 200c, 3 veces al día por 4 días. Puede ser necesario prolongar el tratamiento con bajas potencias, reduciendo la frecuencia de administración. (Remedio benéfico en el tratamiento de parálisis laríngea y otras parálisis de la cabeza y garganta).
- Cuprum metallicum 1M, 1 vez al día por 7 días. (En los casos que muestran debilidad muscular y rigidez puede ayudarse con este medicamento, especialmente donde hay rigidez muscular).
- Curare 30c, 3 veces al día por 3 días. (Debilidad muscular asociado con excesivos temblores de miembros).
- Conium 200c, 1 vez al día por 1 semana. Si es necesario continuar el tratamiento ascendiendo la potencia. (Util cuando los miembros posteriores muestran parálisis, signos gradualmente ascienden y progresan)(26).

ENVENENAMIENTO POR SELENIO. ENFERMEDAD ALCALINA.

- Cuprum metallicum 1M, 1 vez al día por 7 días. (Debe ser asignado cuando hay rigidez muscular generalizada).
- Arsenicum album 6c, día y noche por 2 semanas. (Ayuda al control de pérdida de pelo en la base de la cola y promueve el apetito).
- Calcarea fluorica 30c, 1 vez al día por 3 semanas. (Cuando predomina anomalía de la pezuña)(26).

EPISTAXIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Debido a sobre-ejercicio)(26).
- Arnica montana (Causa externa, dosis repetidas seguida de 1 dosis de China)(35). Arnica montana 30c, cada 4 horas 3 dosis. (En heridas locales. Externamente el remedio puede darse taponando los ollares con un algodón empapado en tintura madre)(26).
- China 1 dosis (si depende de los problemas de los pulmones seguir las indicaciones de Neumonía)(35).
- Ammonium carbonicum 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Sujetos obesos, debido a trastornos constitucionales).
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis por hora. (Estados febriles, donde se demuestra estar involucrado el S.N.C., pulso pleno, pupilas dilatadas y sudoración, se recomienda tener a los pacientes en un lugar oscuro).
- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días. (Sangrado en la mañana, animal debe permanecer en descanso).
- China officinalis 30c, 4 dosis cada 4 horas (después de sangrados severos, gran debilidad).
- Hamamelis 6c, 3 veces al día por 3 días. (Sangrado pasivo de sangre oscura no coagulada, venas de la garganta repletas).
- Ferrum phosphoricum 6c, 3 dosis cada 3 horas. (Animales nerviosos y sensibles, sangre brillante).
- Pilus religiosa 1x, 4 veces al día por 3 días. (Dificultad al respirar, sangrado pulmonar).
- Ipecacuahna 30c, 4 dosis cada 4 horas, trastornos digestivos y sobrealimentación.
- Melilotus 6c, 3 veces al día por 3 días. (Debilidad muscular, en la nariz puede haber polipos, hemorragias profundas).

- Millefolium oc, 4 dosis cada 2 horas. Sangre de intestinos y riñones, aumento de temperatura (26).

ESPARAVAN

- Rhus toxicodendron LM, 1 vez al día por 1 semana. (Casos en los cuales mejora con el ejercicio)
- Ruta graveolens 200c, 3 veces al día por 2 días. (Estados temeranos, cuando se desarrolla primeramente periostitis)(26)
- Arnica montana (35), 30c, 2 dosis separadas por 3 horas cuando la lesión es sospechada como causa inicial del problema (26).
- Conium y Senia (Tumor en hueso)
- Silicea (cojera, esparaván seco)
- Mercurius vivus
- Sulphur acid (35)

ESPARAVAN SECO

- Strychninum 200c, 1 vez al día por 5 días (ayuda a reducir la flexión espasmódica)
- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas. (Dar una vez que se encuentre alguna lesión)
- Gelsemium sempervirens 200c, 1 vez al día por 5 días (tendencia a parálisis)(26)

EST. SMO DEL ESPINTER DE LA VESIGA

- Acetum napellus
- Cantharides
- Cannabis
- Opium (pulso débil, dolores a intervalos)
- Anemone pulsatilla (extremidades frías)
- Arnica montana (calor en casco)(35).

ESPASMO MUSCULAR

- Arnica montana 30c, 2 dosis cada 3 horas. Después de ejercicio violento y prolongado.
- Cuprum metallicum 1M, 4 dosis cada hora. (Espasmos clónicos acompañados de acalambamiento de los músculos).
- Agaricus muscarius 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Contracción violenta muscular y acalambamiento de miembros posteriores).
- Strychninum 200c, 4 dosis cada 2 horas. (Espasmos clónicos pronunciados de algun grupo muscular).
- Cicuta virosa 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Espasmos tónicos extendidos. Músculos del cuello y cabeza involucrados).
- Strophantus 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Espasmos clónicos específicos de los músculos de la parte superior del cuerpo).
- Cimicifuga racemosa 30c, 4 dosis cada 3 horas. (Pesadez de los miembros posteriores acompañado de contracciones. Animal inquieto con signos de dolor)(26).

ESPERMATORREA

- China officinalis
- Sepia
- Sulphur acid (35).

ESPLENITIS

- Atrope belladone y Aconitum napellus alternados. (Respiración profunda).
- Aconitum napellus 1 dosis cada 10 o 15 minutos (Al principio de la enfermedad).
- Arsenicum album (lengua cianótica)
- Anemone pulsatilla, Mezereum, Plumbum, Spigelia y Lauro-cerasus (35)

EST. MATITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Estadio febril).
- Atropa belladonna 200c, 4 dosis cada 2 horas. (No hay salivación, pero la boca esta roja brillante, pupilas dilatadas y piel caliente).
- Rhus toxicodendron 1M, 4 dosis cada 2 h. (Enrojecimiento de la lengua con formación de pequeñas vesículas).
- Mercurius solubilis 30c, 3 veces al día por 2 días. (Profusa salivación con descargas purulentas)
- ✓ Nitric acid 200c, 3 veces al día por 2 días (ulceración de la membrana bucal, quedando viva la superficie).
- Borax 6c, 3 veces al día por 2 días (Util cuando el animal esta temeroso a moverse adelante o atrás).
- Irchisia 200c, 4 dosis cada hora. (Hinchazón marcada de la garganta y dificultad al respirar. Emistaxis)
- Mercurius cyanatus 30c, 3 veces al día por 3 días. (Inflamación extendida hacia la garganta con formación de membranas blancuecinas)
- Kali chloricum 6c, 3 veces al día por 3 días (Signos de disturbios abdominales o hepáticos)(26).

EST. MATITIS VESICULAR

- Aconitum napellus 6c, 3 dosis cada hora. (Viremia primaria. Util para el control de fiebre).
- Antimonium cruum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Eczema alrededor de la boca)
- Borax 6c, 3 veces al día por 4 días. (Cuando aparecen vesículas en boca y encima de la corona. El animal no quiere moverse)
- Natrum muraticum 200c, día y noche por 3 días. (Boca seca y vesículas en labios).
- Argentum nitricum 30c, día y noche por 4 días. (Papilas

linguales prominentes, encías sangrantes).

- Nitric acid 200c, día y noche por 4 días. (Ulceras asociadas en paladar blando. Dolor en miembros, vesículas en lados de la lengua).
- Kali muriaticum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Ulceras aftosas blanquecinas, cubierta viscosa en lengua)(26).

ESTRENIMIENTO

- Aconitum napellus 1 dosis
- Arsenicum (alteración en la digestión)
- Núx vomica
- Hyoscyamus niger
- Plumbum (aparato digestivo vacío y heces blandas)
- Opium (si es causa de atonía)(35).

EXOSTOSIS

- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas. (Dar tan pronto como sea posible).
- Ruta graveolens 200c, día y noche por 4 días. (Ayuda al control de periostitis darlo rápidamente).
- Calcarea fluorica 30c, 1 vez a la semana por 4 semanas. (Tendencia a desarrollar exostosis).
- Silicea 30c, 1 vez al día por 2 semanas. (Desarrollo de fibrosis).
- Externamente unguento de Ruta y Arnica ayudará en estos tempranos (26).
- Symphytum D2 junto con Hekla lava D3 (D4)(56).

FALSO ESPARAVAN

- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas. (Dar una vez que la lesión ha ocurrido).
- Apis mellifica 30c, 3 veces al día por 3 días (edema y

Sinovitis. Dar tempranamente en estado inflamatorio).

- Bryonia alba 30c, cada 2 horas por 4 semanas. Ayuda en estado inflamatorio donde hay sensibilidad sobre la articulación y mejora la presión (26).

PARINGITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis, una cada hora. (Estados tempranos).
- Atropa belladonna 200c, 4 dosis una cada 2 horas (pulso marcado, pupilas dilatadas, glándulas de la garganta - duras y calientes, piel caliente, animal excitado).
- Calcarea fluorica 6c, 3 veces al día por 3 días (glándulas submaxilares se encuentran endurecidas).
- Mercurius cyanatus 6c, 3 veces al día por 3 días (depósitos membranosos en la garganta).
- Rhus toxicodendron 1M, vesículas en boque y lengua. (Hay inflamación de glándulas de la garganta del lado izquierdo).
- Bryonia alba 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Condición como resultado a una exposición al viento y el frío).
- Alumen 6c, 3 veces al día por 3 días (Tonsilas aumentadas y duras, pueden presentarse aumentados todos los ganglios superficiales del cuerpo).
- Resculus hip. 30c, 3 veces al día por 2 días y continuar con una dosis diaria de la potencia 200c o 1M por 4 días. (Venas de la región faríngea inflamadas y aumentadas, molestias abdominales, disfunción hepática signos de ictericia y heces descoloridas).
- Capsicum 6c, día y noche por 4 días. (La inflamación se extiende atrás de las orejas. Util en casos subagudos) (26).

FATIGA

- Arnica montana una dosis y vendar los miembros con paño mojado en agua arnicada (una parte de tintura madre en 20 de agua).
- Nux vomica (si hay pérdida de apetito).
- Cannabis sativa 6 gotas o 6 glóbulos dos veces al día. (Si es causado por un ejercicio violento y orina sangre (40).

FIEBRE TRAUMATICA

- Aconitum napellus 4 gotas cada 2 o 3 horas hasta que la fiebre disminuye. No usar ningún otro remedio. (Esta condición es común en caballos nerviosos)(40).

FIEBRES

- Aconitum napellus (inflamación)
- Mercurius vivus
- Arnica montana (inflamación por causa externa).
- Ipecacuahna y después de 2 días dar Arsenicum album. (Cuando hay debilidad por exceso de trabajo).
- Natrum muriaticum (enfermedad muy desarrollada)
- China (debilidad)
- Thuja occidentalis (supuración).
- Sulphur acid (convalecencia)(35).

FISTULAS

- Anemone pulsatilla
- Atropa belladonna (salival)(35).

FISTULAS EN LA CRUZ

- Aconitum napellus 6c, 3 dosis cada hora. Dar prontamente

- para prevenir complicaciones febriles).
- Apis mellifica 6c, dosis cada 2 horas. (Indicado para el control de sinovitis que pueden ocurrir en las pequeñas articulaciones).
 - Hepar sulphuris 200c, 4 dosis cada 3 horas (remedio útil cuando hay demasiada sensibilidad al dolor, que siempre esta presente en casos agudos. Ayudará a la supuración promoviendo la resolución y aliviando el dolor).
 - Silicea 200c, una vez al día por 7 días. (Indicado en casos de descuido, una vez que la fístula aparece, se usa para prevenir la necrosis y la recuperación de -- granulación de úlceras).
 - Brucella abortus nosode 30c, una vez al día. Como la Brucella está frecuentemente involucrada en esta enfermedad, el nosode debe darse por 3 días consecutivos al comienzo del tratamiento. Externamente loción de Calendula e Hypericum para promover la recuperación - (26).

FISTULAS EN LA RANILLA

- Spiritus sulfuratus (35).

FISURAS EN CASCO

- Arnica montana
- Phosphorus
- Sepia
- Suphur acid (35).

FOTOSENSIBILIZACION

- Hypericum 1M, 4 dosis cada 3 horas (prurito).
- Chelidonium 1M, una vez al día por 1 semana (signos de

- ictericia, dolor y rigidez sobre el área escapular).
- Rhus venenata 30c, día y noche por 4 días. (Dermatitis y formación de ampollas).
 - Antimonium crudum 6c, día y noche por 5 días. (piel seca y prurítica, tendencia a formación de costras) (26).

GABARRO

- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas. - (Si se sospecha de una lesión).
- Hypericum 1M, 3 dosis cada 2 horas (Estadios tempranos si la herida fue por pinchos y son sinuosos).
- Ledum 6c, 4 dosis cada 2 horas (Estadios tempranos. - Producto de heridas delgadas y profundas).
- Hepar sulphuris 6x o 200c; 6x = 4 dosis cada hora. -- 200c = 3 veces al día por 2 días. En caso agudo, en estado inflamatorio, este medicamento promueve rápidamente la cicatrización. Ver en alta potencia en este estado ya que previene la supuración. Si hay pus dar - en baja potencia ya que acelera su eliminación.
- Silicea 30c, una vez al día por 1 semana, externamente loción Calendula. (Si se desarrolló o formó cavidad en un caso establecido este remedio ayuda a promover el tejido necrótico. Primeramente promueve la granulación) (26).

GANGRENA

- Natrum muriaticum 200c, una vez al día por 1 semana. - ayuda a prevenir la dispersión de la necrosis, aceleran do la mejoría).
- Silicea 200c, una vez al día por 5 días. (Util en el en durecimiento del casco).
- Externamente, después de remover el tejido muerto, la -

cevidad deberá taparse con algodón humedecido en loción Calendula y Arnica (26).

GASTRITIS

- Aconitum napellus, 1 dosis, después dar el siguiente medicamento.
- Arsenicum album y seguido
- Carbo vegetabilis
- Antimonium crudum, Anemone pulsatilla e Ipecacuahna (Eru~~g~~ tar).
- Datura stramonium (agitación después de comer o beber).
- Ipecacuahna y una hora después dar Arsenicum para promover la regurgitación) (35).

GLOMERULONEFRITIS

- Apis mellifica 6c, 4 dosis distribuidas en cada 2 horas (Forma aguda, en Edema renal. Orina contiene albumina).
- Arsenicum album 6c, 4 dosis distribuidas en 2 horas (orina escasa, mostrando gran contenido de albumina y sangre. El animal esta inquieto y sediento, tos seca. Signos empeoran después de la medianoche).
- Atrope belladonna 1M, 4 dosis distribuidas cada 2 horas -- (Casos agudos mostrando excitación y dilatación de pupilas, pulso pleno y piel caliente, esfuerzo al pasar orina la cual es escasa y con gran cantidad de fosfatos, hematuria es común).
- Berberis vulgaris 30c, 4 dosis distribuidas cada 3 horas. (Marcada sensibilidad sobre el lomo. Orina contiene moco y sedimentos crenosos rojizos. Micción es frecuente).
- Mercurius solubilis, 30c, 3 veces al día por 4 días. (orina escasa con sedimento verdoso mucoso el cual puede contener pus y sangre. Orina oscura).

- Lycopodium 200c, día y noche por 5 días (orina profusa durante la noche. Tendencia a retención de orina con sedimentación eritrocítica).
- Thelapsi bursa 6c, 3 veces al día por 2 días. (Micción frecuente con hematuria y tendencia a sedimentación arenosa. Orina contiene fosfatos).
- Terebinthina 6c, 3 veces al día por 3 días (Hematuria y dificultad para la micción. Pronunciado olor dulce. Condición asociada con infecciones).
- Phosphorus 200c, día y noche por 3 días. (Casos agudos que presentan hematuria, la sangre es difusa con apariencia oscura).
- Eucalyptus 6c, 3 veces al día por 5 días (Supuración involucrada seguida de una infección. Orina contiene pus) (26).
- Feli cholium 6c, 3 veces al día por 3 días (Ictericia y hemoglobinuria. albúmina en orina, abundantes fosfatos).
- Natrum muraticum 200c, día y noche por una semana. -- (Casos crónicos mostrando orina pálida de baja gravedad específica. Usualmente hay retención de sal provocando sed y rremia) (26).

GLOSITIS

- Aconitum navelius.
- Mercurius vivus.
- Acidum nitrum (lengua esta seca).
- Acidum sulphuricum.
- atropa belladonna (hinchazón con enrojecimiento).
- Arsenicum album (Tumor doloroso)
- Carbo animalis, Conium, Lycorodium y Silicea (induración de lengua) (35).

GONITIS

- Apis mellifica 30c, 4 dosis cada 2 horas (Inflamación esta acompañada por edema de la cápsula articular).
- Bryonia alba 30c, articulación inflamada, la presión se mejora, los signos empeoran al movimiento.
- Ruta graveolens 200c, día y noche por 4 días (Periostitis circunda la articulación).
- Rhus toxicodendron 1M, una vez al día por una semana (Artritis).
- Streptococcus nosode 30c, una vez al día por 3 días - (Cuando se sospecha de onfaloflebitis para conducir al cuadro).
- Brucella abortus nosode 30c, una dosis diaria por 3 días (Si se sospecha de Brucelosis) (26).

GRASA (EN LA PARTE BAJA DE MIEMBROS POSTERIORES)

- Thuja occidentalis interna y externamente, 6 gotas 3 veces al día y lavar la parte afectada con la tintura en la mañana y en la noche (al tocar se ve y hay olor fétido).
- Secale cornutum y Arsenicum album alternados, 6 gotas 3 veces al día (vesículas o úlceras con olor fétido).
- Mercurius vivus 6 gotas dos veces al día.
- Es necesario dar 1 dosis de Sulphur acid una vez a la semana durante el tratamiento y lavar las patas con agua caliente) (40).

GRIETAS EN LA MURALLA DE LA PEZUNA

- Silicea 200c, una vez al día por 5 días (Ayuda a promover el endurecimiento y crecimiento de tejido nuevo).
- Calcarea fluorica 30c, 2 veces a la semana por 8 semanas. (Buen remedio de tejido, el cual promueve el cre-

cimiento de tejido).

- Hepar sulphuris LM, una vez diariamente por 7 días (Infecciones en la lámina) (26).

HEMATURIA

- Aconitum napellus (35), 6c, 4 dosis en cada hora (Estado temprano y toxemico. El animal está tenso y ansioso) (26).
- Arnica montana 30c, mañana y noche por 2 días. (Debido a lesiones, orina presenta sedimentos oscuros).
- Terebinthina 200c, día y noche por 4 días (Orina con olor dulzón. Util en estados toxemicos).
- Atropa belladonna 200c, 4 dosis cada 3 horas. (Hematuria - donde no hubo afección sistémica o lesiones, caso frecuente de orina con signos de excitación).
- Coccus cacti 6c, 4 veces en 24 horas (Gran dificultad al paso de orina, contiene sedimentación eritrocítica y calculos de urato).
- Crotalus horridus 6c, 3 veces al día por 3 días, (orina - con albumina y oscura. Asociado con hemorragias en otra parte).
- Hamamelis 6c, día y noche por 8 días (Poliuria con congestión venosa y hemorragias pasivas).
- Achillea Millefolium 6c, 3 veces al día por 3 días (Sangre roja clara en la orina asociado con hemorragias en otra parte).
- Nitric acid 6c, 3 veces al día por 3 días (Orina con albúmina y olor fuerte de amoníaco. Orina turbia con fosfatos puede alternarse con orina clara en animales viejos).
- Pareira brava 6c, 3 veces al día por 3 días. (Orina espesa con moco, asociado con esfuerzo y signos de dolor).
- Phosphorus 200c, día y noche por 3 días (Estado agudo fe-

bril con signos de afección hepática ejemplo: ictericia y hemoglobinuria).

- Uva ursi 6c, 3 veces al día por 3 días. (Gran acumulación de sangre no coagulada y moco en orina, puede estar teñida de bilis y contener pus (26).
- Cantharides (35).

HEMORRAGIAS

- Ipecacuahna 30c, 4 dosis cada hora (sangre roja clara y profusa).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 3 días (indicado cuando existe extravasación de sangre en la piel y membranas mucosas, equimosis, sangrado capilar.
- Melilotus 6c, 3 días (Asociado con estados de congestión general. Arterias del cuello se siente el latido).
- Ficus religiosa 6c, 4 dosis cada 3 horas (dolor respiratorio, sangre es usualmente roja clara).
- Ferrum phosphoricum 6c, 4 dosis cada 2 horas (Estados febriles y tracto urinario involucrado, sangre roja clara).
- China officinalis 6c, 5 dosis cada 2 horas (Para control de debilidad, asociada con pérdida de sangre, restablece la fuerza).
- Trotalus horridus 6c, 3 veces al día por 3 días (Indicado en hemorragias de fluido oscuro y que la sangre no coagula facilmente especialmente en intestinos y recto).
- Sabina 6c, 4 veces al día con separación de 3 horas (Indicado cuando la sangre esta roja clara y embolia aparece inmediatamente. Usado en metrorragia) (26).
- Achillea millefolium (35) 6c, 4 dosis cada 2 horas (Indicado en hemorragias de sangre roja clara, asociado -

- con signos febriles. Util en hemoptisis y cuando la sangre predomina en la orina)(26).
- Hamamelis 6c, 3 veces al día por 3 días. (Indicado en -- congestión venosa con hemorragias pasivas).
 - Trillium pendulum 6c, 4 dosis cada 2 horas (Debilidad general y vértigo después de la pérdida de sangre, particularmente del utero) (26).

HEMORRAGIAS SUBCUTANEAS

- Melilotus 6x, 3 veces al día por 4 días (hemorragias generales, profuse, epistaxis, Imoactación de intestino).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 2 días (Daño capilar hemorragias color púrpura y múltiples inflamaciones).
- Achillea millefolium 6c, 3 veces al día por 3 días. (Hemorragias de sangre color rojo claro ocurren de los orificios del cuerpo, signos febriles y alta temperatura).
- Ficus religiosa 6c, 4 dosis cada 2 horas (Hemorragias -- generales acompañado de signos respiratorios con hematemesis al toser).
- Ipecacuahna 6c, 3 veces al día por 3 días (Remedio anti-hemorrágico cuando hay trastornos digestivos).
- Crotalus horridus 6c, 4 dosis cada 3 horas (Hemorragias generalizadas y oscuras).
- Lachesis 30c, 3 veces al día por 3 días. (Celulitis asociada con hemorragias y sangre oscura, puede haber inflamación de la garganta).
- Arnica montana 30c, 2 veces al día por 1 día (Debido a -- lisisión o confusión, la piel sobre la hemorragia esta hinchada y descolorida).
- Hamamelis 6c, 3 veces al día por 3 días. (Congestión venosa. Vasos de la garganta pletóricos, hemorragias pasivas).

vas de sangre obscura).

- Secale cornutum 30c, 4 veces al día por un día (hemorragias oscuras, sangre líquida aguada con tendencias a la necrosis del tejido del área afectada, epistaxis, lengua hinchada y dificultades al tragar) (26).

HEPATITIS

- Aconitum napellus seguido de
- Nux vomica alternada con Mercurius vivus (35).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 3 días (Forma aguada heces blanquecinas suaves o duras, ictericia y hemorragias color púrpura, hemoglobinuria y dolor abdominal).
- Aloe socotrina 200c, mañana y noche por 3 días (Gesos -- excesivos, orina escasa y coloreada, heces contienen moco).
- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días (Mejora al -- reposo, tos seca puede acompañar la condición, heces duras, oscuras, y secas, orina escasa y caliente).
- Cerdu marianus 6c, 3 veces al día por 2 días, en casos agudos. Mañana y noche por 2 semanas en los crónicos. -- (Orina amarillenta debido a ictericia, heces amarillentas alternado con con tipación y diarreas. Casos crónicos escitis).
- Chelidonium 6c, 3 veces al día por 3 días. Estado agudo mostrando ictericia. (Rigidez y dolor sobre el área escapular).
- Hydrastis 30c, día y noche por 5 días (Hepatitis catarral indicado por moco en orina y evidencia de inflamación catarral como rinitis y tos).
- Heber sulphuris 200c, día y noche por 5 días (Sospecha de absceso hepático, mostrando por presencia de material purulento en orina, puede involucrarse casos supurativos como rinitis purulenta).

- Lycopodium clavatum 200c, día y noche por 2 semanas. (Forma crónica, en estados tempranos de cirrosis. Ascitis presente. Orina contiene sedimentación eritrocítica y ocurre copiosamente durante la noche).
- Mercurius dulcis 6c, 3 veces al día por 1 semana. (Hepatitis crónica, heces líquidas y limosas frecuentemente teñidas de sangre. Puede haber colitis, animal en estado hidrópico)(26).

HEPATITIS POSVAGINAL

- Phosphorus 30c, 3 veces al día por 3 días. (Heces pálidas. Hemorragias petequiales en membranas mucosas).
- Chelidonium majus 30c, 3 veces al día por 3 días. (Ictericia. Dolor sobre la región escapular derecha).
- Cardus marianus 30c, 3 veces al día por 4 días. (Dolor sobre la región hepática, heces amarillentas).
- Chionanthus 6x, 3 veces al día por 7 días. (Signos mentales, conjuntiva amarillenta, heces amarillentas).
- Lycopodium clavatum 200c, día y noche por 1 semana. (Predomina oliguria. Orina contiene sedimentos rojizos y puede haber disfunción abdominal).
- Mercurius dulcis 6c, día y noche por 5 días. (Abdomen hinchado, heces limosas y posiblemente teñidas de sangre)(26).

HERIDAS

- Arnica montana (35), 30c, 2 dosis separadas por 2 horas. (Heridas contusas)(26).
- Acidum phosphoricum (periostio involucrado)
- Conium (periostio involucrado)
- Symphytum officinalis (periostio involucrado)(35).

- Hypericum 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Heridas por laceración, nervios dañados y el dolor es obvio).
- Ledum palustre 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Heridas profundas, piel fría alrededor)(26).
- Calendula officinalis 6c, 3 veces al día por 1 día. Externamente una loción hecha de partes iguales de Calendula e Hypericum. La combinación de Ledum palustre e Hypericum internamente ayudará en la prevención de Tetanos y debe darse siempre cuando una herida puede infectarse (26).
Calendula officinalis 6 gotas en la mañana y en la noche. Externamente una parte de tintura de Calendula en 20 partes de agua (remedio útil en heridas severas)(40).

HERIDA ABIERTA EN EL GLOBO OCULAR

- Loción hecha a base de Calendula officinalis, Arnica montana e Hypericum, irrigar el ojo 2 o 3 veces al día. Usar 10 gotas en una pinta (0.57 l.) de agua caliente.
- Arnica montana 30c, 1 dosis cada 3 horas para 2 dosis será suficiente.
- Hypericum 1M, 1 dosis cada 2 horas para 4 dosis. (Lesión en nervios y ayuda en el control de la hemorragia).
- Ledum palustre 6c, 1 dosis cada 2 horas para 4 dosis. (Heridas profundas, puede combinarse con Hypericum para aliviar el dolor y prevenir complicaciones).
- Henric sulphuris 6c, en su baja potencia, 1 dosis cada 3 horas para 4 dosis. (Ayudará a promover la cicatrización y descarga de pus)(26).

HIDROFTALMIA

- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 4 días (Reduce la tensión en el globo ocular).
- Osmium 6c, 3 veces al día por 4 días (Incrementa la tensión intraocular, dolor y lagrimeo).
- Physostigma 6c, día y noche por 1 semana (Profuso lagrimeo acompañado por una parálisis de los músculos ciliares. Contracción de pupilas y fotofobia).
- Gelsemium sempervirens 200c, una vez al día por una semana. (Contracciones de los músculos orbitales, inflamación generalizada de las estructuras serosas del ojo).
- Phosphorus 200c, día y noche por una semana (retinitis y edema periorbital) (26).

HIDROTRIX

- Arsenicum album y China officinalis
- Lyconodium clavatum (35).

HIGROMA

- Apis mellifica 30c, 4 dosis cada hora. (Controlará la cantidad de fluido sinovial y acelerará su absorción).
- Kali bichromicum 30c, una vez al día por 5 días. Externamente una aplicación de Arnica y Rhus toxicodendron líquidos será de gran ayuda. (Ayuda a prevenir la presencia de fluidos sinovial a través de la piel) (26).

HIGROMA DEL CARPO O RODILLA

- Apis mellifica 6c, 4 dosis durante 2 horas. (Casos agudos mostrando dolor y edema de la articulación con efusión sinovial).
- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 4 días. (articula----

ción dura y tensa. Presión en la articulación alivia el dolor. Empeora al movimiento).

- Ruta graveolens 30c, día y noche por 4 días. (Vaina del tendón involucrada).
- Silicea 200c, 1 vez al día por 2 semanas. (Tejido fibroso se desarrolla en casos de descuido).
- Calcareo fluorica 30c, 1 vez al día por 10 días. (Sinovitis crónica con depósitos en la articulación).
- Hepar sulphuris 200c, día y noche por 1 semana. (Higroma infectado con bacterias piógenas)(25).

HIPERTRÓFICA

- Arsenicum album 1M, 1 vez al día por 1 semana, seguido por varias semanas de no tratarse. Si durante el intervalo se ha notado mejoramiento cesar el tratamiento es aconsejable para continuar con este remedio en una alta potencia por ejemplo 10M.
- Kali arsenicum 6c, día y noche por 1 semana (prurito por condiciones parasitarias, fisuras en los pliegues de las articulaciones).
- Sulphur iodatum 6c, día y noche por 10 días. (Cuando ocurre daño de una afección secundaria).
- Thuja occidentalis 200c, 1 vez al día por 2 semanas. (Casos crónicos. Cuando glándulas estén aumentadas de tamaño).
- Hydrocotyle 6c, día y noche por 10 días. (Este remedio debe darse a menudo sucesivamente cuando otros remedios fallan su acción)(26).

ICTERICIA

- Aconitum napellus 6 gotas u 8 glóbulos cada 2 horas-hasta que el mejoramiento sea manifiesto.
 - Chamomilla 6 gotas cada 6 u 8 horas (Animal inquieto, -- evacuaciones líquidas, piel amarillenta). Si hay constipación usar Nux vómica o Bryonia alba (40),
 - Berberis vulgaris 30c, 3 veces al día por 3 días (piel -- amarillenta signos urinarios presentes) (Condición de -- función lenta del hígado con sensibilidad en la región -- lumbar).
 - Cardus marianus 6c, 3 veces al día por 3 días. (Inflamación del hígado acompañado por sensibilidad en la región hepática. Orina de color amarillenta).
 - Chelidonium majus 6c, 3 veces al día por 3 días. (Dolor y sensibilidad en la región escapular derecha, membranas mucosas amarillentas, obstrucción de ductos biliares) (26).
 - China officinales (35), 30c, 4 dosis distribuidas en e -- horas. (Debilidad, dolor abdominal, heces líquidas y amarillentas) (26).
 - Chionanthus 6c, una vez al día por 3 días (Ictericia, heces como mesilla amarillenta, hígado aumentado de tamaño).
 - Hydrastis 30c, 3 veces al día por 3 días. (Estado catarral de ductos biliares conduciendo a un problema urinario, indigestión debido a gastritis catarral, dolor y rigidez en parte baja) (26).
 - Lyconodium clavatum (35), 200c, día y noche por 5 días. -- (Estado flatulento. Apetito indiferente. Timpanismo después de comer, membranas mucosas gris-amarillentas y orina con sedimentación eritrocítica) (26).
- 6 gotas u 8 glóbulos dos veces al día. (Piel reseca y dura, mucosas amarillentas y hay constipación) (40).

- Leptandra 6c, 3 veces al día por 3 días. (Cuando existe hemorragias intestinales, lengua cubierta de saliva espesa y circulación portal afectada).
- Magnesia muriatica 30c, día y noche por 4 días. (Hígado aumentado, dificultad para orinar, ictericia y dolor abdominal muy marcado) (26).
- Mercurius vivus
- Sulphur acid (35).

IMPETIGO

- Antimonium tartaricum 6c, 3 veces al día por 3 días. Seguido por una dosis diaria por 4 días. (Vesículas y pústulas puede haber consecuencias respiratorias. Debilidad y disoración son los signos predominantes).
- Mezerum 30c, día y noche por 5 días. (Rigidez e involucrados los huesos. Intensa comezón e vesículas que tienen un contorno rojizo).
- Cantharis 200c, 3 veces al día por 2 días, seguido de una dosis diaria por 3 días. (Vesículas, comezón intensa y ardor, la orina teñida de sangre y es de gota a gota).
- Rhus venenata 30c, día y noche por 4 días. (Inflamación erisipeloides, comezón).
- Heber sulphuris 200c, día y noche por 5 días. (Infección secundaria conduciendo a la formación de úlceras - pequeñas purulentas) (26).

INCONTINENCIA URINARIA

- Anemona pulsatilla
- Rhus toxicodendron
- China officinalis.

- Arnica montana (orina gota a gota).
- Petroleum
- Anemone pulsatilla
- Spigelia
- Ferrum muriaticum (Escoriación en órganos urinarios) (35).

INDIGESTION

- Nux vómica (estreñimiento y falta de apetito) (35), 6c, 4 dosis cada 2 horas (Constipación presente) (26).
6 gotas u 8 glóbulos en la mañana y en la noche (si el animal esta en estado demente y solo cambia de posición). (40).
- Colchicum autumnale 6c, 3 dosis cada 2 horas (Abdomen - timpánico, diarrea).
- Colocynthis 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Dolor, mira los flancos) (26).
- Arsenicum album (35) 1M, 3 dosis cada hora (Animal inquieto empeora a la medianoche, sed y tomo pequeñas cantidades de agua) (26).
6 gotas una vez o dos al día. (si es por largo tiempo la enfermedad estomacal, la piel se pone dura, espere en diferentes lugares, diarrea. Esta más indicado cuando la evacuación es acuosa o con sangre) (40).
- Abies canadensis 6c, 4 dosis cada 2 horas (Debido a sobre-alimentación, flatulencia).
- Lobelia inflata 6c, 4 veces al día por un día (Salivación profusa sudoración, buen apetito, ocurre a menudo - flatulencia).
- Lycnodium clavatum 6c, 4 dosis una cada 2 horas. (Signos hepáticos, coloración icterica de conjuntiva y sensible.

la región del hígado).

- Cerbo vegetabilis 6c, 4 dosis cada hora. (Abdomen tenso debido a la flatulencia con signos edematosos).
- Nux moschata 6c, 4 dosis cada hora. (Excesiva hinchazón, dificultad al excretar)(26).
- Antimonium crudum (eructo y respiración penosa)(35). 6 gotas o 10 glóbulos en la mañana y noche. (Si hay anorexia, pelo áspero, evacuaciones líquidas pestilentes y deseos de beber)(40).
- Coffea cruda (eructo y respiración penosa)(35).
- Inecacuehna (regurgitación frecuente), dar posteriormente de una hora Arsenicum album (35). 6 gotas o 10 glóbulos día y noche. Se puede alternar con Antimonium. (Vómito con moco, no quiere alimento)(40).
- Anemone pulsatilla (evacuaciones fétidas y líquidas)(35).
- Charomilla (diarrea e hinchazón del vientre)(35).
- China 4 gotas o 6 glóbulos 3 veces al día. (Si es joven el caballo y ha sido sobretrabajado, si hay debilidad y pérdida de apetito)(40).
- Rheum (materia blanda sin dolor)(35).
- Silicea 4 gotas o 6 glóbulos, 3 veces al día. (Si el animal sufre por el mínimo esfuerzo)(40).
- Solanum dulcamara v Nux vomica (causada por enfriamiento)(35).
- Sulphur acid, puede darse como un remedio alternativo en algún estado de enfermedad (40).

INFECCION BACTERIOLOGICA HEFATIL

- Streptococcus nosone 30c, una dosis al día por 3 días, seguido de 3 dosis cada 2 días. Debe ser siempre empujada.

- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Sinovitis severa y dolorosa)
 - Rhus toxicodendron 1M, 3 veces al día por 3 días. (Artritis, animal mejora al moverlo).
 - Benzoic acid 6c, 3 veces al día por 3 días. (Indicado cuando está involucrado el carpo, dolor, hinchazón del tendón de aquiles, orina café obscura).
 - Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días. (Articulaciones inflamadas, calientes y dolorosas, empeora con el movimiento).
 - Lyconodium clavatum 200c, día y noche por 3 días. Articulación del hombro y codo afectadas, sudoración, síntomas hepáticos.
 - Natrum phosphoricum 30c, día y noche por una semana. (Cuando el carpo está involucrado, articulaciones crepitantes)
- Nota: La prevención de esta condición es posible administrando el nosode en la yegua gestante, dando una dosis por mes en los últimos 4 meses de gestación, seguido de dos dosis en la última semana. Una medida de prevención adicional es dar al potro una dosis del nosode inmediatamente después de nacer y repetir diariamente por 4 días (26).

INFECCION EN LAS ESTRUCTURAS SENSITIVAS DEL CASCO A TRAVES DE UNA HERIDA EN LA LINDA BLANCA.

- Hepar sul huris 200c, 1 vez al día por 4 días. (Previene la ulceración si se da a tiempo).
- Silicea 200c, 1 vez al día por 5 días. (Infección piogena, cede a menudo con este remedio. Ayuda a la cicatrización del tejido)
- Selenium sulphur 30c, 1 vez a la semana por 4 semanas.

(Promueve el endurecimiento y granulación del tejido).

- Externamente, puntos negros deben ser bañados con loción Caléndula. (26).

INFECCION DEL TRACTO GENITAL DE LAS YEGUAS

- Streptococcus nosode 30c, 3 veces al día por 2 días. (Siempre comenzar con este medicamento).
- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. Estadios tempranos de infección aguda.
- Echinacea angustifolia 6x, 4 dosis cada 2 horas. (infección puerperal, metritis).
- Pyrogenium 1M, 4 dosis cada 3 horas. (Metritis resultante de aborto, retención placentaria, pulso rápido filamentooso, baja temperatura en contraste con pulso débil y alta temperatura)
- Sabina 6c, 5 dosis cada hora, (Hemorragia uterina, retención placentaria).
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Animal excitable, pupilas dilatadas, pulso lleno, sudoración y piel caliente).
- Sepia 200c, 4 dosis únicas por 1 semana. (Metritis crónica, descarga uterina intermitente).
- Ferru sulphuris 6c, 3 veces al día por 5 días. (Casos crónicos purulentos)(26).

INFLAMACION

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada 2 horas.
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Piel lisa, pupilas dilatadas, pulso lleno).
- Ferrum phosphoricum 6x, cada 3 horas 5 dosis (Inflamación local de partes vasculares hasta congestión)

- Cantharis 6c, 4 dosis cada 2 horas (en ojos o inflamación vesicular, color y erumor)
- Rhus toxicodendron 1M, 1 vez diariamente por 7 días. (Erupción inflamatoria tipo vesicular conducida a un severo prurito).
- Arsenicum 30c, 2 dosis separadas por 2 horas. (Inflamación superficial a causa de herida o lesión).
- Silicea 200c, 1 vez diariamente por 7 días. (En inflamaciones crónicas ayuda a reabsorber el tejido fibroso)
- Hepar sulphuris 200c, día y noche por 4 días. (Puede - ocurrir supuración)(26).
- Aconitum napellus cada 15 minutos, si no hay mejoría dar después de 4 o 5 horas Arsenicum, Rhus toxicodendron y Carbo vegetabilis. (Inflamación de Vientre)(35).
- Arsenicum y Aconitum napellus (Golpe en cuello)
- Bryonia alba (si es en cuello)
- Hepar sulphuris 4 dosis (inflamación en cuello)
- Aconitum napellus, Atropa belladonna (dificultad al tragar), Spongia (Hinchazón) y Mercurius vivus (sialorrea) si la inflamación es en faringe, laringe y traquea.
- Conium (tumefacción local, castración) si es en escroto.
- Arsenicum, Bryonia alba (enfriamiento), Atropa belladonna (crepitación), Aqua (Inflamación en membrana mucosa), Baryta carbonica (tumores sobre el cartilago), Leuca (tuberculos sobre nariz), Aconitum napellus externamente al igual que Conium maculatum y Hepar sulphuris cuando la inflamación es en la nariz.
- Mercurius vivus (salivación), Atropa belladonna y Aqua si es en el paladar.
- Aconitum napellus, Bryonia alba, Urtica dioica, Arsenicum

nicum, litrum (si hay tuberculos), meione rals: zilla (separación de pulmones), Onium (res iración estertórea) si inflamación es en pecho

- Colium y Arica montana si es en testículos (35).

INFLAMACION DE GLANDULA MAMARIA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora (Estados febriles).
- Phytolaca 6c, 3 veces al día por 2 días . (Ganglios linfáticos involucrados, inflamación).
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Casos agudos excitabilidad, pupilas dilatadas, pulso lleno, ubre nincada y caliente).
- Prunella alba 6c, 3 veces al día por 3 días. Glandula dura pero venos caliente.
- Mercur sulfureus 200c, este remedio en potencias bajas como 6x, apresura la aparición de material purulento, pero en altas potencias apresurará la resolución . En caso es de una dosis 3 veces al día por 2 días.
- Mercurius solubilis 30c, 3 veces al día por 3 días. (Secreción verdosa en coaja de sangre. El tejido de la glándula es firme después de evacuar el contenido, puede estar acompañada de diarrea sanguinolenta).
- Salices 200c, una diariamente por 5 días (Cuando aparecen abscesos superficiales y son lentos para curar, pus cremoso).
- S.S.C. 30c, 3 veces al día por 3 días seguido de una combinación por 3 días. Esta combinación de Sulfur siliceus y Orcho vegetabilis se usa cuando la inflamación de la leóné es granulosa (26).

INFLAMACION INTESTINAL

- Aconitum naseellus, 6 gotas u 8 glóbulos cada 10 o 15 minutos. Debe ser administrado hasta que se establezca un estado de calma, que generalmente toma 1 hora.
- Arsenicum album 6 gotas cada media, una o dos horas, en largos intervalos si la enfermedad no es muy violenta. (Si la enfermedad es producida por alimento varo o beber agua fría).
- Luis toxicocendron, 6 gotas cada 1/2, 1 o 2 horas. (Inflamación del estómago, micción frecuente, calma extremo)
- Colocynthis, si el Arsenicum no mejor. los signos, 6 gotas u 8 glóbulos cada 1/2 o 1 hora. (Cólico y evacuaciones con sangre).
- Nux vomica u Opium 6 gotas en la mañana y noche (si después de estar curado queda un estado de constipación).
- Santalis o Hwosey mas acer (si hay retención de orina)
- Arnica montana, puede usarse en casos difíciles si las descargas son réticas, pequeñas y contienen mucosa, a r 6 gotas cada 1 o 2 horas (40).

INFLAMACION DE MUSCULOS, TENDONES, ARTICULACIONES

- Eryonia alba
- Arsenicum album (escalofríos)
- Ver. trun. alba (enfriamiento)
- Luis toxicocendron (Gran dolor)
- Aconitum naseellus
- Clay / Nux vomica (pérdida de apetito).
- Gala (fríos los miembros)
- Arnica montana (inflamación en pies y rigidez)
- Sanguar (e Saico) (35).

INFLAMACION RENAL

- Aconitum napellus, 6 gotas 2 o 3 veces al día. (Si el animal esta intranquilo, orina roja y sedimentos densos)
- Arnica montana 6 gotas u 8 glóbulos en la mañana y noche (si es el resultado de una herida o lesión).
- Solanum dulcamara, 6 gotas y 8 glóbulos en la mañana y noche (si sobreviene por exposición a humedad).
- Cantharis 6 gotas, 3 o 4 veces al día. (Si hay dolor y orina en pequeñas cantidades con sangre, temblor en extremidades).
- Cannabis sativa 6 gotas, 3 o 4 veces al día. (Animal inquieto, patea el suelo y se golpea el abdomen).
- Mercurius vivus 6 gotas, 3 o 4 veces al día. (Si el animal suda y orina abundante)(40).

INFLUENZA

- Aconitum napellus 60, cada hora por 4 horas. (Cuando signos febriles acompañan la expresión ansiosa)(26).
4 gotas o 6 globulos cada 3 horas. (Fiebre, tos seca, es tornudos violentos. Se requiere al comienzo del tratamiento si la enfermedad asume un carácter inflamatorio) (40).
- Mercurius vivus 6 gotas 3 veces al día. (Garganta dolorosa, profusa secreción salival, intolerancia a la luz) (40).
- Atropa belladonna 200c o 1M, 4 dosis cada hora. (Casos - agudos con pulso pleno, pupilas dilatadas, piel caliente y brillante, sacudimientos de cabeza)(26).
Atropa belladonna 4 gotas o 6 globulos cada 3 horas. (Si la cabeza esta afectada, ojos inflamados, incapacidad a consumir fluidos)(40).

- Gelsemium sempervirens 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Debilidad muscular y movimientos de incoordinación)(26).
- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días. (Tos seca signos pleuríticos como dolor sobre el pecho y a la auscultación sonidos de fricción, respiración corta). (26). Bryonia alba 4 gotas o 6 glóbulos cada 3 horas. (Usarlo si no existen signos febriles y luego usar - Aconitum napellus)(40).
- Antimonium tartaricum 30c, día y noche por 4 días. (Salivación acompañada de tos húmeda y presencia de moco, estertores)(26).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 2 días. (Respiración corta y rápida, amenaza de neumonía).
- Lycopodium clavatum 200c, 3 veces al día por 2 días.- (Neumonía establecida y el animal muestra movimientos elaborados de las nasales independientemente de la respiración)(26).
- Arsenicum album 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Signos generalmente empeoran después de la medianoche, animal inquieto, bebe frecuentemente en pequeñas cantidades, piel seca)(26). Arsenicum album 4 o 6 gotas, 3 veces al día. (Gran debilidad, diarrea y a veces con sangre, descarga nasal con sangre)(40).
- Nux vomica 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Constipación y apetito caprichoso).
- Ammonium causticum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Congestión pulmonar, amenaza de edema, piel fría)(26).

INTERVENCION QUIRURGICA OSEA

- Calcium carbonicum D12 junto con Symphytum D3. (Preoperatorios).

- Symphytum D12 y Silicea D30 (Posoperatorios)(56).

IRITIS

- Cinnabaris 6c, día y noche por 5 días. (Después de la inflamación inicial todo el ojo esta rojizo. La boca puede estar rojiza al igual que la garganta).
- Euphrasia 6c, 3 veces al día por 5 días. (Lagrimeo espeso, elimina moco).
- Mercurius corrosivus 6c, 3 veces al día por 3 días. (Dolor intenso aumenta en la noche, puede haber diarrea con sangre y el ojo con descargas aguadas y verdosas)
- Rhus toxicodendron 30c, 3 veces al día por 5 días. (Párpados hinchados con celulitis circundante)(26).

LAGRIMEO

- Leoum y Anemone pulsatilla
- Acidum phosphoricum con Sulphur acid (Caída de pelo)
- Nux vomica, Centherides, Causticum y Euphrasia (Sensibilidad a la luz y acumulación de pus. en la cuenca del ojo)
- Psoricum (Tumefacción en párpados)
- Agericus muscarius (35).

LACRINITIS

- Aconitum napellus 30c, 6 dosis cada 30 minutos. Darlo inmediatamente después de haber visto los primeros signos. Ayuda a calmar la ansiedad, regula el pulso y respiración.
- Atropa belladonna 1M, 6 dosis cada 30 minutos. Aconitum y Belladonna pueden darse juntos en la misma dosis. (Suoración pulso pleno y pirexia).
- Nux vomica 1M, 4 dosis cada 2 horas (Congestión sistémica)

ca).

- Calcarea fluorica 30c, 1 vez a la semana por 4 semanas. (En casos crónicos el tejido está involucrado, este remedio ayudará a reducir el tejido afectado y promoverá el regreso a estado normal y ayudará a que no avance la afección)(26).

LAMINITIS CRONICA

- Silicea 30c, 1 vez al día por 1 semana (Principal remedio para el control séptico).
- Hepar sulfuris 6c, 4 dosis cada hora (Debe ser usado en estado agudo temprano).
- Externamente baños o lavado con loción Calendula ayuda a la recuperación (26).

LARINGITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora (Estado temprano. Fiebre, pulso rápido y respiración igual)
- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 1 días (Signos predominantes son de edema, garganta hinchada y debilidad)
- Spongia tosta 6c, 3 veces al día por 3 días. (Ataque severo, tos característico).
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas. (inflamación se extiende al área faríngea, dificultad al tragar, pulso pleno, pupilas dilatadas y piel suave y brillante).
- Mercurius cyanatus 30c, 3 veces al día por 3 días. (Membrana áspera y blanquecina arriba del área laríngea y parte inferior de la lengua, salivación incrementada).
- Sassafras 6c, 3 veces al día por 3 días. (Edema de larínge)(26).

- Spongia marina, Atrona belladonna y Aconitum napellus
(También para traqueitis) (35).

LEPTOS IROSIS

- Aconitum napellus 6c, una dosis cada hora para 3 dosis
Dar en estadios febriles iniciales.
- Chelidonium majus 30c, día y noche por 3 días. (Ictericia, dolor y claudicación en región del hombre derecho)
- Berberis vulgaris 30c, 3 veces al día por 4 días. (Hemoglobinuria, dolor en región lumbar)(26).

LESIONES TESTICULARES

- La Salmonella abortus esta involucrada en lesiones testiculares en el garrañón, edema del prepucio, orquitis, atrofia del tejido testicular, artritis.
- Salmonella abortus equi nosode 30c, diariamente por 5 días.
Preliminar el uso de otros remedios.
- Atrona belladonna 1M, una vez al día por 5 días. Orquitis aguda, excitabilidad y pupilas dilatadas, pulso lleno, testículos enrojecidos y calientes.
- Rhododendron 6c, 3 veces al día por 3 días. (Lesiones testiculares endurecidas, el testículo izquierdo más involucrado).
- Spongia tosta 6c, 3 veces al día por 3 días. (Hinchazón testicular que se extiende al epidídimo, dolor).
- Aurum metallicum 30c, día y noche por 1 semana. (Hinchazón testicular que conduce a endurecimiento).
- Anacardium occidentale 30c, día y noche por 5 días. (Hinchazón testicular que se extiende al abdomen con descarga uretral).
- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 2 días. (Edema del

prejuicio. Este remedio reduce la hinchazón testicular de
tico al edema)(26).

LEUCOENCEFALOMALACIA

- Apericun muscarius 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Ayuda en los casos que muestran depresión de la conciencia y movimientos de incoordinación)
- Curara 30c, 4 dosis cada hora. (Indicado en casos que muestran debilidad muscular y temores).
- Plumbum metallicum 30c, 3 veces al día por 1 semana. (Cuando los principales signos son: caminar en círculos con tendencia a parálisis).
- Phosphorus 200c, 4 dosis cada 3 horas. (Ayuda a la función hepática y al control de hemorragias petequiales que pueden ocurrir en alguna parte del Sistema Nervioso Central).
- Chelidonium majus 1M, 3 veces al día por 3 días. (Util cuando hay ictericia, acompañada por rigidez muscular sobre el área escapular)(26).

LEUCORREA

- Aconitum pulsatilla 30c, día y noche por 5 días. (Descarga acre, espesa y cremosa. Dolor a la micción).
- Alumina 30c, día y noche por 1 semana. (Estados crónicos descargas amarillentas y necrosis en vagina).
- Nyctastix 30c, 3 veces al día por 5 días. Descarga blanca cutarral.
- Kali muristicum 6c, día y noche por 1 semana. (Descarga blanca y lechosa, acompañado de inflamación glandular y lengua blanquecina).
- Arctostaphylos 30c, día y noche por 1 semana. (Descarga verde

amarillenta y acre, olor desagradable, inflamación y - hemorragias equimóticas).

- Nitric acid 6c, una vez al día por 1 semana. (Ulceras en la mucosa vaginal, descargas acuosas, pequeñas úlceras en la boca).
- Psorinum 1M, una vez al día por 5 días. (Piel dura eczematosa, olor rancio conteniendo vesículas con exudado mucoso, debilidad de músculos de la espalda).
- Thuja 200c, 1 vez a la semana por 1 mes. (Formación de verrugas en varias partes del cuerpo especialmente alrededor de la vulva. Descargas verdosas y espesas)(26).

LINFADENITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Debe darse lo más pronto posible en estados tempranos de inflamación)
- Atrona belladonna 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Indicado en casos agudos cuando las glándulas están calientes y sensibles. El animal muestra excitación y dilatación de pupilas, pulso pleno y la piel asociada está caliente y lisa).
- Phytolacca 30c, día y noche por 3 días (Remedio general para hinchazón extendida a glándulas salivales y parótidas. Util para casos agudos y crónicos).
- Kalm hypericum 30c, día y noche por 5 días. (Util cuando hay un edema local asociado).
- Anis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas (Indicado en casos agudos cuando se sospecha de edema de la glándula, fluido circundante en las partes afectadas).
- Mercurius iod. rub. 6c, 3 veces al día por 3 días. (Indicado cuando las glándulas maxilares están involucradas y se encuentran hinchadas y colorosas especial--

mente del lado izquierdo).

- Cistus 6c, día y noche por 1 semana. (Util en linfadenitis crónica, las glándulas están endurecidas, el animal siente frío y debe estar protegido con una manta, las glándulas de la garganta muestran una supuración crónica).
- Solanum dulcamara, día y noche por 4 días. (Indicado cuando la hinchazón y dureza de las glándulas se presenta después de exposición al frío y humedad).
- Hemer sulphuris 200c, día y noche por 5 días. (Remedio conveniente cuando hay supuración de las glándulas, seguido de infección piogena. Animal sensible al frío y las glándulas están extremadamente duras y dolorosas)
- Silicea 1M, diariamente por 1 semana. (Util para casos crónicos, glándulas duras y pueden contener pus)(26).

LINFANGITIS

- Aconitum napellus 6x, 4 dosis cada hora. (Darlo en etapas tempranas).
- Kali bichromicum 200c, 2 veces al día por 4 días (Indicado cuando aparece descargas color miel).
- Calcarea fluorica 30c, 3 veces al día por 4 días. (Vasos sanguíneos dilatados. Util cuando esta asociado glándulas linfáticas).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 3 horas (Indicado en etapas agudas cuando la hinchazón edematosa es prominente)
- Atrium belladonna 200c, 4 dosis cada 3 horas. (Util cuando están asociadas glándulas linfáticas y se encuentran hinchadas y dolorosas. Signos febriles acompañan la dilatación de pupilas y piel caliente).
- Lachesis 6c, 3 veces al día por 2 días. (Necesario cuando

de ocurre linfangitis séptica, los tejidos subaltermos muestran celulitis y la piel llega a estar oscura. Asociados vasos sanguíneos dilatados y sangre puede fluir a l recto senno fluida y oscura).

- Rhus toxicodendron 1M, día y noche por 4 días. (Asociado con hinchazón y sensibilidad a lo largo del ano de los vasos linfáticos, junto con rigidez del miembro, los signos mejoran al descanso; después del ejercicio puede acompañarse de celulitis)(26).

LINFANGITIS ESPORADICA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Siempre darlo primeramente en estados febriles).
- Calcarea fluorica 30c, 3 veces al día por 4 días. (Inflamación temprana de linfáticos y después estado fibroso)
- Kali bichromicum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Resumos serosos de los linfáticos inflamados).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Eruema acompañ linfangitis).
- Rhus toxicodendron 30c, 3 veces al día por 3 días. (Lesiones en la piel llegan a inflamarse. Erisipela)
- Extremamente loción de Rhus toxicodendron y Arnica montana).

LINFANGITIS ULCERATIVA

- Calcarea fluorica 30c, 3 veces al día por 3 días (Ganglios y vasos linfáticos duros, a resantes de que aparecen signos de supuración).
- Phytolacca 200c, día y noche por 3 días (Ganglios linfáticos hinchados y calientes).
- Silicea 200c, 1 vez al día por 3 días. (Casos crónicos

con tenencia u úlceras que llegan a fistularizar sin dolor, áreas necróticas que sanan rápidamente con este remedio)

- Hepar sulphuris 6x - 200c, 3 veces al día por 1 día = 6x. 1 dosis día y noche por 2 días = 200c. (Potencias bajas se utilizan en la maduración de abscesos y las altas provocan reabsorción)(26).

LINFANGITIS ULCERATIVA DE LOS PÓMPROS

- Streptococcus nosode 30c, 1 vez al día por 3 días.
- Silicea 200c, día y noche por 3 días. (Ulceración. Este remedio madura abscesos y cura el tejido necrótico)
- Hepar sulphuris 6x - 200c. 6x= 3 veces al día por 2 días. 200c= 1 dosis mañana y noche por 3 días (26).

MAL DE GARGANTA

- Aconitum napellus 4 gotas cada 2 horas, hasta que signos febriles hayan aminorado, después dar el siguiente remedio.
- Mercurius vivus 6 gotas u 6 glóbulos, 3 veces al día. (Si hay demasiada salivación, agrandamiento e hinchazón de las glándulas del cuello, dificultad al deglutir, empeora en la noche).
- Atropa belladonna 6 gotas u 6 glóbulos, 3 veces al día. (Dificultad al respirar, encogimiento al tocar la garganta y sensación de sofocamiento, dificultad al tragar, fluidos regresan a través de la nariz.)
- Stannia tosta 4 gotas o 6 globulos cada 2 horas. (Dificultad al respirar acompañado con una clase de sonido de estertor, animal tiene aspecto ansioso, gira su cabeza de un lado a otro).

- Lycoperidium clavatum 6 gotas en la mañana y en la noche. (Sudor, membrana nasal y labios amarillos, alitosis)
- Silphium laciniatum 6 gotas en la mañana y en la noche. (Hinchazón es extensa, constricción dolorosa con dificultad al deglutir) (40).

MENINGITIS

- Aconitum napellus 6c, cada hora por 4 horas (Anima mirra ansioso, pulso corto).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas (Estado nervioso acompañado por edema de meninges).
- Atropa belladonna 1M, 3 dosis cada 2 horas. (Encefalitis, dilatación de pupilas y pulso vibrante, piel lisa y caliente, sudoración)
- Helleborus niger 6c, 4 dosis durante cada 2 horas. (Signos de color. Animal recarga la cabeza en algún objeto)
- Zincum metallicum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Gira la cabeza)
- Cicuta virosa 200c, 3 veces al día por 3 días. (Contracción de músculos del cuello y cabeza esta flexionada).
- Labradorum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Espina, cerebro y meninges afectadas, dilatación de pupilas y miembros anteriores presentan dificultad para el movimiento)
- Eryngium album 6c, 3 veces al día por 3 días. (Demuestra vértigo, resequead en membranas mucosas, labios resecos, animal sediento).
- Asclepias tuberosa 200c, 3 veces al día por 4 días. (Util en meningitis espinal, demuestra con tendencia a parálisis de los miembros posteriores, contracción muscular, vértigo).
- Botanophanes antia 3 veces al día por 3 días. (Meningitis, no violentos con débil y trémulos, rigidez muscular)

los reflejos están aumentados y existe una tendencia a atrofiarse los músculos gástricos).

- strychninum 200c, 3 veces al día por 3 días. (Torción violenta, contracción muscular y opistótonos, miembros llegan a estar rígidos) (26).

MIOCARDITIS

- Crataegus 6c, 3 veces al día por 7 días. (Indicado en los casos de debilidad muscular, esfuerzo ocasiona un severo jadeo. Usarlo durante el curso de la enfermedad infecciosa).
- Arsenicum iodatum 30c, día y noche por 5 días. (Secuela de influenza u otra enfermedad infecciosa respiratoria).
- Adonis vernalis 6c, 3 veces al día por 6 días. (Marca de plétora venosa, hidropesía cardíaca, la condición puede estar asociada con degeneración grasa del músculo, - pulso rápido e irregular).
- Strophanthus, 6x, 3 veces al día por 5 días (Debilidad muscular cardíaca, acompañado de pulso rápido y escasa albúmina en orina).
- Digitalis purpurea 6c, 3 veces al día por 7 días. (Palpitación producida al moverse, pulso lento y débil que se aumenta al moverse al animal) (26).

MIOGLOBLINURIA PARALITICA-AZOTURIA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis durante cada hora. (Darlo tan pronto como sea posible en estado febril).
- Atropa belladonna 1M, 4 dosis cada hora. (Cuando hay signos de nerviosismo, pupilas dilatadas, pulso pleno y piel caliente).
- Thallium 30c, 3 veces al día por 3 días. (puede ser usa-

co en estado de parálisis temprana, sudoración).

- Serberis vulgaris 30c, 3 veces al día por 3 días. (Dolor sensible región del riñón, con pronunciada rigidez).
- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 3 horas. (Indicado al comienzo de los signos. Puede estar asociado con temor de ser presionado o tocado).
- Bryonia alba 30c, 3 veces al día por 2 días (Indicado cuando la rigidez o tensión del músculo esta asociada con declinación al movimiento. El animal mejora al reposo).
- Rhus toxicodendron 1M, 4 dosis durante 2 horas. (Cuando se ocupa este remedio los signos estan minorados, cuando el animal puede moverse. Hay dolor sobre la región sacra).
- Sellis serennis 30c, 3 veces al día por 2 días. (Uno de los principales remedios. Hay congestión local de vasos sanguíneos / se asocia con orina oscura).
- Cimicifuga racemosa 30 c, 3 veces al día por 3 días. (Temblor de musculos acompañado de rigidez y tensión).
- Melonica 30c, 3 veces al día por 3 días. (Util en miles de casos principalmente si yeguas son las afectadas) (26).

MIOPATIA

- Sarcocollae acid 30c, día y noche por 4 días. (Músculos del cuello y espalu. estan afectados, contracción y disneu)
- Picric acid 6c, día y noche por 1 semana. (Lebilitad muscular de manera sucesente aparece con el ejercicio)
- Thuja occidentalis 20Cc, una vez al día por 1 semana. (Sudoración acompañada de contracciones musculares)
- Cantharid 1M, una vez al día por 1 semana. (Ca-

(ambros acompañados de endurecimiento muscular)(26).

MIOSITIS

- Arnica montana 30c, 2 dosis cada 2 horas. (Darse siempre en estadios tempranos inflamatorios).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Inflamación y edema).
- Hepar sulphuris 30c. 3 veces al día por 3 días. (Infección por herida abierta)(26).

MUERTO

- Aconitum napellus 6 gotas o 20 globulos 3 o 4 veces al día. (Fiebre, parte afectada inflamada, caliente y colorosa. Animal no come y esta inquieto)(40).
- Argentum 1 o 2 dosis por día. (Cuando la enfermedad no esta muy avanzada)(35).
- Arsenicum y China alternadas 6 gotas o 20 globulos, 3 o 4 veces al día (Si parte hinchada esta fría)(40).
- Rhus toxicodendron 6 gotas u 8 globulos 3 veces al día. (Parte inflamada caliente y miembro rigido)
- Thuja occidentalis 6 gotas u 8 globulos, 3 veces al día (Si no hay granos o parches, si estira frecuentemente el miembro y se escucha una crepitación)(40).
- Hirudo medicinalis 1 o 2 dosis por semana (35).
- Silicium, Arsenicum y Lycoperdium (Contra tuberculos cutáneos).
- Arsenicum sibus alternado con Formica rufipes (Ulceras y botones negros)(35).

NEFRITIS

- Aconitum napellus (sacna fiebre)

- Nitrum
- Rux vomica, Cocculus y Pterodorus (Si hay rigidez en miembros).
- Atropa belladonna (crónica)
- Cannabis sativa (agitación)
- Colocynthis
- Hepar sulphuris (Falta respiración al orinar)
- Mercurius vivus (Sabor al orinar)
- Plumbum (estreñimiento)
- Thuja occidentalis (Hinchazón de patas)(35)

NEFRITIS EMBOLICA

- Hepar sulphuris 200c, día y noche por 5 días (animal muestra extrema sensibilidad a la presión y corrientes frías)
- Silicea 30c, día y noche por 6 días. (Excesiva sudoración signos menos agudos que estos con Hepar sulphuris. Pus aguada y verdosa)(26).

NEPHROSIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis en 1 hora. (Estado agudo. Orina escasa y rojiza).
- Arsenicum album 200c, 4 dosis en 2 horas. (Orina caliente. Diarrea. Signos mejoran a la medianoche).
- Acetic acid 6c, 3 veces al día por 4 días (Casos crónicos costreñido poliuria y orina alba. Puede haber ascitis)
- Aesculus hip. 30c, 3 veces al día por 4 días. (Asociado con problemas hepáticos, Orina escasa y oscura. Dolor en la región lumbar izquierda).
- Berberis vulgaris 30c, día y noche por 5 días. (Dolor en la región lumbar. Poliuria y oliguria).

- Argentum nitricum 30c, día y noche por 4 días. (Orina turbia con olor azulón, paso frecuente de orina e incoordinación de movimiento)
- Natrium muriaticum 200c, día y noche por 1 semana (Ema-ciación, sed, anemia en casos crónicos)
- Cantharis 30c, 4 dosis en cada 2 horas. (Estado de inflamación aguda mostrando severos esfuerzos al paso de orina con sangre y contiene restos de membrana mucosa)
- Plumbum 30c, día y noche por 1 semana. (Frecuente esfuerzo y signos de dolor abdominal. Orina escasa y expelida gota a gota).
- Conium 200c, día y noche por 5 días (Animales viejos - muestran debilidad de miembros posteriores. Debilidad nerviosa, incapacidad para expulsar). Nota: Signos generales de Nefritis incluyen un estado característico de el animal en casos agudos. Los miembros posteriores están rígidos y el lomo se encuentra arqueado y caliente al tocarse, animal sediento. Orina puede contener sangre, pasa con dificultad y en pequeñas cantidades, pulso fuerte y rápido (26).

NEUMONIA

- Aconitum napellus 6c, 6 dosis cada media hora (Debe usarse siempre primero)(26). 4 gotas o 6 glóbulos cada 15-20 o 30 minutos (Hasta que signos más violentos hayan disminuido. Des úes administrarlo en intervalos largos y alternados con el siguiente remedio)(40).
- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 2 días. (Tos seca y pleuritis severa. Empeora al presionar el pecho y al moverse)(26). Bryonia alba 4 gotas o 6 glóbulos cada 1, 2 o 3 horas de acuerdo a la presentación de los signos (40).

- Antimonium tartaricum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Acumulación de saliva mucosa).
- Lycocodium clavatum 200c, 4 dosis cada 2 horas. (Muestra rápida emaciación) (26).
- Phosphorus 200c, 4 dosis cada 2 horas. (Remedio principal hepatización establecida, se resiente a la presión, particularmente sobre el lado izquierdo, temblores del cuerpo) (26). Phosphorus 4 gotas o 6 globulos cada 1, 2 o 3 horas de acuerdo a la violencia de los signos. Cuando los signos febriles más violentos hayan disminuido usarlo y alternarlo con Aconitum narellus (40).
- Iocum 30c, 4 dosis cada hora. (Hepatización se disemina rápidamente, pulso lleno, ausencia de dolor del pecho, temperatura ligeramente alta).
- Sanguinaria 30c, día y noche por 5 días. (Signos del corazón tales como debilidad valvular y acompañada de congestión pulmonar, la orina puede contener fosfatos).
- Tuberculinum aviare 200c, día y noche por 5 días. (Principalmente potros jóvenes con pérdida de fuerza y apetito, los extremos de los pulmones estan más involucrados que otras porciones de tejido) (26).
- Atropa belladonna 4 gotas o 6 globulos cada 1, 2 o 3 horas. (Si la respiración se escucha difícil y en cada respiración existe un sonido de golpeteo, tos seca ocasiona una constricción espasmodica de la garganta y pecho).
- Tartur emetic, 4 gotas o 6 globulos cada 3 o 4 horas (respiración corta y difícil, tos comenzando en un paroxismo, pulso irregular e imperceptible, esto es util si se usa antes que comienza la hepatización) (40).
- Sulfura cin 30c, 3 veces al día por 3 días (Aspecto respiración ve aguda y pariente, el pulso decrece en la noche

- y sanguenta de nuevo)(26).
- Beryllus 30c, 3 veces al día por 3 días. (Disnea, asociados signos dermicos)(26).
 - Mercurius vivus, 6 gotas 3 veces al día. (Si hay demasiada descarga, tos seca, respiración oprimida, pulso débil y sudoración).
 - Ipecacuanha, 6 gotas cada 1, 2 o 3 horas de acuerdo a la violencia del caso. (Si la respiración es rápida y ansiosa, estertores, ojos rojos e inflamados).
 - Rhus toxicodendron, 6 gotas cada 1, 2 o 3 horas de acuerdo a la violencia de los signos. (Si hay opresión y esfuerzo al respirar, nariz roja, inflamada y dolorosa al tacto, miembros separados).
 - Hepar sulphuris, 6 gotas 3 veces al día. (Respiración profunda con estertores, expectoración de moco como si estuvieran formados tuberculos o abscesos).
 - Scilla, 4 gotas o 6 globulos cada 3 horas. (Tos colorosa y violenta, respiración rápida y ansiosa, deseo constante de orinar)(40).

NEUMONIA OR CORYNEBACTERIUM DE LOS POTROS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Estados febriles iniciales).
- Arsenicum album 6c, 3 veces al día por 1 semana. (Potros de 6 meses, emaciación, debilidad, sed frecuente y diarrea).
- Antimonium tartaricum 30c, 3 veces al día por 4 días. (Tos húmeda y estertores, disnea).
- Lycoperidium clavatum 20c, día y noche por 1 semana. (Respiración difícil que involucra el ala nasal, acompañado de síntomas neurológicos).

- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 2 días. (Rápido inicio, tos con exudado sanguinolento con estrias de fibrina).
- Arsenicum iodatum 30c, 1 vez al día por una semana. (Cuando las condiciones severas se han resuelto, este remedio puede llevar a la recuperación).
- Tuberculinum aviare 200c, una vez al día por 4 días. (Bronconeumonía aguda en animales jóvenes con debilidad)(26).

NEUMONIA INFECCIOSA EQUINA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Estadios febriles iniciales).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 3 días. (Hepatitis, disnea severa, descarga nasal).
- Antimonium tartaricum 30c, día y noche por 4 días. (Tos y estertores).
- Bryonia alba 6c, tres veces al día por 2 días. (Pleuritis involucrada, la presión sobre el pecho alivia, empeora con el movimiento).
- Lycopodium clavatum 200c, día y noche por 5 días. (Signos empeoran en la tarde, signos hepáticos pueden estar presentes tales como ictericia).
- Ferrum phosphoricum 6c, tres veces al día por 3 días. (Tos con sangre, signos mejoran en la noche).
- Iodum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Util cuando la condición se acompaña de sequedad de la piel, animal empeora en el calor y viento frío).
- Sanguinaria 6c, 3 veces al día por 3 días. (Animal nervioso, mostrando dilatación de vasos sanguíneos, fácilmente suda y el moco está teñido de sangre al toser)(26)

NINFORMANIA

- Anemone pulsatilla
- Sabina
- Cocculus
- Cantharides
- Platina, Camphora y Cannabis sativa (Calores largos y yegua no queda cargada)(35).

OCENA

- Cadmium sulphur 30c, 3 veces al día por 3 días. (Polipos nasales con ulceración y obstrucción).
- Aurum metallicum 30c, 3 veces al día por 4 días. (Olor ofensivo con descargas purulento-hemorrágicas, nariz inflamada, descarga empeora en la noche).
- Lemna minor 30c, 3 veces al día por 3 días. (Polipos nasales, cornetes inflamados, empeora en climas húmedos, alitosis).
- Perula asafoetida 6c, 3 veces al día por 4 días. (Descarga purulenta, caries en huesos nasales).
- Mercurius corrosivus 200c, día y noche por 3 días. (Perforación del septo nasal, descarga nasal verdosa y acuosa y puede estar teñida de sangre)(26).

OPTALMIA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora (26).
Aconitum napellus cada 2 o 3 horas (35).
- Atropa belladonna 200c, 4 dosis cada 2 horas. (Signos nerviosos, pulso lleno y piel caliente)(26). Atropa belladonna (lagrimeo y alteración de la vista)(35).
- Kali hydriodicum 200c, día y noche por 4 días. (Lagrimeo y descargas).

- Silicea 200c, 1 vez al día por una semana. (Opacidad corneal, estado supurativo).
- Mercurius corrosivus 200c, día y noche por una semana (Ojos rojizos, descarga purulenta de un color verdoso y diarrea).
- Argentum nitricum 30c, día y noche por una semana. (Descargas profusas purulentas con opacidad corneal y ulceración, músculos ciliares débiles).
- Rhus toxicodendron 1M, una vez al día por una semana. (Celulitis orbital e irritación de la piel, rigidez muscular y eritematosa, garganta dolorosa)(26).
- Anemone pulsatilla 30c, día y noche por una semana. (Descarga purulenta espesa y cremosa, aglutinación de párpados, ingurgitación de las venas del ojo)(26).
- Hepar sulphuris (35), 200c, día y noche por una semana. (Demasiada descarga purulenta, bajas potencias lo aceleran, mientras que altas aceleran la resolución)(26).
- Cannabis sativa y Euphrasia (Si córnea no recupera su transparencia).
- Spigelia (párpados inflamados).
- Conium (córnea cubierta por un velo).
- Arnica montana, colirio: 30 gotas de tintura en un litro de agua. Si la condición es debida a un golpe.
- Cannabis sativa y Atropa belladonna, 8 gotas a la 15a. dinamización cuando queda ligera alteración en la parte afectada.
- Calcarea carbonica.
- Lycopodium clavatum (35).

OFTALMIA AGUDA

- Aconitum napellus, 6 gotas cada 3 horas, hasta que el

animal vea. (Dar al comienzo de la enfermedad).

- Atropa belladonna, 6 gotas, tres veces al día. (Si queda opacidad en el ojo).
- Euphrasia, 6 gotas, 2 veces al día. (Si hay intolerancia y ligero lagrimeo).
- Cannabis sativa, 6 gotas, dos o tres veces al día. (Si hay opacidad en la córnea, manchas blancas y un engrosamiento de los párpados)(40).

OPTALMIA PERIODICA

- El animal debe estar en un lugar oscuro para evitar la exposición a la luz.
- Aconitum napellus 6x, Atropa belladonna 200c, deben darse a intervalos de cada hora alternados, 4 dosis cada uno.
- Kali bichromicum 200c, día y noche por una semana.(Tos).
- Conium 30c, día y noche por una semana. (Fotofobia y la grimeo. Parálisis o rigidez de músculos del ojo).
- Graphites 6c, tres veces al día por una semana. (Intolerancia a la luz artificial, párpados enrojecidos y fisurados).
- Silicea 200c, una vez diariamente por una semana, seguido por una dosis semanal de la potencia 1M por 4 semanas (Acelera la resolución de tejido cicatrizal que puede quedar después de daño por inflamación y ulceración)(26).
Silicea, 6 gotas en un poco de agua, dos veces al día. (Si ojos están abiertos espasmódicamente o úlceras en el interior del ángulo del ojo. Esclerótica rojiza)(40).
- Euphrasia, 6 gotas diarias por 8 a 10 días.
- Calcarea carbonica, 6 gotas o 6 glóbulos en la mañana y en la noche. (Si pupilas están dilatadas, sensible a la luz, visión imperfecta aunque el ojo se vea limpio y brillante).

- Cannabis sativa 6 gotas o 6 glóbulos en la mañana y noche. (Opacidad corneal, manchas blancas, contracción de pupilas y presencia de una línea roja en la superficie del ojo).
- Causticum 4 o 6 gotas, 3 veces al día. (Si tiene ardor e hinchazón de los párpados, opacidad del ojo y contracción de pupilas).
- Hepar sulphuris 6 gotas o 6 glóbulos, dos veces al día hasta que mejore. (Párpados adheridos durante la noche, apariencia hundida del ojo o manchas en la córnea).
- Natrum muriaticum 6 gotas o 6 glóbulos, dos veces al día. (Incapacidad de abrir los párpados, descarga de material del ojo).
- Anemone pulsatilla 6 gotas o 6 glóbulos, 3 veces al día hasta la recuperación. (Si existe dilatación y contracción alternada de pupilas, borde de párpado rojo y un material amarillento escapa de la córnea de los ojos).
- Sulphur acid 6 gotas cada noche como remedio común, será usado en algún periodo de la enfermedad.
- Causticum interna y externamente, en forma de loción: 10 gotas de la 3a. dilución en una onza (28.35 grs) de agua para ser aplicada dos veces al día con una pequeña brocha (40).

OPACIDAD CORNEAL

- Silicea 200c, una dosis por semana por 4 semanas. (Ayuda a promover la absorción del material opaco).
- Arnica montana 30c, una dosis por día por 3 días. (Si es el resultado de una herida).
- Calcarea carbonica 200c, una vez diariamente por una semana. (Ulceración).

- Calcarea fluorica 30c, día y noche por una semana. (Conjuntivitis, involucrados vasos corneales, córnea rojiza).
- Causticum 30c, día y noche por una semana. (Blefaritis y tendencia a catarata).
- Cannabis sativa 6c, tres veces al día por 3 días. (Respiración dolorosa, moco y pus en orina).
- Externamente la aplicación diaria de loción Cineraria (26).

OSTEOARTRITIS

- Osteoarthritis nosode 30c, 4 dosis por una semana. Alivia síntomas de dolor.
- Rhus toxicodendron 1M, una vez al día por una semana. (Aminorar los signos de dolor cuando el animal se mueve)(26).

OSTEODISTROFIA

- Calcarea fosforica 200c, una vez al día por dos semanas. Signos de dolor acompañando crecimiento óseo en los extremos de los huesos largos).
- Phosphoric acid 6c, día y noche por una semana. (Debilidad en animales jóvenes y en crecimiento. Periostio afectado frecuentemente).
- Iodum 30c, una dosis al día por una semana. (Agrandamiento doloroso de articulaciones, piel seca)(26).

OSTEODISTROFIA FIBROSA

- Calcarea phosphorica 30c, día y noche por 2 semanas. Ayuda a restablecer la proporción de calcio y fósforo.
- Calcarea fluorica 30c, día y noche por 7 días. Esta es una forma de tratamiento el cual puede ser repetido en intervalos mensuales. (Donde hay exostosis articular y

algún problema dental, es el remedio de preferencia).

- Phosphoric acid 6c, una vez al día por 10 días. Los potros rápidamente desarrollan una respuesta rápida a este remedio (26).

OSTEOTARSITIS

- Hekla lava D3 más Calcium carbonicum Hahn. D6 (56).

OTITIS

- Aconitum napellus
- Eryonia alba
- Hepar sulphuris
- Arsenicum album (cuando hay absceso)
- Anemone pulsatilla, Lycopodium clavatum, Sepia, Petroleum y Silicea contra abscesos profundos del conducto auditivo (35).

OVARITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis por hora. (Util en estadíos tempranos, fiebre, pulso aumentado y la respiración permanece igual).
- Apis mellifica 6c, tres veces al día por 2 días. (Inflamación, hiperemia, edema).
- Eryonia alba 6c, tres veces al día por 2 días. (Ovario derecho afectado, los animales se patean el flanco. Animales prefieren estar de pie y quietos).
- Lilium tigrinum 200c, tres veces al día por 3 días. (Inflamación uterina con descargas, debilidad de miembros posteriores. Movimientos frecuentes).
- Cimicifuga racemosa 30c, dos veces al día por 4 días. (Ovario izquierdo afectado, dolor lumbar que se extiende a la glándula mamaria, corazón débil e irregular).

- Hamamelis 6c, tres veces al día por 3 días. Congestión venosa general. Vasos sanguíneos de la garganta agrandados. Dolor se extiende sobre el abdomen y puede haber metrorragia.
- Iodum 6c, tres veces al día por una semana. Animales con apetito excesivo y resecaedad de la piel. Glándula mamaria reducida.
- Cantharis 30c, dos dosis cada 2 horas. (Excitación furiosa y estranguria severa. Orina con sangre y gotas. Vesículas en la piel).
- Palladium 30c, dos veces al día (día y noche) por una semana. (Ovario derecho, leucorrea y flatulencia)(26).

PAPERA EQUINA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Estadios febriles iniciales)(26).
- Atropa belladonna (35) 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Pulso lleno, pupilas dilatadas, excitabilidad nerviosa)(26)
- Phytolacca 30c, 3 veces al día por 4 días. (Ganglios linfáticos vecinos o glándulas salivales firmes, dolorosas e inflamadas).
- Anemone pulsatilla 6c, día y noche por 3 días. (Descarga mucosa amarillenta. Area faríngea dolorosa)(26).
- Mercurius vivus 200c, día y noche por 3 días. (Salivación y diarrea escasa, descarga nasal verdosa con manchas de sangre)(26). Mercurius vivus (salivación)(35). Mercurius vivus una dosis de 6 gotas, dos veces al día por algunos días, después dar Sulphur acid (40).
- Sulphur acid una o dos dosis para que se cure completamente (40).
- Hepar sulphuris 200c, potencia baja 6x, 3 veces al día por un día. Altas potencias, día y noche por 2 días.

(Ruptura de abscesos, aborto)(26). Para que el absceso debride (35).

- Solanum dulcamara, 1 dosis diaria.
- Arsenicum album (deyección nasal).
- Spiritus sulphuratus (abscesos debriden).
- Baryta carbonica (si medicamentos anteriores fracasaron)(35).

PAFILOMATOSIS

- Thuja occidentalis 200c, 1 vez al día por 10 días. (Remedio principal para las verrugas, especialmente aquellas que sangran fácilmente).
- Causticum 30c, día y noche por 1 semana. (Indicado para verrugas duras asociadas con debilidad y temores musculares de los miembros anteriores).
- Calcarea carbonica 200c, 1 vez al día por 1 semana. (Verrugas nequeñas, duras y que no sangran fácilmente)(26).

PARALISIS

- Aconitum napellus
- Arsenicum
- Arnica montana
- Atropa belladonna
- Solanum dulcamara
- Ruta graveolens
- Platina e Ipecacuanha
- Eryonia alba
- Cocculus
- Calcarea carbonica
- Causticum
- Rhus toxicodendron

- Sulphur
- Aurum (35).

PARALISIS DE LOS LABIOS

- Gelsemium sempervirens 200c, 3 veces al día por 2 días. Seguido de tres dosis, una cada dos días. (Condición - debido a un resultado de toxemia).
- Arnica montana 10M, una dosis solamente para después - continuar con otros remedios. (Parálisis como resultado de una lesión).
- Plumbum 30c, tres veces al día por 3 días. (Debilidad o parálisis en otras partes).
- Gausticum 200c, día y noche por 3 días. (Condición originada a exposición a corrientes frías).
- Ammonium phosphoricum 6c, tres veces al día por 3 días. (Signos de temblores o tambaleo al andar)(26).

PARALISIS DEL NERVI0 FACIAL

- Gelsemium sempervirens 200c, una vez al día por una semana. (Usado especialmente en parálisis debido a enfermedades infecciosas).
- Causticum 30c, dos veces al día por 5 días. (Debido a - exposiciones al frío).
- Ammonium phosphoricum 6c, dos veces al día por 5 días. (Coriza en la mañana).
- Zincum picricum 6c, dos veces al día por una semana. (Indicado en contracciones musculares parecidos a la Corea) (26).

PARALISIS DEL NERVIO FEMORAL

- Arnica montana 30c, dos dosis separadas por 3 horas. (Si se sospecha de una lesión).
- Gelsemium sempervirens 200c, día y noche por 4 días. (Debilidad y lasitud acompañan el cuadro clínico).
- Conium 30c, día y noche por una semana. (Tendencia de parálisis a ascender, afectando áreas más superiores del miembro).
- Plumbum metallicum 30c, día y noche por una semana. (Dificultad al extender el miembro, el reflejo esta perdido y el casco puede estar hinchado)(26).

PARALISIS RADIAL

- Gelsemium sempervirens 200c, 3 veces al día por 3 días. (Debilidad de músculos de miembro).
- Plumbum metallicum 6c, 3 veces al día por 4 días. (Tendones extensores involucrados y el reflejo esta disminuido).
- Curare 30c, 3 veces al día por 5 días. (Debilidad de músculo esta asociado con temblores y pérdida de la acción de reflejo).
- Ruta graveolens 6c, día y noche por una semana. (Lesión del tendón con posible periostitis).
- Arnica montana 30c, dos dosis durante cada 12 horas. (Parálisis como resultado de una caída o una cox)(26).

PARALISIS DE TERMINALES NERVIOSAS DEL TRACTO ALIMENTARIO

- No existe un tratamiento efectivo esentado porque no hay signos prodromicos indicando la enfermedad. Una vez que los signos aparecen, los animales empeoran rápidamente, las oportunidades para estudiar y tratar esta enfermedad

son muy pocas, los siguientes remedios estan considerados a juicio:

- Gelsemium sempervirens LM, en potencias altas quiza posiblemente influya favorablemente en la parálisis de la garganta y boca.
- Plumbum metallicum. Parálisis generalizada, especialmente del intestino.
- Conium. Cuando la parálisis ocurre en miembros posteriores como en la postura de "perro sentado".
- Zincum metallicum. Util en el control de temblores musculares y sudoración.
- Cocculus. Asociado parálisis de la parte inferior de miembros y timpanismo.
- Nux vomica. Puede ser útil en estasis intestinal. Especialmente en inquietud.
- Lathyrus sativa. La prueba de este remedio sugiere que puede ser de valor en la restauración de la función nerviosa, sino esta completamente perdida.
- Thallium. Parálisis asociada con distensión abdominal y útil en estasis intestinal (26).

PARALISIS DE LA VEJIGA

- Gelsemium sempervirens 200c, día y noche por 5 días. - (Hay un flujo profuso de orina pálida la cual es arrojada lentamente cuando la vejiga esta llena).
- Conium 30c, 3 veces al día por 4 días. (Cuando la micción se presenta y para frecuentemente. Hay dificultad a la expulsión. La condición puede acompañarse de debilidad en miembros posteriores mostrando dificultad al elevarse)(26).

PARAQUERATOSIS

- Kali arsenicum 30c, día y noche por una semana. (Puede haber comezón).
- Cantharis 200c, día y noche por 4 días. (Estado agudo, - comezón y piel rojiza. Esfuerzo a la micción, orina expulsada gota a gota).
- Graphites 6c, 3 veces al día por 4 días. (Resecuedad persistente y exudación).
- Sulphur iodatum 6c, día y noche por una semana. (Erupción papular, usualmente con comezón y piel rojiza)(26).

PARASITOSIS

- Cina, 6 gotas u 8 glóbulos, 3 veces al día. (Si arroja animales, prurito constante de parte afectada).
- Sulphur acid, 6 gotas u 8 glóbulos, 3 veces al día. (Descarga lombrices con heces duras).
- Mercurius solubilis 6 u 8 gotas, 2 veces al día. (Si presenta esfuerzos violentos de los flancos, descarga parásitos grandes y dolor en el ano).
- Cina 6 gotas u 8 glóbulos 3 veces al día. (Si hay ascárides, parásitos rojos y oscuros en gran cantidad).
- Digitalis purpurea, 6 gotas dos veces al día. (Diarrea).
- Datura stramonium 6 gotas, dos veces el día. (Si animal se rasca el trasero)(40).

PAROTIDITIS

- Aconitum napellus (35), 6c, 4 dosis. Una cada hora. (Exposición al frío, produciendo fiebre). Este remedio debe ser usado antes de dar algún otro (26).

- Atropa belladonna (35) 1M, 4 dosis. Una cada hora. (Glándula caliente e inflamada, puede mostrar signos de delirio, pupilas dilatadas, pulso débil)(26).
- Anemone pulsatilla 6c, 3 veces al día por 3 días. (Glándula derecha afectada, con boca seca y cubierta blanquecina en la lengua).
- Calcarea fluorica 6c, 3 veces al día por 3 días. (Glándula dura, signos de inflamación se reducen y llegan a asociarse ganglios linfáticos).
- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por un día, seguido de una dosis en la mañana y noche de la potencia 200c por 2 días. (Originada por exposición al frío, los signos se reflejan al presionar la glándula).
- Baryta carbonica 30c, 3 veces al día por 3 días. (Usado para animales jóvenes o muy viejos, la inflamación se extiende a las tonsilas y venas de la garganta pueden estar engrosadas).
- Ferrum phosphoricum 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Se siente caliente la boca cuando es examinada, con tonsilitis y ulceración de la garganta).
- Kali bichromicum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Descarga filamentosas dura de la boca y garganta, paladar blando puede contener depósitos membranosos, pulso débil y lento).
- Mercurius corrosivus 6c, 3 veces al día por 2 días. - (Garganta completamente inflamada y la hinchazón se extiende abajo del cuello; incapacidad para tragar).
- Phytolacca 30c, 3 veces al día por 3 días. (Garganta enrojecida con hinchazón de tonsilas, la cual puede ser hídropsica, depósitos membranosos en garganta, lagrimeo).
- Rhus toxicodendron 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Glándula

izquierda afectada, pequeñas vesículas aparecen en angulos de la boca, lengua cubierta y orilla enrojecida, -- garganta inflamada, ojos hinchados y enrojecidos acompañados por celulitis)(26).

- Sulphur acid (supuración).
- Lycopodium clavatum (supuración)(35).

PARTO DIFICIL

- Chamomilla
- Anemone pulsatilla
- Cannabis sativa
- Secale cornutum (dolores con movimientos convulsivos y a cesar de Anemone pulsatilla y Opium).
- Sabina (retención placenta).
- Aconitum napellus y Chamomilla (para bajar leche)
- Nux vomica (parálisis en riñones).
- Aconitum napellus y Anemone pulsatilla (signos febriles).
- Arnica montana (35), usar loción de Arnica externamente una parte de tintura en 20 partes de agua. Internamente 6 gotas cada 2 o 3 horas (40).
- Arnica montana y Sabina alternadas (inflamación de matriz)(35).

PERICARDITIS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Estados febriles iniciales).
- Eryonia alba 30c, día y noche por 3 días. (Tos seca como una secuencia a pleuresis).
- Apis mellifica 30c, día y noche por una semana. (Remedio principal en efusión, cuando el seco pericardico esta - afectado hay ausencia de sonidos de fricción).

- Arsenicum album IM, día y noche. (Debilidad y postración con sed, toma en pequeñas cantidades, empeora a la media noche).
- Spigelia 30c, día y noche por 5 días. (Pulso tembloroso, el animal tiende a echarse del lado derecho, gran dolor al movimiento).
- Colchicum autumnale 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Pulso con tensión débil, sed y flatulencia con incremento en la - salivación).
- Natrum muriaticum 200c, día y noche por 10 días. (Estado crónico, incremento de sed y desgaste).
- Cantharis 200c, día y noche por 5 días. (Efusión. Signos urinarios, sangre en orina).
- Spongia tosta 6c, 3 veces al día por 5 días. (Hipertrofia del corazón como resultado de depósitos de fibrina en el miocardio, principalmente pericarditis crónica)(26).

PERIOSTITIS

- Hekla lava D6 (D8) y Calcium carbonicum D4 o Calcium - phosphoric D4. (Casos de dolor y sensibilidad a la presión, comienzo de periostitis).
- Symphytum D2 y Hekla lava D3 (D4). (Periostitis osificante y cojeo)(56).

PERIOSTITIS DE LA ARTICULACION DEL MENUDILLO

- Arnica montana 30c, dos dosis separadas por 3 horas.
- Ruta graveolens 200c, 2 veces el día por 4 días. (Ayuda al control de depósito de nuevo hueso).
- Apis mellifica 30c, 4 dosis cada hora. (Fluido inflamatorio en la cápsula articular).
- Silicea 30c, una vez al día por 10 días. (En casos cró-

- nicos, ayudará a la reabsorción de tejido fibroso).
- Calcareea fluorica 30c, una vez a la semana por 4 semanas. Cuando la exostosis ya ocurrió.
 - Bryonia alba 200c, 4 dosis durante cada 2 horas. (Dolor y calor, ocurre en estadios tempranos. Empeora al movimiento o mejora por presión)(26).

PERIOSTITIS METACARPIANA

- Arnica montana 30c, dos dosis separadas por 12 horas.
- Ruta graveolens 6c, 3 veces al día por 3 días. (Principal remedio, previene la formación de exostosis).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis durante cada 2 horas. (Predomina edema subcutáneo).
- Calcareea fluorica 30c, una vez al día por 10 días. (Casos de descuido, si los depositos tienen comienzo en el hueso).
- Externamente el área afectada debe ser lavada con Ruta y loción de Arnica montana (26).

PERITONITIS

- Aconitum napellus una dosis cada 15 o 30 minutos hasta que el pulso se normalice.
- Bryonia alba
- Cantharides una dosis nada más (orina con sangre).
- Arsenicum album (si el animal tiene gran debilidad)(35).

PICADURA DE INSECTO

- Urtica urens, externamente.
- Arnica montana, una o dos dosis internamente (35).

PICADURA DE SERPIENTE

- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 2 días. (Edema local).
- Naja 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Usarlo cuando hay edema en la piel y presenta decoloración de la piel, salivación).
- Crotalus horridus 200c, 4 dosis cada 2 horas. (Cuando hay hemorragia e infecciones secundarias. La sangre esta obscura y acuosa).
- Echinacea angustifolia 6x, 5 dosis cada hora. (Cuando hay infecciones secundarias de heridas venenosas. Esto toma la forma de envenenamiento sanguíneo con involucración de linfáticos).
- Tarentule cubensis 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Util cuando hay hinchazón circundando la picadura y la piel esta púrpura).
- Lechesis IM, 4 dosis cada hora. (Cuando la piel circundante a la herida aparece azulosa, con signos sistémicos involucrando la región de la garganta).
- Anthracinum 200c, 4 dosis cada 2 horas, seguido por una dosis diaria por 3 días. (Este nosode esta indicado cuando el tejido subcutáneo llega e endurecerse y a necrosarse. La sangre esta obscura, ganglios linfáticos asociados llegan a inflamarse)(26).

PIELONEFRITIS

- Hepar sulphuris 200c, día y noche por 4 días. (Acompañada por linfadenitis supurativa. Dolor e hinchazón en el lomo. Excesiva reacción al viento frío o corrientes, al tocar el área del riñón también hay sensibilidad).
- Silicea 30c, día y noche por una semana. (Casos más crónicos, pus en orina, blanco cremosa).

- Streptococcus nosode 30c, una vez al día por 3 días. (Remedio útil al darse con otra medicina).
- Mercurius corrosivus 200c, día y noche por 4 días. (Orina con sangre y pus verdosa).
- Benzoic acid 6c, 3 veces al día por 3 días. (Cuando la condición resulta de una cistitis supurativa o catarral primaria. Orine con alto contenido de ácido urico).
- Kali bichromicum 200c, día y noche por 5 días. (General inflamación catarral de mucosas, especialmente la respiratoria. La orina contiene albúmina y excesivo carácter mucoso).
- Uva ursi 6c, 3 veces al día por 5 días. (Tendencia a formación de cálculos. A menudo con urticaria y signos respiratorios como disnea. Moco y pus en orina con carácter coloidal pegajoso mostrando coagulación).
- Epigea 1x, 3 veces al día por 5 días. (Cuando la cistitis crónica conduce a una pielonefritis secundaria. La orina contiene depósitos finos con pus y hemoglobinuria).
- Populus tremuloides 1x, 3 veces al día por 5 días. (Signos gástricos especialmente en animales viejos y particularmente en yeguas preñadas)(26).

PITIRIASIS O CASPA

- Arsenicum album 1M, una vez al día por 2 semanas. (Especialmente para animales de piel fina. El temperamento esta usualmente apaciguado y hay sed).
- Kali sulphuricum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Signos gástricos y respiratorios. Puede haber eczema mostrando erupción papular).
- Lycopodium clavatum 200c, día y noche por 1 semana. (Engrosamiento de la piel, la cual llega a estar reseca y partida).

- Natrum muriaticum 200c, día y noche por una semana. (Condición asociada con piel grasosa. Puede haber incremento en la orina con baja gravedad específica).
- Graphites 6c, 3 veces al día por una semana. (Piel áspera y dura).
- Sulphur 6c, 3 veces al día por una semana. (La piel generalmente se ve enfermiza y sucia. Puede haber un olor a humedad. La piel tiende a presentar excoriaciones) (26).

PLEURESIA

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Estadios tempranos febriles).
- Bryonia alba 30c, 4 dosis cada dos horas. (Mejora en reposo, alivio al presionar el área pleural).
- Apis mellifica 30c, 3 veces al día por 3 días. (Edema en cavidad pleural, escasa orina y fuertemente coloreada).
- Cantharis 200c, 3 veces al día por 2 días. (Efusión pleural, expectoración mucosa con tos teñida de sangre, es fuerza severo al orinar).
- Guaiacum 6c, 3 veces al día por 2 días. (Superficies articulares de las costillas son sensibles al dolor más que en otra parte. La tos ayuda al alivio de los signos y la expectoración facilita la brevedad de la respiración).
- Kali carbonicum 200c, 3 veces al día por 3 días. (Signos de dolor empeoran en el lado derecho, tos empeora en la mañana, garganta seca usualmente).
- Senega 30c, 3 veces al día por 3 días. Estornudos vienen después de toser. Util en pleuritis exudativa).
- Squilla 6c, 3 veces al día por 2 días. (Tos provocada al beber, el dolor se extiende a los músculos abdominales).

- La micción se incrementa en la noche).
- Arsenicum iodatum 30c, una vez al día por una semana. (Estado crónico con tos seca que persiste después del tratamiento. Usado generalmente para casos de recuperación lenta).
 - Sulphur acid 30c, una vez al día por 5 días. (Util en estados convalecientes de pleuritis).
 - Sanguinaria 6c, 3 veces al día por 3 días. (Tos incrementada de flemas. Tos siempre retorna después de cada ataque febril)(26).

PRESENTACION DEGENERATIVA DE LA RANILLA DEL CASCO

- Kreosotum 200c, una vez al día por 5 días. (Asociada con trastornos constitucionales junto con la condición degenerativa).
- Silicea 200c, una vez diariamente por 5 días. (Ayudará curando el tejido necrotico y promueve la granulación).
- Kali bichromicum 30c, día y noche por 7 días.
- Externamente, los surcos de la ranilla deberan ser vendados tempranamente con tapones de algodón empapados en loción de Calendula, Kali bichromicum y Arnica montana (26)

PRURITO

- Rhus toxicodendron (35).

PTERIGION

- Conium
- Cannabis sativa
- Euphrasia v Causticum
- Sulphur acid como tratamiento consecutivo (35).

PTIRIASIS

- Sabadilla internamente y
- 3 partes de grasa y una parte de granos de perejil hacen de una pomada, externamente (35).

PURPURA HEMORRAGICA

- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Usarlo tan pronto como se presenten problemas de edema).
- Phosphorus 200c, 3 veces al día por 3 días. (Indicado para hemorragias petequiales. Util en hemorragias viscerales especialmente si son de origen hepático).
- Kali bichromicum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Previene el desarrollo de edema. Util en el control de resumos de suero).
- Crotalus horridus 200c, 4 veces al día por 2 días. (Remedio valioso para hemorragias generales, con resumos de sangre obscura de hemorragias petequiales generalizadas. Util si la ictericia esta presente).
- Lechesis 30c, 3 veces al día por 3 días. (Indicado cuando hemorragias petequiales generalizadas estan acompañadas por hinchazón de garganta y epistaxis).
- Hamamelis 6c, 3 veces al día por 3 días. (Si hay congestión venosa con agrandamiento de venas de la garganta, petequias asociadas con irritación de la piel. Si hay previa historia de enfermedad infecciosa debe administrarse un nosode al comenzar el tratamiento y combinar con los remedios indicados. Dosis: una vez al día por 3 días (26).

PUS EN BOLSAS GUTURALES

- Hepar sulphuris 6x - 200c, 6x= 3 veces al día por 2 días. 200c = una dosis en la mañana y noche por 2 días en altas potencias. Usado en bajas potencias acelera la descarga de material purulento. En altas potencias ayuda a reabsorber la condición.
- Silicea 200c, una vez diariamente por 7 días. (La descarga es blanquecina y purulenta. Ayuda a promover la recuperación de superficies ulceradas dentro de la bolsa).
- Hydrastis 30c, 3 veces al día por 2 días. (Si las descargas toman la forma de un simple catarro sin presentación purulenta).
- Mercurius corposivus 200c, 3 veces al día por 3 días. (Descargas purulentas aguadas de color verdoso posiblemente con sangre, puede presentarse salivación y diarrea).
- Kali bichromicum 30c, una vez al día por una semana. (Pus amarillo claro)(26).

QUEMADURAS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada 2 horas (26).
- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas por 2 horas (26).
- Cantharis 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Ampollas, severo dolor, piel caliente e hinchada)(26).
- Arnica montana interna y externamente (35).
- Urtica urens 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Quemaduras con ampollas, tendencia a prurito)(26). Tintura de Urtica urens externamente (35).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Edema del tejido subcutáneo).
- Externamente la aplicación de unguento de Cantharis, Ur-

tica urens y Apis mellifica seran de ayuda. Unas compresas de lócion Calendula será de valor considerable (26).

QUISTES OVARICOS

- Apis mellifica 6c, 3 veces al día por 4 días. (Principal remedio para condiciones hidrópicas).
- Aurum muriaticum nat. 6c, 3 veces al día por 4 días. (Metritis crónica, descargas y ovarios indurados).
- Colocynthis 6c, 2 veces al día por una semana. (Ninfomanía y dolor abdominal).
- Cophorinum 6c, 3 veces al día por una semana. (Afecciones cutáneas, eczema sin prurito).
- Platina metallicum 30c, día y noche por una semana. (Ninfomanía con constipación y dolor abdominal y pelvico).
- Aurum iodatum 6c, 3 veces al día por una semana. (Lesiones degenerativas en otras áreas, inflamación crónica de membranas serosas)(26).

QUISTES SEBACEOS (LUPIAS)

- Aconitum napellus una dosis diaria por 3 o 4 días (35).
- Baryta carbonica 30c, 2 veces al día por 5 días. (Quiste prominente en la cabeza y cara).
- Benzoic acid 6c, 3 veces al día por 5 días. (Quiste en cara, acompañado por cistitis con orina oscura)(26).
- Calcarea carbonica (lupias sin pelo)(35).
- Conium 200c, una vez al día por 7 días. (Casos crónicos cuando el quiste esta firme y duro).
- Apis mellifica 30c, 4 dosis durante 3 horas. (Estadio temprano cuando hay abundante fluido presente y signos inflamatorios aparecen)(26).
- Mercurius vivus (para que supuren).

- Silicea (para terminar el tratamiento)(35).

RANULA

- Thuja occidentalis 200c, 3 veces al día por 3 días. (Amolla en lengua con inflamación de las encías).
- Apis mellifica 30c, 3 veces al día por una semana, seguido por una dosis diaria de algún otro remedio en la potencia 200c, para ser 4 dosis. (Utilizado para reducir el fluido de la ranula).
- Atropa belladonna IM, 4 dosis, una cada 3 horas. (Signos inflamatorios, dolor al ser tocado).
- Mercurius solubilis 30c, 3 veces al día por 2 días. (Profusa salivación)(26).

RETENSION Y SUPRESION DE URINA

- Aconitum napellus una dosis y Cantharis (35), 6 gotas cada una por 2 o 3 horas (40).
- Hyoscyamus niger (35), 4 gotas cada hora. (Absoluta retención)(40).
- Lycopodium (35), 4 gotas cada hora. (Poca cantidad de orina y frecuente distensión abdominal)(40).
- Cannabis sativa (35), 4 gotas o 6 glóbulos cada 3 horas. Orina poca cantidad, hematuria y dolor a la micción)(40)
- Petroselinum
- Arnica montana
- Capsicum
- Colchicum autumnale
- Nux vomica
- Anemone pulsatilla
- Aconitum napellus y Cantharides, una dosis de Aconitum y después de 15 o 20 minutos dar el otro medicamento (35).

RETENCION DE PLACENTA

- Sabina 6c, 4 dosis cada hora.
- Pulsetilla 30c, 3 dosis cada 3 horas.
- Secale cornutum 30c, 3 dosis cada 2 horas
- Pyrogenium 1M, 3 dosis cada 3 horas (26)

REUMATISMO

- Acidum nitricum (35)
- Prunella alba 6 gotas o glóbulos, 2 veces al día (40).
Prunella alba 4a. dinamización, 6 u 8 gotas (35).
- Nux vomica (35), 6 o 10 gotas en la mañana y noche.
(Si existe rigidez en el lomo)(40).
- Rhus toxicodendron 10 gotas o 12 glóbulos en la mañana y noche. (Cuando empeora en estado de reposo, articulaciónes hinchadas y flácidos tendones y músculos) (40).
- Aconitum napellus (35), 4 gotas cada 2 horas hasta que fiebre disminuya. (Signos febriles, piel seca y animal sediento)(40).
- Sulphur acid
- Corium o Rhus toxicodendron después de Aconitum napellus
(Si hay fiebre, cascos calientes y dolorosos)(35).

RINITIS ATROPICA

- Mercurius vivus, Aureum y Mezerium
- Acidum phosphoricum y Arsenicum (Erosión en membrana)
- Squilla (inflamación rústulos de nituitaria)
- Secale cornutum (si tiene tinte azulado)(35).

RINOPNEUMONITIS VIRAL EQUINA

- Aconitum napellus 6c, una dosis por hora para 4 dosis. (Estados virémicos iniciales).
- Kali hydriodicum 200c, 3 veces al día por 3 días. (Conjuntivitis, tos y edema pulmonar).
- Antimonium tartaricum 30c, día y noche por 3 días. (Neumonía intersticial, tos y estertores).
- Arsenicum album 200c, 4 dosis cada 2 horas. (Animales - excitados, sed, diarrea fétida, rinitis y neumonía).
- Phytolacca 200c, 3 veces al día por 4 días. (Casos que muestren linfadenitis).
- Caulophyllum 30c, una vez al mes en la gestación y 2 dosis durante el último mes. Este remedio regula la gestación y previene el aborto.
- Viburnum opulus 6c, una vez por semana en los primeros 3 meses de gestación. Otro remedio útil para controlar el aborto. Nota: Un nosode puede ser hecho de material infectado y emplearlo como vacuna oral y también terapéuticamente (26).

RUPTURA DE MUSCULOS

- Arnica montana 30c, 2 dosis cada 2 horas.
- Ruta graveolens 30c, 3 veces al día por 3 días. (Ruptura de tendón en su inserción)(26).

SALMONELOSIS

- Salmonella typhimurium nosode 30c, 3 veces al día por 3 días al principio del tratamiento.
- Mercurius solubilis 200c, 3 veces al día por 2 días. (Heces escasas y disentéricas, empeora durante la noche).
- Baptisia 30c, 3 veces al día por 3 días. (Heces delga-

- das, oscuras, teñidas de sangre, abdomen doloroso).
- Camphor 30c, 4 dosis cada 2 horas. (Colapso, superficie corporal fría, heces acuosas y oscuras).
 - Veratrum album 6c, 3 veces al día por 3 días. (Diarrea acuosa, dolor y postración).
 - Arnica montana 30c, 3 veces al día por 2 días. (Congestión venosa acompañada de heces putridas y teñidas de sangre).
 - Arsenicum album , 3 veces al día por 3 días. (Excitación sed, empeora en la noche)(26).

SARNA

- Sulphur acid (35), 6 gotas diarias por 2 o 3 semanas (40)
- Arsenicum 6 gotas día y noche. (Pérdida de pelo, piel -flácida, úlceras con borde rojo)(40). Úlceras con bordes duros (35).
- Sepia, 6 gotas día y noche. (Parte afectada sensible, -ampollas)(40).
- Rhus toxicodendron 6 gotas, 3 veces al día. Elevaciones duras o costras (40). Rhus toxicodendron en sarna húmeda (35).
- Tintura de Sulphuris, Scabiesinum equorum, para sarna -húmeda.
- Delphinium staphysagria y Sulphur acid, si no hay costras ni botones.
- Sepia y Sulphur acid en sarna seca.
- Anthracinum cuando esta acompañada de muermo.
- Carbo vegetalis, si hay tos.
- Clematis, exantema forma varios grupos.
- Tintura acris (costras en forma de botones puntiagudos).

- Vinca, sarna en crines.
- Zincum (Cuando lesiones se encuentran en la grupa).
- Jacea en casos graves (35).

SATIRIASIS

- Platina y Gantharides (35).

SEBORRHA

- Arsenicum album, una vez al día por una semana. (Usarlo en estados tempranos, antes de que la secreción sea profusa).
- Graphites 6c, 3 veces al día por 5 días. (Secreción pegajosa y de color miel, la piel generalmente esta áspera y seca, lesiones eczematosas aparecen en las fisuras de la piel y en el dobles de las articulaciones).
- Antimonium crudum 30c, día y noche por una semana. (Las vesículas aparecen acompañando un engrosamiento de la piel).
- Thuja occidentalis 200c, una vez al día por 10 días. Prin cipal remedio en el tratamiento de seborrea.
- La aplicación externa de loción de Arsenicum album es - muy útil. Otra aplicación tal como Sulphur acid y loción Thuja occidentalis pueden usarse (26).

SENOS Y FISTULA

- Hepar sulphuris 200c, 4 dosis cada 2 horas.
- Mercurius solubilis 30c, 3 veces al día por 3 días. (Se nos con pus verdosa y teñida con sangre, el tejido circundante muestra pequeñas vesículas).
- Kali bichromicum 30c, 3 veces al día por 4 días. (Pus - dura y amarilla se exprime con dificultad).

- Silicea 200c, una vez al día por 7 días. (Pus aguada y gris, formación de tejido fibroso. Usarlo al comienzo de la enfermedad, día y noche por 4 días.
- Calcarea fluorica 30c, día y noche por 7 días. (Senos abiertos rodeados por elevaciones duras con hinchazón de la piel).
- Externamente el seno puede ser irrigado con una solución de Calendula officinalis e Hypericum (26).

SESAMOIDITIS

- Arnica montana 30c, dos dosis durante cada 3 horas. - (Darlo tan pronto como sea posible después de que ocurrió la lesión).
- Ruta graveolens 200c, 2 veces al día por 4 días. (Esto acelera la resolución de periostitis y ayuda a prevenir la formación de nuevo hueso).
- Calcarea fluorica 30c, una vez a la semana por 4 semanas. (Casos de negligencia donde la exostosis ya ocurrió).
- Silicea 30c, una vez al día por 10 días.
- Externamente la aplicación de Ruta graveolens y Arnica montana (lociones), ayuda a remover el tejido fibroso en casos crónicos (26).

SHICELOSIS DE LOS POTROS

- Aconitum napellus 6c, 4 dosis cada hora. (Dar en estadios tempranos febriles).
- Arsenicum album IM, 3 veces al día por 2 días. (Síntomas entéricos. Diarrea acre y olor putrido, excitación y sed).
- Rhus toxicodendron IM, día y noche por 3 días. (Casos de artritis que mejoran con el movimiento. Articulacio

nes calientes y rígidas).

- Nota: Un nosode puede ser preparado con el organismo causal Shigella equirulis, la cual puede ser cultivada de las deyecciones de potros infectados. Este nosode puede ser útil complemento a otros remedios indicados (26).

SHOCK (CHOQUE)

- Arnica montana 30c, 2 dosis son suficientes con una separación de 2 horas. Puede darse en todos los casos.
- Bellis perennis 200c, 3 dosis cada 3 horas. Es usado para combatir shock después de una intervención quirúrgica.
- Carbo vegetabilis 6c, 4 dosis cada 2 horas. Indicado en casos de colapso y amenaza de coma. Cuerpo frío.
- Veratrum album 200c, 4 dosis cada hora. Util en choque quirúrgico y se indica cuando el colapso esta asociado con transpiración fría (26).

SINCOPE, DESFALLECIMIENTO, DESMAYO

- China una dosis, cuando es causado por fuertes hemorragias.
- Anemone pulsatilla, por gran trabajo.
- Sepia (35).

SINUSITIS

- Hepar sulphuris 200c, día y noche por una semana. (Sensible al tocar y presionar el área afectada).
- Hydrastis 30c, 3 veces al día por 6 días. (Pus blanda, escurrimiento de ollares).
- Mercurius corrosivus 200c, día y noche por 5 días. (Material purulento teñido de sangre y color verdoso).

- Kali bichromicum 200c, día y noche por 5 días. (Casos crónicos, descargas fibrosas duras).
- Silicea 200c, día y noche por 5 días. (Casos crónicos, fluido y pus asociada con afecciones del maxilar y hueso nasal).
- Arsenicum album 1M, una vez al día por 5 días. (Excoriación en ollares, inquietud, empeora después de la medianoche)(26).

SOBRRHUESO EN LA REGION DEL CASCO

- Arnica montana 30c, 2 dosis con 3 horas de separación. (Darlo tan pronto como sea posible después de la lesión)
- Ruta graveolens 200c, día y noche por 4 días. (Ayuda al control de periostitis).
- Calcarea fluorica 30c, una vez a la semana por 4 semanas. (Tendencia a desarrollar exostosis).
- Silicea 30c, una vez al día por 2 semanas. (Fibrosis presente).
- Externamente un ungüento de Ruta graveolens y Arnica montana ayuda en estados tempranos de la enfermedad (26).

SOBRRHUESO EN LA REGION DE LOS METACARPANOS (2o y 3er.)

- Arnica montana 30c, 2 dosis con una separación de 12 horas. (Darlo lo más pronto posible cuando la lesión tuvo lugar).
- Ruta graveolens 6c, 3 veces al día por 3 días. (Ayuda al control de periostitis y previene exostosis).
- Silicea 200c, una vez al día por 10 días. (Se desarrolla exostosis por descuido).
- Calcarea fluorica 30c, una vez al día por 10 días.
- Externamente la aplicación de ungüento de Ruta y Arnica (26).

SUPURACION

- Arnica montana interna y externamente.
- Mercurius vivus y Ferula asafoetida, (Ulceras que segre- gan pus fetida).
- Arsenicum album (Bordes duros, dolor e inflamación).
- Silicea, (pus espesa y fétida).
- Acidum phosphircum (piel con adherencias)(35).

TAQUICARDIA

- Crataegus 6c, 4 veces al día por una semana. (Usarlo en la forma paroxismal para ayudar a restablecer la fuerza de los músculos del corazón).
- Lycopus 6c, 3 veces al día por 4 o 5 días. (Indicado - cuando hay palpitación de excitación nerviosa, pulso dé- bil y trémulo, puede haber hemorragias pasivas).
- Convallaria 6c, 3 veces al día por 5 días. (Indicado en estasis venosa y disnea, leves esfuerzos producen pal- pitación, pulso irregular y rápido).
- Strophanthus 6c, 3 veces al día por 3 días. (Pulso irre- gular y rápido asociado con miocarditis, el animal pue- de mostrar signos de dolor al moverse).
- Aconitum napellus 6c, 3 veces al día por 4 días. (Dolor en la región del hombro izquierdo, pulso pleno y tenso, expresión de ansiedad).
- Iberis 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Palpitaciones acompa- ñadas por signos de sofocamiento y pulso irregular e intermitente, la palpitación se induce fácilmente).
- Lilium tigrinum 30c, 4 dosis cada 2 horas. (Palpitación y pulso rápido, asociado con micciones frecuentes, la orina es blanquecina y caliente, deseo para defecar y - las heces pueden contener sangre y moco).

- Naja 6c, 4 dosis cada 3 horas. (Pulso irregular de poca tensión asociado con letargo y amenaza de parálisis. (La palpitación es común).
- Phosphorus 30c, 3 veces al día por 4 días. (Cuando hay palpitaciones violentas, pulso suave y débil, signos hepáticos son predominantes al apoyarse en la región hepática, heces de color de arcilla y hay hemorragias color púrpura en membranas mucosas y piel).
- Thyroidinum 6c, 3 veces al día por 5 días. (Cuando hay debilidad, pulso fino y palpitaciones. El animal rara vez se echa debido a la sensibilidad del área pulmonar, dolor al movimiento y hay tendencia a exoftalmos)(26).

TENDINITIS - TENDOSINOVITIS

- Arnica montana 30c, 2 dosis durante 12 horas. (Darlo tan pronto como sea posible).
- Ruta graveolens 30c, 4 dosis durante cada 3 horas. (Casos severos, con hemorragia y amenaza de periostitis).
- Rhus toxicodendron 1M, día y noche por 4 días. (Inflamación del tendón, dolor al movimiento).
- Apis mellifica 6c, 5 dosis durante cada 2 horas. (Inflamación edematosa especialmente sobre el área del me nudillo).
- Silicea 200c, una vez al día por 10 días. (Casos crónicos. Este remedio ayuda a la reabsorción). Externamente la aplicación de Arnica o Rhus (ungüentos) será benéfico (26).
- Ginkgo biloba D2 (D3), tendinitis y bursitis.
- Rhus toxicodendron D4 (tendinitis)
- Symphytum D3 (D12) y Hekla lava D4, además de Viscum album D4 (Tendinitis, bursitis y osteoporosis)(56).

TETANOS

- El animal debe encontrarse en lugares cerrados y oscuros.
- Accuratum nebellus 6c, 4 dosis por hora. (Estado inicial febril)(26).
- Atrone belladone (35), 1M, 4 dosis cada 2 horas. (Gran excitación, pupilas dilatadas, pulso lleno, piel seca y caliente)(26).
- Nux vomica 1M, 4 dosis cada 4 horas. (Rigidez de miembros y constipación)(26). Dosis repetidas varias veces al día, después cada 2 o 3 días (35).
- Ledum 6c, 3 dosis cada 2 horas. (Cuando la enfermedad se origina por heridas profundas y esta no es idiopática).
- Hypericum 1M, 3 dosis cada 2 horas. (Daño en terminales nerviosas previene la infección ascendente de la vía nerviosa, puede combinarse con Ledum).
- Strychninum 200c, 3 veces al día por 1 semana. (Cuando la rigidez muscular y espasmos aparecen, útil en procesos temerarios).
- Arnica montana 30c, 2 dosis, 1 cada 4 horas. (Cuando la fuente de la enfermedad no solamente es debido a un golpe o herida, pero esta acompañado de choque al principio de la enfermedad).
- Tetanos nosode 30c, 1 vez al día por 5 días. (Darlo al comienzo de la enfermedad)(26).
- Arsenicum album
- Iracacuhne (si no ha recobrado el apetito)
- Mercurius vivus y Veratrum album (35).

TIFUS

- Arsenicum album, dosis repetidas cada 10 o 15 minutos (35).

TIMPANISMO

- China
- Rhus toxicodendron (35).

TIMPANITIS DE LAS BOLSAS GUTURALES

- Calcarea ca bonica 200c, una vez al día por una semana. (Descarga otica que causa erupción alrededor de la oreja).
- Kali muriaticum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Glándulas asociadas hinchadas, puede haber descarga catarral de oído y nariz).
- Mercurius dulcis 30c, 3 veces al día por 4 días. (Para tratar obstrucción de tubo de Eustaquio, si esta asociado con descarga del oído medio).
- Anemone pulsatilla 30c, día y noche por 4 días. (Oído llega a inflamarse, descargando un moco catarral suave) (26).

TORCEDURA O ESGUINCE DEL LIGAMENTO SUSPENSORIO

- Arnica montana 30c, 2 dosis separadas de 12 horas. (Dar lo inmediatamente después que ocurrió la torcedura).
- Rhus toxicodendron 1M, 3 veces al día por 2 días. (Este remedio ayudará a reducir la inflamación y a la acción de extensión del tendón y ligamento).
- Ruta graveolens 200c, 2 veces al día por 4 días. (Periostitis en la región de huesos sesamoideos).
- Silicea 30c, una vez al día por 10 días. (Torceduras crónicas, ayuda a la reabsorción de tejido fibroso).

- Externamente la aplicación de Rhus, Ruta y Arnica unguentos (26).

TORCEDURAS, DAÑOS EN LOS MUSCULOS Y HUESOS

- Rhus toxicodendron, interna y externamente. La tintura diluida 20 veces para ser frotada suavemente en la parte afectada, 2 veces al día. El reposo es esencial.
- Symphytum interna y externamente de la misma manera que el anterior, si el hueso esta afectado. Internamente 6 gotas en poca agua, dos veces al día (40).

TOS

- Bryonia alba 6c, 3 veces al día por 3 días. (Tos seca con dolor al toser, empeora al movimiento, mejora al presionar el área afectada)(26). Bryonia 6 gotas en la mañana y en la noche. (Si la tos es debido a un estado semanal severo)(40).
- Arsenicum iodatum 6c, 3 veces al día por 3 días. (Tos persiste después de la infección del torax, tal como en influenza o bronquitis)(26).
- Atropa belladonna 30c, 4 dosis cada 2 horas. (Tos acompañada de pulso total, piel caliente, pupilas dilatadas y signos nerviosos)(26).
- Drosera y Atropa belladonna (crónico)(35).
- Drosera 6c, 3 veces al día por 3 días. (Tos espasmódica crónica a veces asociada con signos asmáticos. Empeora en la mañana)(26). Drosera 6 gotas día y noche (40).
- Nux vomica 6c, 3 veces al día por 3 días (26). 4 a 6 gotas, 3 o 4 veces al día (40). Origen digestivo (26).
- Gausticum 30c, día y noche por 4 días. (tos se alivia

al beber, expectoraciones escasas).

- Arsenicum album IM, día y noche por 5 días. (Tos empeora después de la medianoche, animal inquieto y sediento con piel seca, la tos se produce después de beber).
- Spongia tosta 30c, día y noche por 3 días. (tos empeora a la inspiración y pasando la medianoche, alivio después de beber. A veces esta asociado con enfermedades cardiacas).
- Sticta 6c, 3 veces al día por 3 días. (Tos originada en la tráquea empeora en la tarde y durante la noche y en la inspiración).
- Stannum 30c, 3 veces al día por 3 días. (Tos acompañada de influenza, empeora en la última parte del día. Expectoración expulsada a la fuerza)(26).
- Solanum dulcamara 4 o 6 gotas, 3 o 4 veces al día. (Descarga nasal debido a humedad)(35,40).
- Squilla y Bryonia alba alternadas. (Si se corta la respiración a causa de accesos)(35).
- Squilla 4 gotas o 6 glóbulos dos o tres veces al día. (Sonidos nasales antes de toser y todo el cuerpo se estremece al toser)(40).
- Ammonium muriaticum (35), 4 gotas cada 3 horas. (Si el caballo parece estar sofocado o a punto de vomitar, -- pérdida de peso, piel pegada a las costillas)(40).
- Hyoscyamus niger y Chamomilla (Tos seca y diarrea).
- Sulphur acid, Spiritus sulphuratus (35).
- Anemone pulsatilla, 4 gotas o 6 glóbulos cada 3 horas. (Si el animal es tímido, asustadizo o si al toser hay descarga nasal).
- Lycopodium clavatum, 6 gotas tres veces al día. (Si la tos es excitada o empeora al beber y trayendo un ataque

de tos). Poner atención a la dieta, dar comida en considerable cantidad y humedecida con agua fría (40).

TROMBOS

- Aconitum napellus 4 gotas cada hora hasta que recupere, después repetirlo en intervalos largos hasta que el caballo este curado.
- Atropa belladonna, 4 gotas cada hora, después darlo en intervalos largos hasta que sane. (Si el animal gira rápidamente en círculos, descansa y continua otra vez hasta esforzarse y finge caer).
- Arnica montana, 6 gotas cada 1, 2 o 3 horas de acuerdo a la severidad del caso. (Si es debido a un daño mecánico).
- Opium 6 gotas cada 1, 2 o 3 horas. (Si el animal queda en estado como si estuviese muerto). La medicina debe ser dada 2 o 3 veces al día por semanas después de un ataque y para prevenir su recurrencia. Terminar con una dosis o 2 de Sulphur de la misma manera como los otros remedios solamente en intervalos largos (40).

TROMBOSIS ILIACA

- Bothrops 30c, 3 dosis cada 3 horas. (Condición acompañada por temblores nerviosos con posible hemorragia intestinal).
- Lachesis 30c, 4 dosis cada 2 horas. (Tenesmo con dolor sobre la región sacra).
- Calcarea fluorica 30c, una vez a la semana por 4 semanas. (Este remedio ayuda a la disolución de el trombo y resolución de aneurisma).
- Vipera 6c, 3 veces al día por 4 días (26).

TROMBOSIS VENOSA

- Vipera 30c, 3 veces al día por 3 días. (Ictericia e inflamación del hígado).
- Hamamelis 200c, día y noche por 4 días. (Asociado con salida de sangre en proyectil, involucrados los ojos. Epistaxis y venas de la garganta están pletóricas)(26).

TUMOR BLANCO EN CODOS

- Fomento de agua de Arnica montana (30 gotas de tintura en 100 grs de agua).
- Chamomilla
- Ledum y Conium (duro)
- Sulphur acid, Antimonium crudum, Petroleum y Sepia (crónico).
- Iodum, Rhus toxicodendron y Anemone pulsatilla (dolor y cojea).
- Sulphur acid, administrarlo como tratamiento consecutivo a los anteriores (35).

TUMORES

- Arnica montana y Mercurius vivus y terminar con Silicea.
- Bryonia alba (tumores inflamatorios).
- Arsenicum, Acidum sulphuricum, Aurum, Sulphur acid. (Tumores en la cabeza).
- Arnica montana, Acidum sulphuricum y Symphytum officinale. (Tumores por lesión externa).
- Bryonia alba (Tumores calientes).
- Atropa belladonna (Frios y crepitantes).
- Ledum (cuando son pequeños y numerosos)(35).

ULCERAS

- Lavar con agua arnicada (35).
- Mercurius solubilis 30c, 3 veces al día por 4 días.
(Puede estar rodeada por pequeños granos, las úlceras producen pus verdosa teñida de sangre)(26).
- Aconitum napellus (inflamación)(35).
- Calcarea sulphurica 6c, 3 veces al día por 4 días.
(Úlceras con costras amarillentas, pus cremosa).
- Anthracinum 30c, una diariamente por 4 días. (Ardor - severo alrededor de la úlcera, piel dura y oscura, - descarga de material)(26).
- Urtica urens externamente para aliviar úlceras y llagas (35).
- Echinacea angustifolia 3x, 3 veces al día por 3 días.
(Asociado con glándulas linfáticas).
- Fluoric acid 6c, 3 veces al día por 4 días. (Úlceras - con orilla roja y rodeada por vesículas, prurito es común).
- Lachesis 30c, cada 3 horas para 4 dosis. (Úlceras asociadas con coloración púrpura de la piel).
- Nitric acid 200c, una vez al día por una semana. (Úlceras superficiales, sensibles y tienen infinidad de bordes).
- Hepar sulphuris 200c, cada 2 horas 4 dosis. (Excesivamente sensible, hinchazón y en casos agudos puede contener sangre, prurito).
- Silicea 200c, una vez al día por 7 días. (Úlceras crónicas teniendo tendencia para formar fístulas).
- Externamente loción Calendula (26).
- Chamomilla (miembros afectados).
- Sepia (miembros afectados)
- Arsenicum album (miembros se encuentran las úlceras)(35)

UROLITIASIS

- Thelapsi bursa 30c, día y noche por una semana. (Debido a cistitis crónica. Orina con sangre y sedimentación color ladrillo).
- Lycopodium clavatum 200c, día y noche por 7 días. (Signos hepáticos, hematuria, estados tempranos de formación de cálculos).
- Berberis vulgaris, día y noche por 5 días. (Asociado con disfunción hepática, lomo sensible y depósitos de ácido urico en orina al igual que moco).
- Sarsaparilla 6c, 3 veces al día por 3 días. (Dolor se presenta al final de la micción. La orina contiene depósitos arenosos).
- Coccus cacti 6c, 3 veces al día por 5 días. (Orina oscura con sangre y uratos. Cálculos pequeños).
- Solidago 6c, 3 veces al día por 4 días. (Orina tiene sedimento, es clara y de olor ofensivo).
- Ocinum ganum 30c, día y noche por 5 días (Diátesis de ácido urico, pueden aparecer en la orina grandes cristales de ácido urico, el cual tiene un característico olor fuerte)(26).

URTICARIA

- Antimonium crudum 6c, 4 dosis en cada 3 horas. (Comezón y placas son pequeñas y numerosas).
- Apis mellifica 6c, 4 dosis cada 2 horas. (Placas calientes y tienden a contener fluido y son usualmente grandes) Abdomen afectado con tendencia a caso crónico dar 3 veces al día por 4 días.
- Antipyrine 6c, 4 dosis en cada 2 horas. (Edema angioneurótico el cual aparece de repente).

- Fragaria 6c, 4 dosis en cada 3 horas. (Acompañando inflamación erisipelosa con una hinchazón del cuerpo).
- Astacus fluvi. 30c, 3 veces al día por 3 días. (Ictericia, ganglios linfáticos cervicales afectados).
- Natrum muriaticum 200c, una vez al día por 10 días. (Alopecia, orina pálida y pasa en grandes cantidades).
- Urtica urens 6c, 3 veces al día por 3 días. (Placas calientes, comezón con tendencia a edema, la orina contiene usualmente depósitos de ácido úrico.) (26).

VAGINITIS

- Aconitum napellus 6c, 3 dosis cada 3 horas. (Signos febriles acompañados de fase aguda).
- Hydrastis 30c, 3 veces al día por 2 días. (Descarga catarral blanda, catarro de las mucosas).
- Cantharis 200c, una dosis cada dos horas por 4 días. (Síntomas urinarios severos, goteo de orina con sangre, yeguas violentas y cocean la parte baja del abdomen).
- Mercurius solubilis 30c, 3 veces al día por 3 días. (Descarga purulenta secundaria, deposiciones con sangre y salivación).
- Anemone pulsatilla 30c, 3 veces al día por 3 días. (Descarga cremosa y blanca. Signos de cólico).
- Nitric acid 200c, día y noche por 4 días. (Ulceración de la vagina posterior, descarga acuosa y café, úlceras en boca y diarrea).
- Arsenicum album 200c, 3 veces al día por 3 días. (Descarga acre e irritante, piel de alrededor de vulva excoriada, yeguas sedientas e inquietas, empeora a medianoche) (26).

VARICES

- Rhus toxicodendron seguido por
- Ledum, Phosphorus y Acidum phosphoricum (35).

VERMES

- Digitalis e Ignatia amara, Datura stramonium (ascárides)
- China, Cina y Mercurius solubilis (Taenias).
- Nux vomica, China (larvas de oestres).
- Sulphur acid (35).

VERRUGAS

- Solanum dulcamara.
- Sulphur acid una sola dosis (35).
- Arsenicum (35), 6 gotas dos veces al día y aplicar externamente una solución con brocha de pelo de camello, dos veces al día. Si se presenta una pequeña úlcera alrededor de la verruga (40).
- Causticum (35) 6 gotas dos veces al día y aplicar una solución externamente. (Si son dolorosas, supuran o sangran) (35,40).
- Thuja occidentalis interna y externamente (35,40). 6 gotas de la 3a. dilución día y noche. Aplicar la tintura dos veces al día para remover la verruga (40). Si son verrugas gruesas, costrosas, húmedas y supurantes (35, 40).
- Calcarea carbonica, 6 gotas o 8 glóbulos todas las noches. Si son pequeñas y numerosas y aparecen en grupos en el labio (belfo) inferior (40).

VERTIGO

- Chamomilla (varias dosis).

- Sulphur acid
- Nux vomica (35).

VIRUELA EQUINA

- Thuja occidentalis 200c, una vez al día por una semana. (Promueve rápida recuperación de costras).
- Antimonium crudum 6c, día y noche por una semana. (Formación de costras acompañadas por una secreción color miel, prurito puede presentarse en la noche).
- Borax 6c, día y noche por 5 días. (Ulceras en el paladar produciendo estomatitis).
- Nitric acid 200c, día y noche por 5 días. (Ulceración en el paladar blando, diarrea y ulceración de genitales externos)(26).

TRATAMIENTO DE BOVINOS CON HOMEOPATIA

ABORTO

- Arnica montana (si es producido por golpe o algo exterior)
- Secale cornutum (para la expulsión de placenta)(35).
- Anemone pulsatilla, 10 gotas cada media hora.
- Sabina o Secale cornutum 10 gotas cada media hora (si el esfuerzo continua).
- Arnica montana 10 gotas 2 veces al día por varios días (debido a trauma o lesión en el periodo de gestación)
- Secale cornutum 10 gotas, 3 veces el día (si signos de aborto son ocasionales)(40).

ABSCESOS

- Arnica montana interna y externamente.
- Bryonia alba (debido a enfriamiento y si la inflamación no es muy considerable. Si lo es dar Aconitum napellus).
- Anemone pulsatilla
- Rhus toxicodendron y Mercurius vivus (si presenta dolor dar 1 dosis. Darlos después de Aconitum napellus y Bryonia alba).
- Hepar sulphuris, 1 dosis (si no se presenta mejoría pasadas 6 horas).
- Atropa belladonna, Baryta carbonica y Sulphur acid (si el absceso se localiza en la cabeza)
- Conium (si el absceso es producido por compresión)
- Chamomilla (si son glándulas infectadas)
- Arsenicum album (si abscesos supuran)

- Anemone pulsatilla (si son úlceras fistulosas)(35).

ACETONEMIA

- Flor de piedra D3, 10 ml subcutáneos (53).

AFECCIÓN RENAL TOXICA.

- Berberis vulgaris
- Nux vomica (15).

APTAS

- Acidum muriaticum
- Borax
- Acidum fosforicum (35).

AMILOIDOSIS

- Equisetum (15).

ANASARCA

- Lycopodium clavatum
- Anemone pulsatilla (si hay diarrea)
- Solanum dulcamara (si es por enfriamiento)
- Bryonia alba (si existe estreñimiento v la respiración está alterada)(35).

ANOREXIA

- Antimonium crudum
- Nux vomica (si presenta estreñimiento).
- Arsenicum album (si presenta diarrea)(35).

ASCITIS

- Solanum dulcamara

- Helleborus niger
- Arsenicum album
- China (35).

ARRITMIA ENTRE SISTOLE Y DIASTOLE

- Arnica montana (también para curar heridas).
- Cactus
- Convallaria
- Crataegus
- Digitalis purpurea (bradicardia)
- Gelsemium sempervirens
- Glonoinum
- Kali carbonicum
- Spigelia
- Arsenicum album
- Carbo vegetabilis (en colapso sanguíneo)(12).

BULIMIA

- Anemone pulsatilla
- Nux vomica
- Sepia
- Cina (si es producida por vermes)(35).

CATARRO

- Aconitum napellus, 6 o 10 gotas, 3 veces al día (si presenta fiebre y pérdida del apetito).
- Bryonia alba, 6 o 10 gotas, 3 veces al día (si hay dificultad al respirar y rigidez de los miembros).
- Nux vomica, 6 o 10 gotas, 3 veces al día (si presenta rigidez de miembros y constipación).
- Arsenicum album, 6 o 10 gotas, 2 veces al día (si los

ojos estan rojos y llorosos, acompañado con diarrea)

- Solanum dulcamara, 6 o 10 gotas, 3 veces al día (si la enfermedad se presentó por exposición a la humedad)(40).

CETOSIS

- Glucose-Fructose en infusiones
- Laseptel con
- Flor de piedra D3 (estimula hígado y riñón)
- No dar corticoesteroides (16).

CISTITIS

- Aconitum napellus 1 par de dosis seguidas de
- Gantherides
- Arnica montana (si fue producida por golpe)(35)

COLICO

- Aconitum napellus 6 gotas cada media hora, 1 o 2 horas
- Arsenicum album, 10 gotas cada 1 o 2 horas (si el ataque ha sido producido por alimentos verdes o agua fría, puede darse después de Aconitum napellus)
- Nux vomica, 6 gotas cada 1/2, 1 o 2 horas (debido a indigestión o después de una constipación)(40).

COLICO RENAL-VESICAL

- Aconitum napellus
- Berberis vulgaris
- Colocynthis
- Veratrum album (15)

COLERA HEPATICO

- Arnica montana (intravenosa)
- Crataegus o Strophantus
- Veratrum album (14).

DEBILIDAD POR LACTACION

- China miniplex
- Lachesis D30 o D200 (14).

DEGENERACION OSEA Y CARTILAGINOSA POSOPERATORIAS (Amputación de pezuña)

- Arnica montana externamente como pomada e internamente 10 ml de la dilución D30, junto con el siguiente medicamento.
- Lachesis D8, 10 ml subcutáneos, además dar
- Symphytum D2 y Arnica montana D4, 2 veces al día, 15 gotas por 2 semanas.
También se puede dar el siguiente tratamiento:
- Lachesis D8 10 ml y
- Tarantula cubensis D5, 10 ml subcutáneos y dar de la dilución D6, 20 gotas, 2 veces al día (actúa en contra de abscesos y exudados).
- Calendula officinalis externamente (fomenta la granulación).
- Silicea D12, 1 o 2 veces al día, 15 a 20 gotas por 2 o 3 semanas (para endurecer los tejidos).
- Pyrogenium D15, 10 ml subcutáneos (Fiebre)(38).

DIARREA

- Aconitum napellus 2 dosis con intervalos de 15 minutos (diarrea aguda) y continuar con el siguiente me-

- Arsenicum album, 2 dosis con intervalos de 15 minutos y posteriormente dar:
- Ipecacuahna
- Rheum (si no hay dolor)
- Arsenicum album y sulphur acid (diarrea en becerros)
- Solanum dulcamara, Petroleum, Phosphorus, Veratrum album, Bryonia alba y Acidum phosphoricum (diarrea crónica)(35).
- Arsenicum album, 10 gotas cada 4 o 6 horas (evacuaciones líquidas con sangre y moco, pérdida del apetito).
- Bryonia alba 10 gotas o glóbulos, 2 veces al día (diarrea y constipación).
- China 10 gotas o glóbulos, 2 veces al día (evacuaciones con alimento no digerido, dolor durante la evacuación, pérdida de apetito).
- Ipecacuahna, 3 o 4 veces al día, 10 gotas o glóbulos. (Evacuaciones oscuras con moco y apariencia fermentada).
- Mercurius vivus, 3 o 4 veces al día, 10 gotas o glóbulos (evacuaciones amarillentas oscuras, olor fétido)
- Chamomilla, 3 o 4 veces al día, 10 gotas o glóbulos. (Dolor antes de la evacuación, heces color grisáceo con flemas).
- Sulphur acid, cada noche 10 gotas (puede darse en algún estadio de la enfermedad)(40).

DISENTERIA

- Si la diarrea es ligera, usar los medicamentos indicados para diarrea.
- Aconitum napellus y posteriormente Arsenicum album (si las deyecciones son líquidas y verdosas).

- Mercurius vivus (si se presenta en forma epidémica)
- Anemone pulsatilla (en becerros con diarrea verdosa).
- Chamomilla
- Mercurius vivus (si las deyecciones son blancas)(35).

DISMINUCION DE LECHE

- Atropa belladoná y Chamomilla alternados (si el pezón produce poca leche).
- Aconitum napellus (si existe inflamación).
- Solanum dulcamara y Bryonia alba (si es debido a enfriamiento)(35).

EDEMA EN TETAS

- Apis mellifica (14).

ENCEFALITIS

- Aconitum napellus, dosis frecuentes
- Atropa belladonna a dosis repetidas, después dar
- Sulphur acid.
- Hyoscyamus niger (si no es suficiente con Atropa belladonna).
- Opium (si es por insolación).
- Veratrum album (si el animal se apoya en la pared)(35).
- Aconitum napellus y Atropa belladonna, alternadas, 6 o 10 gotas cada 15 minutos (vasos de la cabeza y cuello con pulsaciones violentas).
- Camphor 10 gotas cada 15 o 20 minutos (animal aparece indiferente a los objetos que lo rodean).
- Hyoscyamus niger 10 gotas cada 15 o 30 minutos hasta su recuperación (animal escarva la tierra, cuelga la --

- Mercurius vivus (si se presenta en forma epidémica)
- Anemone pulsatilla (en becerros con diarrea verdosa).
- Chamomilla
- Mercurius vivus (si las deyecciones son blancas)(35).

DISMINUCION DE LECHE

- Atropa belladoná y Chamomilla alternados (si el pezón produce poca leche).
- Aconitum napellus (si existe inflamación).
- Solanum dulcamara y Bryonia alba (si es debido a enfriamiento)(35).

EDEMA EN TETAS

- Apis mellifica (14).

ENCEFALITIS

- Aconitum napellus, dosis frecuentes
- Atropa belladona a dosis repetidas, después dar
- Sulphur acid.
- Hyoscyamus niger (si no es suficiente con Atropa belladonna).
- Opium (si es por insolación).
- Veratrum album (si el animal se apoya en la pared)(35).
- Aconitum napellus y Atropa belladonna, alternadas, 6 o 10 gotas cada 15 minutos (vasos de la cabeza y cuello con pulsaciones violentas).
- Camphor 10 gotas cada 15 o 20 minutos (animal aparece in diferente a los objetos que lo rodean).
- Hyoscyamus niger 10 gotas cada 15 o 30 minutos hasta su recuperación (animal escarva la tierra, cuelga la --

cabeza, se balancea de un lado a otro).

- Arnica montana cada 15 o 30 minutos, 10 gotas hasta recuperación (si es el resultado de un traumatismo) (40).

ENDOCARDIO, MIOCARDIO Y PERICARDIO (DAÑOS EN..)

- Lachesis
- Phosphorus
- Strophantus (compensa el pulso del cuerpo)(12).

ENFERMEDAD HEPATICA (LESION RELACIONADA CON TRASTORNOS METABOLICOS)

- Chelidonium D4, 5 ml inyección subcutánea, 2 dosis únicamente con una diferencia entre cada dosis de 24 horas (7).

ENFERMEDADES ESTOMACALES E INTESTINALES

- Debido a indigestiones, anorexia, diarrea por parásitos, mala alimentación, enfermedades sistémicas.
- Calcium carbonicum, Calcium phosphoricum y Phosphorus como profilácticos.
- Vitavetsan inyectado 5 ml, con un vermífico oral y un preparado fosfórico, es recomendado por el autor.
- Carbo vegeabilis y China (en caso de animales muy debilitados debido a la diarrea).
- Arsenicum album (en caso de animal inmóvil).
- Ferrum phosphoricum (en caso de síntomas de anemia).
- Lachesis 5 a 10 ml (si hay inapetencia).
- Aloe socotrina, Arnica montana, Chamomilla, Cantharis, Capsicum, Ibucacuahna, Rhus toxicodendron, Arsenicum album, Carbo vegeabilis, Colocynthis, Nux vomica y -

Phosphorus (en casos de hemorragias intestinales)(13)

ENFERMEDADES DERMICAS

- Sulphur acid externamente D4, 100 gotas en 1.136 litros de agua y lavar las partes afectadas una vez al día, internamente 10 gotas, 1 vez al día por 1 semana o 10 días.
- Mercurius vivus externamente (preparado del mismo modo que el anterior)
- Arsenicum album, 6 gotas o 10 glóbulos, 1 vez al día (si la piel se encuentra reseca y dura)
- Thuya 6 u 8 gotas, 1 vez al día. Externamente, el autor sáca juro del arbusto verde y lo mezcla con agua y lo aplica en la parte afectada una vez al día. Cuando la planta no se obtiene, utilizar la tinctura en la proporción de 20 gotas en 1 onza (28.35 g) de agua (40).

ENFRIAMIENTO

- Aconitum napellus, Brvonia alba, Solanum dulcamara, - Nux vomica y Rhus toxicodendron (si una parte del cuerpo está afectada y no hay fiebre)
- Arsenicum album (producido por ingestión de bebida fría o alteración en la digestión)(35).

ENTERITIS

- Aconitum napellus una dosis cada 15 minutos hasta que los signos desaparezcan.
- Arsenicum album y Aconitum napellus alternados (si no existe mejoría)

- Carbo vegetabilis y Phus toxicaria (si fallan los anteriores)(35).

EPILEPSIA

- Aconitum napellus
- Datura stramonium
- Atropa belladonna (si el acceso se repite)
- Hyoscyamus niger, Cocculus y Calcarea carbonica (cuando hay movimientos bruscos de los muslos)
- Gambhora (para prevenir el acceso), algunas dosis por semana.
- Cina (si es por parásitos intestinales)(35).

ESFUERZO CARDIACO EXTREMO

- Arnica montana (12).

ESPASMO VESICAL

- Aconitum napellus y Cantharides
- Hyoscyamus niger (si hay retención de orina)(35).

ESPIRMITIS

- Aconitum napellus, dosis repetidas
- Arsenicum album
- Bryonia alba (si existen signos nerviosos)
- Bryonia alba y Aconitum napellus alternados
- Nux vomica y Aconitum napellus alternados (cuando la región esplenica esta dolorosa al tacto)
- Leurocerasus (pulso débil, aním. insensible, exento cuando se toca la parte afectada)(35).

ESTOMATITIS

- Arsenicum album, unas gotas en agua y lavar la boca (35)

ESTREÑIMIENTO

- Aconitum napellus 1 dosis
- Nux vomica (si deyecciones son duras)
- China (si el animal no tiene sed)
- China y Bryonia alba (si animal no tiene sed y es debido a enfriamiento).
- Opium y Argilla (no defeca)
- Plumbum (cuando son pequeñas cantidades y duras, el recto se encuentra vacío)(35).

EXANTEMAS (vesículas, manchas, escamas, costras)

- Sulphur acid por 15 días y después dar
- Autopsoricum, 15 días y después para terminar con
- Sepia y algunas dosis de Sulphur.
- Delphinium staphisagria y Solanum culcamara (si no da resultado las anteriores)(35).

FERTILIDAD (trastornos en las hembras de)

- Sulphur acid
- Lachesis
- Flor de piedra D3 (15).

FIEBRE (por inflamación)

- Aconitum napellus, dosis repetidas cada 5 o 15 minutos en casos agudos.
- Atropa bellaadonna (en encefalitis)
- Spongia marina (faringitis)
- Bryonia alba (Neumonía)

- Cantharides (cistitis y nefritis)(35).

PIEBRE PUEIPERAL

- Aconitum napellus, 10 gotas cada 1/2, 1 o 2 horas al comienzo de la enfermedad, cuando el animal este en reposo (pulso y respiración rápida)(35,40).
- Arnica montana (loción) lavar las partes 2 o 3 veces al día.(40).
- Pulsatilla y Nux vomica (35).
- Atropa belladonna 10 gotas cada 1/2, 1, 2 o 3 horas (ubre inflamada, caliente, dolorosa sacude la cabeza, ojos vidriosos y rojos, si hay retención de placenta) (40).
- Opium 10 gotas cada 1/2, 1 o 2 horas (pérdida del sentido, ojos medio cerrados, respiración fuerte y profunda)(40).
- Chamomilla (restablece secreción de leche)(35).
- Nux vomica 10 gotas en la mañana y en la noche (si el animal se recupera pero queda un poco débil)(desaparece la varélsis)(35,40).
- Rhus toxicodendron (35).
- Secale cornutum 10 gotas cada 1/2, 1 o 2 horas.
- Sulphur acid, una dosis una vez al día por varios días (si animal este recuperado)(40).

GASTRITIS

- Aconitum napellus 5 e 6 dosis en intervalos de una hora y media y continuar con
- Arsenicum album, 2 dosis y luego
- Cerbo vegetabilis, 2 dosis (35).

GLOSITIS

- Aconitum napellus
- Mercurius vivus
- Silicea, Conium y Carbo vegetabilis (si existe induración)(35).

GRIETAS, LLAGAS Y ULCERAS

- Arnica montana y Arsenicum album (externamente)
- Spiritus sulphuratus (grietas húmedas)
- Sepia (desprendimiento de piel)
- Symphitum (si existe lesión en hueso)
- China (para combatir la debilidad causada por pérdida de sangre)
- Arnica montana y Aconitum napellus (en heridas de gran extensión)(35).

HEMATURIA

- Cantharis (15).
- Ipecacuahna una sola dosis.
- Aconitum napellus (si existen signos de inflamación comenzar con él)
- Arnica montana (si es por causa externa)
- Uva ursi (si es por cálculo vesical)(35).

HEMOGLOBINURIA

- Lachesis (trastornos hormonales, infección tóxica, lesiones capilares)(15).
- Aconitum napellus o Hipecacuahna 1 o 2 dosis
- Cantharis 10 gotas 2 veces al día (esfuerzo al orinar y presenta color)
- Camphor 6 gotas cada 2 o 3 horas (enfermedad se pre--

sentada repentinamente, orina turbia y roja con dolor a la micción)

- Nux vomica, 10 gotas en la mañana y noche.
- Atropa belladonna, 10 gotas cada 3 o 4 horas (orina roja-amarillenta)
- Anemone pulsatilla, 10 gotas en la mañana y noche (orina a chorro y continúa por varios minutos, color obscuro con sedimentos)(40).

HEMOGLOBINURIA CRONICA

- Aconitum napellus, 6 gotas cada 3 horas (signos febriles)
- Bryonia alba, 10 gotas en la mañana y noche (al principio de la enfermedad, cuando escapan pequeñas cantidades de orina al moverse, diarrea).
- Cantharis, 10 gotas en la mañana y en la noche (Cuando presenta esfuerzo violento y dolor)
- Ipecacuana, 10 gotas 3 veces al día (emisiones frecuentes y escasas, turbias y rojizas, demasiado esfuerzo a la micción, diarrea)
- Nux vomica, seguido de Opium y Platina, 10 gotas cada noche (constipación si la enfermedad continúa por algún tiempo)(40).

HEPATITIS

- Aconitum napellus, 6 gotas 3 veces al día (fiebre)(35, 40).
- Nux vomica y Mercurius vivus alternados (35).
- Chamomilla, 10 gotas en la mañana y noche (ictericia predomina)(35,40).

- Lycopodium clavatum (si es crónico)(35)
- Bryonia alba, 10 gotas en la mañana y noche (respiración difícil, lengua amarilla o café, posición de recumbencia, constipación).
- Mercurius vivus, 10 gotas en la mañana y en la noche (si animal prefiere el lado izquierdo para recargarse, paroxismos de dolor, ictericia, sediento)
- Nux vomica, 10 gotas en la mañana y noche (si hay dolor en la parte baja del hígado al oprimir y presenta un color amarillento alrededor del ojo y boca)
- Sulphur acid, 10 gotas cada noche hasta signos desaparezcan. (Si los demás medicamentos no han logrado quitar ningún signo)(40).

HEMURIAS

- Acido sulfurico, lavar 2 veces al día con una solución de agua y el medicamento (35).

HINCHAZON DE LA GABEZA

- Aconitum napellus y Atropa belladonna, 10 gotas cada hora alternados, después dar
- Sulphur acid, 1 o 2 dosis (40).

HIPOCALCEMIA

- Calcium carbonicum o
- Calcium phosphoricum o
- Phosphorus con
- Flor de piedra D3
- Vitavetsan
- Arsenicum album
- Lachesis

- Anemone pulsatilla
- Sepia (14)

INDIGESTION

- Nux vomica (por enfriamiento)
- Solanum dulcamara (deyecciones duras y mezcladas con alimento no digerido)
- Antimonium crudum (en caso contrario)
- Anemone pulsatilla (deyecciones blandas y fétidas)
- Asarum (mucosidad rojiza)
- Chamomilla (diarrea)
- Rheum (diarrea con dolor)
- Arsenicum album (para recuperar el apetito y quitar la diarrea)(35).

INDIGESTION AGUDA

- Colonicum autumnale, D1, 10 gotas
- Nux vomica o Arsenicum album, 6 gotas de cualquier remedio cada 2 o 3 horas (40)

INDIGESTION SUBAGUDA

- Aconitum napellus y Nux vomica, 10 gotas, una o dos veces al día (si hay fiebre y fue producido por frío)
- Bryonia alba y Anemone pulsatilla, 10 gotas en la mañana y noche (vómito, arqueamiento, pérdida de apetito, abdomen distendido)
- Arsenicum album, 10 gotas en la mañana y noche (diarrea y pérdida de fuerza)(40).

INFARTO AL MIOCARDIO

- Aconitum napellus

- Cactus
- Crataegus (en efusiones)
- Strophantus (en infusiones)(12)

INFECCION DE URETERES

- Acidum nitricum
- Berberis vulgaris
- Cantharis
- Solidago
- Plumbum aceticum (15)

INFLAMACION DE LA CABEZA

- Aurum metallicum y Atropa belladonna
- Baryta carbonica (tumefacción es cura)
- Arnica montana interna y externamente (debiuo a presión del yugo)(35)

INFLAMACION EN ESPACIO INTERDIGITAL

- Arnica montana (loción) lavar la parte afectada
- Aconitum napellus (si hay dolor y calor) y Arnica montana internamente.
- Arsenicum album, Acidum phosphoricum y Squilla (úlceras)(35).

INFLAMACION DE LOS INTESTINOS

- Aconitum napellus y después Arsenicum album, 10 gotas cada 2 o 3 horas.
- Bryonia alba, 10 gotas cada 2, 3 o 4 horas (si el animal se observa los flancos)
- Nux vomica, 10 gotas o glóbulos, 2 veces al día (si abdomen aparece distendido)

- Carbo vegetabilis, 10 gotas cada 2 o 3 horas (si presenta evacuaciones fétidas y espasmos en músculos abdominales, debilidad)(40).

INFLAMACION DE PEZUNA

- Arnica montana externa e internamente
- Conium (reemplazo cuando la anterior no alcanza la curación completa)
- Arsenicum album y Acidum phosphoricum (cuando en la pezuña no es muy intensa la inflamación, pero en la planta si)
- Squilla (hay inflamación violenta y supuración)
- Conium, Antimonium crudum y Nux vomica (existe supuración).
- Finalmente Anemone pulsatilla y Mercurius vivus (35).

LARINGITIS

- Aconitum napellus y Atropa belladonna alternadas (35).

LECHE ACIDA

- Sulphur acid
- Phosphorus
- Antimonium tartaricum (35).

LECHE AMARGA

- Sulphur acid
- Phosphorus (35).

LECHE AZUL

- Nux vomica (si se produce después de una ingestión)
- Anemone pulsatilla (específico)(35).

LECHE ROJA

- Aconitum napellus (combate la dolencia)
- Phosphorus (combate la dolencia)
- Atropa belladonna (combate la dolencia)(35).
- Ipecacuahna, 10 gotas en la mañana y noche (si es crónico y una o más tetas sultan sangre)(35,40).
- Arnica montana 10 gotas, 2 veces al día (causada por alguna herida o golpe). Externamente loción de Arnica (40).

LECHE VISCOSA Y ACUOSA

- Sulphur acid
- Chamomilla
- Nux vomica (35).

LESIONES, TRAUMATISMOS

- Rhus toxicodendron, tintura diluida 20 veces para aplicarse en la parte afectada, 2 veces al día.
- Symphytum interna y externamente (si el hueso esta afectado), 2 veces al día 6 gotas en un poco de agua (40).

LESIONES EN MIEMBROS

- Arnica montana interna y externamente, 1 par de dosis y lavar la parte afectada (pies ninchados).
- Aconitum napellus, Squilla (si estan inflamados)
- Arsenicum album y Acidum phosphoricum cuando hay dolor
- Bryonia alba (si existe tumefacción)
- Atropa belladonna (especifico contra inflamación de la articulación de la cuartilla).
- Solanum dulcamara (si es por enriamiento)
- Squilla (si es en pezunas)

- Rhus toxicodendron y Arsenicum album (si no hay hinchazón)
- Thuja (cuando se extiende a la cuartilla la hinchazón)
- Bryonia alba (hinchazón)
- China (afectadas rodillas)
- Sulphur acid
- Lycopodium clavatum
- Silicea (35).

LIBIDO (TRASTORNOS)

- Acidum phosphoricum
- Phosphorus
- Damiana
- Selenium
- Calcium phosphoricum
- Nux vomica (15)

LUXACIONES

- Arnica montana interna y externamente (fomentos)
- Rhus toxicodendron (internamente)(35).

MAREO, VERTIGO

- Aconitum napellus
- Stramonium y Cocculus
- Arnica montana (cuando el animal parece atontado)
- China y Cocculus (cuando les causa fatiga el menor esfuerzo)(35).

MASTITIS

- Aconitum napellus y Atropa belladonna alternados, 3 veces al día hasta que mejore, 6 u 8 gotas (ubre dolorosa, caliente e inflamada)

- Aconitum napellus y Bryonia alba alternadas, 3 veces al día hasta que mejore, 6 u 8 gotas (si es originada por frío)
- Atropa belladonna, 3 veces al día, 6 u 8 gotas (uso después de cierto tiempo luego del parto)
- Chamomilla, 3 veces al día, 8 o 10 gotas (si no hay mucha inflamación, piel de la ubre flácida)(40)
También esta indicada si hay crepitación (35).
- Bryonia alba, 1 dosis deos veces al día (si hay induración en tetas)
- Arnica montana varias dosis (si es por causa externa)
- Mercurius vivus y Aconitum napellus (si inauración se presenta con inflamación glauular)
- Chamomilla, Conium y Gambora cada una, 2 dosis, para combatir nuosios.oes.
- Arsenicum album (si es inflamación gangrenosa)
- Aconitum napellus (si es por enfriamiento)(37).

MASTITIS PARENQUIMATOSA AGUDA

- Aconitum napellus D4 (inflamación aguda con fiebre alta)
- Atropa belladonna D4 (piel de teta enrojecida)
- Apis mellifica D4 (edema exudado seroso)
- Echinacea D5 (terapéutico antimicrobiano)
- Lachesis D8 (evita trombosis)
- Pyrogenium D15 (infección)
- Colibacillinum D20 (contra coliformes)
- Phytolacca D3 o D12 (oxitocina)

Cuando el estado de mastitis tiene pocas horas de haber empezado, con fiebre alta, taquicardia, escalofríos, extremidades frías, animal nervioso, dolor en las tetas (estado -

de Aconitum), se recomienda:

- Oxitocina 4 ml más
- Phytolacca D3, 10 ml y
- Aconitum napellus D4, 10 ml con
- Echinacea miniplex 10 ml intravenosa, además de
- Phytolacca D12, 2 veces al día por 5 días, 20 gotas por vía oral y se recomienda ordeñar varias veces al día.

Cuando la leche se presenta más acuosa (en estado de Bellaçona) se recomienda:

- Oxitocina 4 ml con el siguiente medicamento
- Phytolacca D3, 10 ml y
- Echinacea miniplex, 10 ml intravenosa, además de
- Phytolacca D12, 2 veces al día por 5 días, 20 gotas por vía oral y se recomienda ordeñar.

Si presenta edema en piel y el mareamiento de la teta también lo presenta, además no hay fiebre (estado de Apis) se recomienda:

- Oxitocina 4 ml, con los siguientes medicamentos
- Phytolacca D3, 10 ml
- Echinacea miniplex 10 ml intravenosa
- Apis mellifica D4, 10 ml subcutáneo
- Phytolacca D12, 2 veces al día por 5 días, 20 gotas por vía oral y se recomienda ordeñar.

Si presenta mastitis mareamiento tosa aguda, fiebre alta (estado de Colibacillinum) se recomienda:

- Oxitocina 4ml, con los siguientes medicamentos
- Phytolacca D3, 10 ml
- Echinacea miniplex, 10 ml intravenosa
- Apis mellifica D4, 10 ml subcutáneo
- Colibacillinum D20. 10 ml intravenosa y
- Phytolacca D12, 2 veces al día por 5 días, 20 gotas

por vía oral y se recomienda el ordeño (29).

METRITIS

- Aconitum napellus, algunas dosis y después continuar con el siguiente medicamento.
- Arnica montana 1 dosis cada 2 horas.
- Sabina, dosis frecuentes (si todavía existe inflamación de vagina)(35).

NEFRITIS

- Aconitum napellus, después administrar:
- Cantharides 1 o 2 dosis.
- Nux vomica (si hay estreñimiento).
- Arnica montana (si es causa externa)(35).

NEFRITIS AGUDA

- Aconitum napellus
- Apis mellifica
- Atropa belladonna
- Mercurius vivus
- Phosphorus
- Serum anouillae
- Solidago (15).

NEFRITIS CRONICA

- Arsenicum album
- Berberis vulgaris
- Lyconodium clavatum
- Phosphorus
- Squilla
- Solidago (15).

NEFROESCLEROSIS

- Phosphorus
- Serum anquillae (15).

NEFROPATIAS

- Apis mellifica
- Apocynum
- Berberis vulgaris
- Digitalis purpurea
- Strophantus (15).

NEFROPATIAS Y HEPATOPATIAS

Se presentan tres tratamientos a continuación:

- Flor de piedra D3 y Vitavetsan:
5 ml de Vitavetsan subcutáneos, 30 días preparto.
5 ml Flor de piedra D3 subcutáneos, 14 días preparto.
5 ml de Vitavetsan subcutáneos, 8 días antes del parto.
- Flor de piedra D3, 5 ml subcutáneos de 8 a 10 días.
- 30 días preparto, 5 ml de Vitavetsan, una o dos veces al día y una vez al día con Flor de piedra D3, 5 ml subcutáneos (16).

NEUMONIA

- Bryonia alba (combate la tos)(35), 2 veces al día (40).
- Solanum dulcamara (35).
- Aconitum napellus y Arsenicum album (si la tos se presenta después de ingerir algo fresco)(35).
- Nux vomica (tos seca con estertores)(35,40).
- Sulphur acid (tos)(35).
- Drosera rotundifolia (35).
- Aconitum napellus cada 1 o 2 horas.
- China

- Nitrum
- Nux vomica y Arsenicum (si hay pérdida del apetito)(35).

NEURALGIA CARDIACA (Raras en Bovinos)

- Spigelia (lado izquierdo)
- Kalmia (lado derecho)
- Kali carbonicum (lado derecho)
- Silicea (ambos lados)(12)

OPTALMIA

- Aconitum napellus, 1 dosis cada media hora (35).
6 gotas, 4 veces al día hasta que inflamación desaparezca (si ojo esta muy irritado, inflamado)(40).
- Conium (una vez desaparecidos los signos inflamatorios)(35).
- Arnica montana internamente 10 gotas dos veces al día.
Externamente una parte de tintura de Arnica en 20 de agua y lavar el ojo frecuentemente (35,40).
- Solanum dulcamera (35).
- Aconitum napellus y Atropa belladonna alternados, 6 gotas, 4 veces al día hasta que la inflamación desaparezca (si la inflamación es el resultado de otra causa)(40)
- Euphrasia, 1 vez al día, 10 gotas hasta que los signos desaparezcan (si continua con los párpados cerrados y los remedios anteriores no son suficientes)(35,40).

OPACIDAD CORNEAL

- Euphrasia tintura madre (1 gota diluida en 9 gotas de agua destilada). 3 dosis alternadas en inyección sub---

conjuntival, 1 vez al día por 3 días alternados. Vender el ojo lastimado en los días que se pone el medicamento. En los días libres irrigar el ojo con loción borica tibia al 2% (21)

ORQUITIS

- Hepar sulphuris
- Anemone pulsatilla
- Mercurius vivus
- Acidum nitricum (15).

PAPILOMATOSIS BOVINA

- Thuja 30x (diluida en alcohol, 2 ml intramuscular, 4 dosis en días alternados.
- Solanum dulcamara 30x, 2 ml intramuscular, 4 dosis en días alternados.
- Causticum 30x, 2 ml intramuscular, 4 dosis en días alternados (24).
- Calcarea carbonica, 6 o 10 gotas, 2 veces al día. (si son numerosas y pequeñas).
- Arsenicum, 2 veces al día, 6 a 10 gotas y aplicar externamente 3 granos de la 3a. trituración en una onza (28. 35 g) de agua destilada y aplicarla 2 veces al día (si hay úlceras pequeñas alrededor).
- Thuja, aplicar la tintura externamente una vez al día para después removerlos (si existe diseminación y sangran cuando se tocan)(40).

PARASITOSIS INTESTINAL

- Cina, dosis múltiples
- Sulphur acid

- Antimonium crudum (si existe repugnancia al alimento)
(35).

PARESIA DEL PARTO

- Carbo vegetabilis
- Veratrum album (cabeza y cuello con sudor frío)(12).

PERDIDA DE APETITO

- Arsenicum, 1 dosis cada día por una semana
- Nux vomica
- Anemone pulsatilla (40).

PERITONITIS

- Aconitum napellus cada 15 minutos y posteriormente de 6 a 8 horas después dar
- Arsenicum album
- Bryonia alba (si es por enfriamiento)
- Nux vomica (si hay estreñimiento)
- Rhus toxicodendron (extremidades y lomo se encuentran paralizados).
- Cantharides (si existe dificultad al orinar)(35).

PICADURA DE INSECTOS

- Agua de Arnica montana (fomentos) y al interior Arnica montana.
- Aguardiente alcanforado (35).

PLEURONEUMONIA AGUDA

- Aconitum napellus, 10 gotas cada 1 o 2 horas, pueden darse hasta 8 dosis o si la fiebre disminuye después continuar con el siguiente remedio. (Fiebre alta, -

- pulso acelerado, dificultad al respirar, piel reseca).
- Phosphorus o Bryonia alba, 6 o 10 gotas cada 3 o 4 horas, alternados con Aconitum napellus, después que los signos más evidentes y violentos disminuyan.
 - Squilla, 10 gotas cada media o una hora de acuerdo a la violencia de los signos (espuma en boca, respira por la boca, cabeza extendida en línea recata con el cuerpo)(40).

PLEURONEUMONIA SUBAGUDA

- Bryonia alba, 1 dosis en la mañana y en la noche por una semana y después dar:
- Arsenicum album, 1 grano de la 3a. trituración, 2 veces al día. No darla en la dieta.
- Aconitum napellus y Bryonia alba alternados (signos - febriles).
- Phosphorus (respiración acelerada).
- Squilla (respira por la boca)(40).

PODODERMATITIS

- Acidum phosphoricum
- Sulphur acid y Carbo vegetabilis y precedidos de algunas dosis de:
- Nux vomica
- Arnica montana interna y externamente
- Arsenicum album
- Acidum phosphoricum (35)

PROBLEMAS POSPARTO

- Acidum formicum D4-D12 subcutáneos 10 ml.
- Flor de piedra D3

Se utiliza en retención placentaria, loquimetría, plogometría, involución uterina, estonía del útero (15).

PROLAPSO DE LA MATRIZ

- Arnica montana
- Aconitum napellus un par de dosis, si hay fiebre.
- Sepia y Anemone pulsatilla (si fue por esfuerzo al expulsar la placenta).
- Cocculus varias dosis seguidas (si el ano se encuentra afectado por la relajación excesiva de los tejidos perineales)(35).

PROLAPSO RECTAL

- Atropa belladonna internamente
- Mercurius vivus (si hay inflamación)
- Murias magnesiae (si fue por estreñimiento).
- Argilla (si fue por diarrea)
- Arsenicum album (por diarrea o por estreñimiento)(35)

PTIRIASIS

- Cocción de Staphysagria
- 3 partes de manteca y una de granos de perejil machacados (35).

PUSTULAS EN OJOS, NARIZ Y BOCA

- Solanum dulcamara y Veratrum album alternados
- Sulphur acid 1 o 2 dosis (35).

RETENCION DE ORINA

- Cantharides
- Hyoscyamus niger (35).

REUMATISMO

- Aconitum napellus, seguido de Arsenicum album
- Bryonia alba (si hay parálisis).
- Rhus toxicodendron (resultado de fatiga)(35)
- Arsenicum album, 10 gotas en la mañana y noche hasta que mejore (si los pies son los más afectados) (40). Si es debido por bebida fría (35).
- Aconitum napellus y Bryonia alba, pueden darse alternados, 10 gotas en la mañana y noche hasta que mejore (si es al comienzo de la enfermedad, hay fiebre y - las partes estan calientes e hinchadas).
- Atropa belladonna, 10 gotas en la mañana y noche (si el animal tropieza cuando camina con los miembros - posteriores hinchados).
- Sulphur acid, 10 gotas en la mañana y noche hasta que mejore, puede darse alternado con otro medicamento (40)

RIÑÓN TRAUMÁTICO

- Aconitum napellus
- Arnica montana
- Lachesis
- Phosphorus (15).

SALIDA DE LECHE

- Calcarea carbonica (problema interno)
- Arnica montana (si teta esta inflamada)
- Atropa belladonna (si existe hinchazón de pezón)
- Chenopilla (si hay induración de los pezones)(35).

SARNA

- Sulphur acid, 1 dosis diaria seguida del siguiente medicamento.
- Staphysagria (erupción y prurito)
- Solanum dulcamara (vesículas y exantemas)
- Mezereum (tuberculos pruritosos con enrojecimiento de la piel)
- Arsenicum album (pérdida de apetito y diarrea) (35)

SINDROME HEPATO-RENAL

- Berberis vulgaris (dolor agudo en vejiga y riñón, oliguria, urolitos)
- Flor de niebla D3 (ayuda a regenerar células hepáticas, en humanos se utiliza en hepatopatías)
- Serum anquillae D8 (actúa como tóxico en la sangre al dañar las células, actúa sobre la diuresis restableciéndola) (15).

TERAPIA DE RUTINA

Profilaxis en becerros recién nacidos:

- Vitaminas
- Vacunas
- Calcium carbonicum o Calcium phosphoricum y Phosphorus (como promotores del crecimiento).

Preparto y posparto:

- Vitavetsan 5 ml.

En estrés:

- Chelidonium con Lasseptal (con hemoglobinuria) y después de este tratamiento añadir Flor de niebla para prevenir degeneración hepática o renal.

En animales que incrieren demasiado:

- Phosphorus D5

En la primera fase de la lactación:

- Caulophyllum G30 (musculatura del útero)
- Anemone pulsatilla (que no se retarde el parto y no engorden las piernas ni tengan dolor)(14).

TIMPANISMO

- Colchicum autumnale alternado con Arsenicum album
- Nux vomica (alteración de la función digestiva)(35).

TIMPANITIS CRONICA

- Spasmovetsan.
- Nux vomica (fomenta el eructo).
- Chelidonium (fomenta la secreción biliar).
- Colocynthis (disminuye el espasmo)(11).

TOS

- Solanum dulcamara (por enfriamiento).
- Bryonia alba.
- Atropa belladonna y Drosera rotundifolia (tos crónica).
- Hyoscyamus niger (si es frecuente).
- Squilla (tos por fatiga).
- Chamomilla (tos seca con diarrea).
- Anemone pulsatilla (tos frecuente y anorexia).
- Spiritus sulphuratus (35).

TRASTORNOS CIRCULATORIOS (ENFERMEDADES SEPTICAS)

- Atropa belladonna.
- Bryonia alba.
- Coffea
- Echinacea
- Lachesis (12).

TRASTORNO HEPATICO

- Amynin 500ml y azúcar de uve (dextrosa) 2 tratamien-
tos o
- Amynin 500ml. 2 tratamientos o
- Ornitin aspartato 60 ml y dextrosa, 2 tratamientos o
- Ornitin aspartato 60 ml, 2 veces (intravenosas)
- Flor de piedra D3, 10 ml subcutáneos, 2 veces
- Bchinacea y Amynin y azúcar de uva (9)

TUMORES

- Arnica montana (debido a causa externa)
- Arsenicum album
- Conium (si hay dolor)
- Bryonia alba (debido a enfriamiento)
- China y Arsenicum album alternados o
- Sulphur acid o Mercurius vivus
- Baryta carbonica (mandíbula inferior)
- Aconitum napellus y Bryonia alba (en pecho)
- Aurum metallicum y Atropa belladonna (en cabeza)
- Thuja (si hay costras)
- Sulphur acid (35).

ULCERAS O LLAGAS EN TETAS

- Loción de Arnica montana
- Thuja externamente si ahy verrugas, 20 gotas de tin-
tura en una onza (28.35) de agua y aplicarla 2 veces
al día.
- Silicea, Arsenicum album y Sulphur acid, 10 gotas ca
da noche hasta que las úlceras esten curadas (40).

VEJIGA IRRITADA

- Cantharis
- Colocynthis
- Solanum dulcamara
- Nux vomica
- Lilium trigrinum
- Sepia (15).

VERRUGAS

- Solanum dulcamara (secas, lisas y no pediculadas).
- Sulphur acid.
- Arsenicum album (si se ulceran).
- Causticum (si sangran y duelen).
- Thuja (si son de gran volumen).
- Calcarea carbonica (verrugas en los labios)(35).

TRATAMIENTO DE OVINOS CON HOMEOPATIA

ABORTO

- Arnica montana 1 dosis (si recibió algún golpe, darla inmediatamente para prevenir alguna consecuencia)
- Sabina 4 gotas, 2 veces al día (signos de aborto estan comenzando, existe una tendencia general de aborto en todas las hembras del rebaño)
- Secale cornutum, 2 veces al día 4 gotas (si continuan los signos después de haber dado 2 o 3 dosis de Sabina y el esfuerzo es más violento)
- Anemone pulsatilla cada 3 o 4 horas, 4 gotas (40).

APTAS EN CORDEROS

- Acidum muriaticum
- Acidum sulphuricum
- Borax (35)

ANOREXIA

- Arsenicum album
- Antimonium crudum (tubo digestivo esta ocupado de alimento)
- Nux vomica (si existe estreñimiento)(35)

BOCA NEGRA

- Nitricum acidum 3a. dilución, 1 vez al día, 4 gotas y externamente dar baños de agua en la proporción de 30 gotas de ácido en 1 onza (28.35 g) de agua y aplicarlo con una brocha en la parte afectada.
- Terminar con algunas dosis de Sulphur acid (40)

CARBUNCO

- Raspar las vesículas y lavar la boca con agua mezclada con algunas gotas de Arsenicum album (35)

CATARRO

- Aconitum napellus 3 veces al día. 3 o 4 gotas (fiebre)
- Nux vomica, 2 veces al día, 3 gotas en la mañana y 3 en la noche (estornudos frecuentes y tos)
- Arsenicum album, 2 veces al día (3 gotas en la mañana y 3 en la noche)(profusas descargas nasales)
- Mercurius vivus, 3 veces al día 3 o 4 gotas (ollares inflamados, frecuentes estremecimientos, profusas descargas nasales)(40).

COLICO

- Aconitum napellus (cólico espasmódico por enfriamiento)
- Colchicum autumnale, dosis repetidas cada 15 minutos (si es cólico por timpanismo)(35)

CONSTIPACION

- Nux vomica, 2 veces al día 3 o 4 gotas (animal echado, pateo, heces en pequeñas cantidades)
- Opium, 3 o 4 gotas en la mañana y en la noche.
- Bryonia alba, 2 veces al día 3 o 4 gotas (debido al frío)
- Sulphur acid 2 o 3 dosis después de haber obtenido el alivio (40)

DEBILIDAD EN CORDEROS (MORRORA)

- Atropa belladonna 1 dosis diaria y después 1 dosis cada 2 días (35).

DIARREA

- Ipecacuanha
- Arsenicum album
- Antimonium crudum (si existe repugnancia hacia los alimentos)
- Anemone pulsatilla en corcheros (35)
- Chamomilla, 2 gotas cada 2 o 3 horas (diarrea por frío, evacuaciones verdosas, distensión abdominal y cólico)
- Arsenicum album, 4 gotas cada 1, 2 o 3 horas (indicado cuando evacuaciones son oscuras y pestilentes combinadas con sangre)
- Mercurius vivus, 4 gotas cada 1, 2 ó 3 horas (esfuerzo violento, evacuaciones con sangre o sangre y moco)
- Ipecacuanha, 2 gotas cada 2 o 3 horas (evacuaciones son blancuzcas y parecidas a levadura y pestilentes)
- Anemone pulsatilla y Arsenicum album, 2 gotas cada 2 o 3 horas (es el mejor remedio para la diarrea en cordeiros y al mismo tiempo dar a la madre 1 o 2 dosis de Sulphur acid (40).

DISENTERIA

- Arsenicum album alternado con
- Aconitum napellus
- Chamomilla (35)

DISTOCIA

- Arnica montana y Loción de Arnica externamente.
- Secale cornutum (si oveja se encuentra en un estado de esfuerzo violento)(40).

ENCEFALITIS

- Aconitum napellus cada 10 minutos hasta completar -

10 dosis y después dar

- Atropa belladonna alternada con Aconitum napellus cada 20 minutos. Después de 2 horas dar 2 o 3 dosis de:
- Veratrum album (35).

ENTERITIS

- Aconitum napellus, 6 u 8 dosis en intervalo de 1 hora y media, seguido de
- Arsenicum album 3 o 4 dosis (35).

EPILEPSIA

- Aconitum napellus y Datura stramonium
- Atropa belladonna e Hyoscyamus niger
- Como prevención dar Canthora (35).

ESTORNUDO, FLUIDO NASAL, LAGRIMEO

- Aconitum napellus
- Chamomilla
- Atropa belladonna (35).

ESTREÑIMIENTO

- Nux vomica alternado con
- Antimonium crudum
- Nux vomica y Anemone rulsatilla (si existe alternativas de estreñimiento y diarrea)(35).

FARINGITIS

- Aconitum napellus 1 dosis cada 30 minutos y a las 4 horas administrar lo siguiente:
- Atropa belladonna 4 dosis con 1 hora de intervalo.
- Spongia marina cuando hay dificultad al respirar (35).

HEMATURIA

- Ipecacuahna
- Cantharides (si existe nefritis)
- Aconitum napellus (35).

HEPATITIS

- Aconitum napellus
- Digitalis purpurea (signos inflamatorios presentes)
(35).

HERIDAS, COJERA

- Unas cuantas gotas de Arnica montana en agua hervida y lavar la herida.
- Aconitum napellus (si hay inflamación).
- Equilla (si presenta inflamación).
- Anemone pulsatilla (si existen fistulas).
- Mercurius vivus
- Ferula asafoetida y Silicea (si existe pus)
- Arsenicum album (si existen bordes duros).
- Symphitum interne y externamente si existe lesión en hueso (35).

HIDROPESIA

- Arsenicum album 3a. trituración 1 grano, 2 veces al día. Posteriormente dar algunas dosis del siguiente medicamento.
- Sulphur acid
- Lycopodium (puede ser útil)(40).

ICTERICIA

- Cassomilla
- Mercurius vivus.

- Nux vomica (35).

INDIGESTION

- Arsenicum album, 2 veces al día 4 gotas (mala calidad de alimento, si hay diarrea y pérdida de fuerza).
- Nux vomica, 2 veces al día 4 gotas (abdomen aumentado si existen signos febriles dar alternado con Aconitum napellus).
- Bryonia alba, 2 veces al día 4 gotas (debido a cambio de dieta y hay pérdida de apetito)(40).

LUXACIONES

- Después de la reducción humedecer la parte afectada con tintura fuerte de Arnica montana y continuar hasta desaparecer la tumefacción (35).

MAREO, VERTIGO

- Aconitum napellus asociado con algunas dosis de
- Datura stramonium (35).

MASTITIS

- Bryonia alba, Atropa belladonna y Chamomilla
- Arsenicum album (angrena).
- Secale cornutum (si hay desprendimiento de piel).
- Chamomilla y Camphora (induración).
- Mercurius vivus y Hepar sulphuris (determinan la abscesión del tumor).
- Arsenicum album y Anemone pulsatilla (si hay pus)(35).
- Aconitum napellus, 4 gotas cada 1. 2 o 3 horas (al comienzo, pulso está aumentado y existen signos febriles).

- Bryonia alba, 4 gotas cada 1, 2 o 3 horas (usada después de la anterior, si es a causa del frío. Puede usarse alternada con Atropa belladonna).
- Atropa belladonna, 2 gotas cada 2 o 3 horas (si ubre se encuentra inflamada, roja y sensible).
- Chamomilla, 3 o 4 gotas, 2 veces al día (si la piel de ubre esta demasiada flácida, no hay demasiada inflamación, pero una sustancia dura puede sentirse en el interior).
- Hepar sulphuris (ubre se encuentra en estado de supuración).
- Silicea y Sulphur acid (cuando ubre se encuentra oscura y dura)(40).

NEFRITIS

- Aconitum napellus 2 o 3 dosis con intervalos de una hora y media, emplear después
- Cantharides 2 o 3 dosis
- Nux vomica y Nitrum alternados (35).

NEUMONIA

- Aconitum napellus cada cuarto de hora.
- Bryonia alba (35).
- Aconitum napellus, 4 gotas cada 20, 30 minutos hasta mejoría, después continuar por intervalos largos.
- Phosphorus, 4 gotas cada 20, 30 minutos o 1 hora.
- Phosphorus y Bryonia alba alternados, 4 gotas cada 20, 30 minutos o 1 hora.
- Tartarus emeticus, 4 gotas cada media o 1 hora (respiración sofocante y sonora, flemas, tos seca)(40)

OFTALMIA

- Lavar el ojo con agua de Arnica montana (5 gotas de Arnica montana en 30 gramos de agua).
- Arnica montana 3a. dilución, 1 o 2 dosis (internamente).
- Cannabis sativa (manchas en córnea).
- Aconitum napellus (oftalmia aguda)
- Euphrasia (oftalmia crónica).
- Sulphur acid (demasiado lagrimeo) (35).

FEDERC

- Lavar con agua de Arnica montana y poner en el interior.
- Acido nitrico fumante en un pinzel y poner en la herida de espacio interdigital (35).

SARNA

- Balsamus terevinthine sulphuretus por 8 o 10 días.
El animal no debe comer y beber hasta 2 horas después del medicamento (35).

TENIASIS

- Filix mas
- Cina (otros parásitos intestinales, biliares)
- Mercurius solubilis (otros parásitos).
- Oleum terebinthinae (35)

TETANOS

- Nux vomica (35).

TIMFANISMO

- Colchicum autumnale 1 dosis, si no existe mejoría re--

petir dosis cada 15 minutos.

- Arsenicum album 1 o 2 dosis para evitar que se presente otra vez (35).
- Colchicum autumnale 1 dosis cada 10 o 15 minutos, dar 3 o 4 dosis si no hay alivio. Puede darse alternado con el siguiente medicamento.
- Arsenicum album (en la mayoría de los casos estos dos son suficientes excepto cuando el abdomen esta distendido y la muerte es percibida es necesario punzar para que el gas escape, si los signos son abatidos y la rumia no -- esta restaurada se puede dar el siguiente medicamento).
- Nux vomica
- Loción de Arnica aplicarla externamente si se incidió el rumen y 1 dosis de Arnica montana internamente (40).

TOS

- Solanum dulcamara (35).

TRATAMIENTO DE CAPRINOS CON HOMEOPATIA

ALOPECIA

- Sulphur acid por largo tiempo
- Psoricum
- Sulphur acid y Arsenicum album (si es por deficiente alimentación)
- Bryonia alba y Acidum nitricum (si es por enfriamiento)(35).

ANOREXIA

- Antimonium crudum y Arsenicum album
- Bryonia alba y Arsenicum album (si depende de enfriamiento)(35)

COJERA (por lesión en miembros)

- Levantar la lesión con agua de Arnica
- Aconitum napellus y Scuilla (si hay inflamación)
- Arsenicum album (si existe dolor)(35)

SORICO

- Aconitum napellus 1 dosis seguido de
- Luz vomica 2 dosis.

Si es debido a enfriamiento Aconitum napellus es el específico (35)

DIARREA

- Anemona pulsatilla
- Chamomilla (35)

ENCEFALITIS

- Aconitum napellus 1 dosis cada hora y después de la 5ta. dosis se da con menor frecuencia.
- Atropa belladonna 1 dosis cada 8 o 10 horas (35).

ENFLAQUECIMIENTO, CAQUEXIA

- Arsenicum album
- China (35)

ESTREÑIMIENTO

- Nux vomica (35)

HEMATURIA

- Aconitum napellus
- Cantharis
- Arnica montana (si es debido por alguna causa externa)
- Ipecacuana (si es de origen alimenticio)(35)

HERIDAS, LLAGAS

- Fomentos de agua de Arnica montana
- Mercurius vivus y
- Perula asafetida (si existe supuración)(35).

INFLAMACION

- Cantharis
- Nux vomica
- Opium (35)

INFLAMACION DE ORGANOS DE CAVIDAD ABDOMINAL

- Aconitum napellus a cortos intervalos, después dar
- 1 o 2 dosis de Arsenicum album (35).

MASTITIS

- Bryonia alba (si existe inflamación)
- Chamomilla (si glándulas estan tumefactas)
- Arnica montana y después dar Aconitum napellus (si es debido a una lesión externa)
- Arnica montana en fomentos 20 grs de tintura madre en 100 grs de agua destilada.
- Aconitum napellus y Mercurius vivus (en caso severo) (35).

NEUMONIA

- 1 dosis de Aconitum napellus cada 15 minutos durante 3 o 4 horas después continuar con
- Bryonia alba 1 o 2 dosis (35).

SARNA

- Mezereum
- Scabiesinum ovium (35)

TIMPANISMO

- Colchicum
- Nux vomica (si queda con estreñimiento) (35)

TOS

- Arsenicum album algunas dosis (35)

VERTIGO O MAREO

- Aconitum napellus en dosis repetidas hasta que desaparezca (35)

TRATAMIENTO DE SUINOS CON HOMEOPATIA.

ADELGAZAMIENTO

- Arsenicum album
- Antimonium crudum (35).

ANGINA

- Aconitum napellus, 1 dosis cada 15 minutos luego dar
- Atropa belladonna cada 1 o 2 horas, si ni hay recuperación dar
- Spongia marina cada hora si no existe mejoría después de 3 horas dar
- Hepar sulphuris
- Antimonium tartaricum (35).
- Aconitum napellus 3 gotas cada 4 horas.
- Arsenicum album, cada 4 horas 3 gotas (animal sediento, ojos rojos y todo el cuerpo ardiente).
- Atropa belladonna y Hepar sulphuris, alternados 3 veces al día, 3 gotas.
- Spongia cada 4 horas, 3 gotas (dificultad al respirar y existe el peligro de sofocarse)(40).

ANOREXIA

- Nux vomica (contraindicado Antimonium crudum).
- Arsenicum album (35).

ARTRITIS (POR MYCOPLASMA)

- Bryonia miniplex (Bryonia alba, Rhus toxicodendron, Echinacea, Fyrogenium y Ranunculus bulbosus), 1 a 5 ml subcutáneo (52).

CATARRO

- Nux vomica, 2 veces al día 3 gotas.
- Mercurius vivus, 3 gotas 2 veces al día (40).

CATARRO PULMONAR

- Nitrum 2 o 3 dosis (35). 3 gotas 2 veces al día por 2 días (40).
- Aconitum napellus (si hay signos febriles)(40).

GISTICERCOSIS

- Kali carbonicum
- Como preventivo dar ceniza de madera de haya mezclada en el alimento (35).

COLICO

- Colchicum autumnale
- Aconitum napellus (si es por enfriamiento), después - de 2 horas dar
- Arsenicum album (35).

CONSTIFACION

- Nux vomica, 1 vez al día, 4 gotas.
- Bryonia alba, 4 gotas, 1 vez al día.
- Opium, 4 gotas, 1 vez al día (40).

DIARREA

- Aconitum napellus (por enfriamiento).
- Arsenicum album (si es de cólico y se reemplaza por)
- Ipecacuahna (si persiste).
- Arsenicum album y Anemone pulsatilla (por problemas estomacales).
- Mercurius vivus.

- Rheum (si es crónica)(35).
- Arsenicum album, 3 veces al día, 3 gotas (producida por comer alimento verde).
- Anemone pulsatilla, 3 veces al día, 3 gotas (cuando el animal ha comido gran cantidad de alimento).
- Mercurius vivus, 4 veces al día, 3 gotas (si hay dolor y presenta esfuerzos violentos).
- Chamomilla, 2 veces al día, 3 gotas (utilizado para el control de diarrea en cerditos recién nacidos)(40).

ECTOPARASITOS EN OIDO

- Humedecer con Arnica montana el oído (35).

ENCEFALITIS

- Aconitum napellus, 1 dosis cada 10 o 15 minutos después de 1 o 2 horas dar el siguiente medicamento.
- Atropa belladonna, después de 2 horas continuar con:
- Sulphur acid (35).
- Aconitum napellus 3 o 4 dosis, después continuar con
- Atropa belladonna y puede alternarse con Aconitum napellus 3 gotas cada 1, 2 o 3 horas.
- Hyosciamus niger, cada 1, 2 o 3 horas, 3 gotas (40).

ENFERMEDAD DEL EDEMA O COLIENTEROTOXEMIA

- Snesmovetsan (laboratorios Schwabe) 3-5 ml gr.
- Crataegus miniplex (Laboratorios Hydrochemie) 2-3 ml o
- Creflonin 1 ml en forma oral por 3 o 4 días en el agua de bebida. (Darlo cuando se ve el edema).
- Kali carbonicum
- Magnesium carbonicum o phosphoricum (51).

EPILEPSIA

- Atropa belladonna
- Cina (35).

ERISIPELA

- Aconitum napellus y Anemone pulsetilla.
- Bryonia alba y Rhus toxicodendron (si el exantema cierra en falso y vuelve a abrirse).
- Nux vomica y Bryonia alba (si hay tos)(35).

ESTREKIMIENTO

- Nux vomica
- Opium
- Plumbum (35).

FIEBRE

- Aconitum napellus
- Anemone pulstilla
- Atropa belladonna (35).

FIEBRE DE SAN ANTONIO

- Arsenicum album y Atropa belladonna, 4 gotas cada una por 2 o 3 horas (40).

FRACTURAS

- Arnica montana 1 dosis (después de la reducción).
luego administrar el medicamento siguiente:
- Symphytum a dosis repetidas.
- Rocier el vendaje con agua de Arnica montana, 15 días son suficientes (35).

PUROR

- Atropa belladonna 2 o 3 dosis (35).

GASTRITIS

- Aconitum napellus y Arsenicum album, alternados simultáneamente
- Carbo vegetalis (35)
- Aconitum napellus, 4 gotas cada 1, 2 o 3 horas (animal inquieto y gruñe continuamente)
- Arsenicum album 4 gotas cada 1, 2 o 3 horas (el animal tiene mucho dolor, especialmente si comió mucho)
- Aerone rulsatilla e Inecacuahne, 4 gotas cada 1, 2 o 3 horas (si existe disposición a vomitar o vomitó el animal)(40).

HERIDAS, LLAGAS Y ULCERAS

- Arnica montana externamente
- Synchyttum (si el hueso está lesionado)(35)

HIDROPESIA

- China y Arsenicum album alternados simultáneamente (35)

ICTERICIA

- China
- Nux vomica
- Mercurius vivus
- Sulphur acid
- Iycorodium clavatum (35)

INFLAMACION

- Atropa belladonna
- Mercurius vivus (35).

INFLAMACION DE MIEMBROS

- Rhus toxicodendron
- Arnica montana externamente
- Arsenicum album (si existe dolor)
- Acidum sulphuricum
- Conium (35).

LUXACIONES

- Tintura de Arnica montana exteriormente en proporción de 50 gotas en 120 g de agua.
- Aconitum napellus interiormente
- Ruta (35).

MASTITIS

- Aconitum napellus varias dosis, después dar
- Atropa belladonna y alternarlo con Aconitum nap. (40).

MIOPATIAS

- Arnica montana y Atropa belladonna D4, 5 ml subcutá--
neos y 10 gotas diariamente por 10 días (52).

MUERTE AL NACIMIENTO (CONTROL)

- Gaultherium 30a.C en forma de píldoras en el alimento, 2 veces a la semana por 3 semanas (4).

NEUMONIA

- Aconitum napellus 1 dosis cada media hora.

- Bryonia alba al cabo de 3 o 4 horas
- Nitrum y China a dosis múltiples desnudas
- Stannum, Phosphorus y Calcerea carbonica (35).
- Aconitum napellus, cada 2 o 3 horas, 3 gotas y continuar con:
- Phosphorus, cada 2 o 3 horas, 3 gotas (los anteriores son suficientes para dar alivio).
- Bryonia alba, 3 veces al día, 3 gotas (tos seca, - rigidez de miembros anteriores)
- Sulphur acid 1 o 2 dosis cuando la recuperación tome lugar (40).

OPTALMIA

- Natrum muriaticum diluición atenuada lavar el ojo (si es producto de un cuerpo extraño)
- Aconitum napellus 1 o 2 dosis al interior seguido de 2 o 3 dosis de Arnica montana y al exterior lavar con loción de arnica (20 g. de tintura madre en 120 g. de agua).
- Aconitum napellus seguido de Cannabis sativa y Atrona belladonna (debido a una cause interna)
- Spigelie (si hay blefaritis)
- Bryonia alba y Solenum dulcamara (si es por enfriamiento)(35).

OSTEOCONDROPATIAS: ARTHROSIS DEFORMANTE Y EPIFISTOLISIS.

- Phosphorus en forma de Vitavetsan (Iffa Merieux) más
- Symphytum pentarken (Symphytum, Arnica montana, Calendula officinalis, Ruta, Rhus toxicodendron) o
- Silicea Pentorkan (Silicea, Arnica montana, Calcium fluoratum, Bambus y Thuja)(52).

OSTEOPATIAS: OSTEOMALACIA, RAQUITISMO Y OSTEODISTROFIA

- Vitamina D3 y minerales además de lo siguiente:
- Calcium phosphoricum D8, 10 gotas diariamente.
- China miniplex 5 ml subcutáneos y 10 gotas, 2 veces al día (en animales nostrados y con los medicamentos mencionados anteriormente)(52).

PEZUÑAS HERIDAS

- Atropa belladonna D4, 5 ml subcutáneos, además de
- Ginkgo biloba D2, 5 a 10 gotas, 3 veces al día (52).

POLISEROSITIS (POR Haemophilus suis y Mycoplasma hyorninus)

- Bryonia miniplex (Laboratorio Hidrochemie) el cual - contiene Bryonia alba, Rhus toxicodendron, Echinacea, Pyrogenium y Ranunculus bulbosus, 1 - 5 ml subcutáneos (52).

PROLAPSO RECTAL

- Arsenicum album
- Arnica montana internamente y exteriormente inyectar Agua de Arnica a la porción de recto salido.
- Argilla (si hay diarrea)(35).

PTIRIASIS

- Fomado de granos de perejil y 3 de manteca extermanente.
- Arsenicum 30g con 4 l de vinagre y 2 l de agua, obtener el líquido y ponerlo externamente.
- Sulphur acid internamente
- China (si se encuentra débil el animal)(35).

RABIA

- Poner unas gotas de extracto de Atropa belladonna en

un lienzo empapado con agua y cubrir la herida.

- Atropa belladonna dar internamente todos los días, después cada 2 o 3 días durante 4 o 5 semanas.
- Datura stramonium como tratamiento consecutivo del anterior (35).

SARNA

- Sepia y Sulphur acid (si dolencia es seca).
- Staphysagria, Solanum dulcamara y Sulphur acid (en caso contrario).
- Solanum dulcamara y Veratrum album (en lechones) seguido de 1 o 2 dosis de Sulphur acid (35).

SINDROME MASTITIS-METRITIS-AGALACTIA

- Sabina miniplex (Hidrochemie) que contiene: Sabina D4, Viscum album D2, Lachesis D8, Gollinsona canadensis D3, Phytolacca D4 o Bryonia D4 con Apis D4. (Para casos con metritis y mastitis).
- Bryonia alba (en inflamación con mucho calor y heces duras y secas).
- Phytolacca (a la presión hay dolor).
- Apis mellifica (si además de la inflamación hay edema).
- Lachesis, Laseptal (Schwabe) (si hay tendencia séptica).
- Sabina miniplex 1 inyección además de administrar posteriormente Sabina 3x, 10 gotas por día (si hay metritis ouerperal con temperatura), se pueden adicionar - antibióticos en el utero.
- Galega miniplex (Hidrochemie) que contiene: Galega D3, Phosphorus D4, Aristolochia D4, Lachesis D8. Una inyección subcutánea y luego por varios días dar Galega 3-

- 4x, 10 gotas por día (si hay agalactia).
- Arnica montana D3, diariamente 3 o 4 tabletas o 10 gotas (ayuda en el parto).
 - Hepar sulphuris D3 vía oral o Hepar sulphuris C30 subcutáneo.
 - Lactovesan (Perula asafoetida D2, Anemone pulsatilla D2, Aristolochia D4, Phytolacca D4)(laboratorio Swabe) (para ayudar a la formación láctea).
 - Pulsatilla D4, Galega o Lactovetsan (para intestino atónico, heces secas, retención de heces, nerviosismo)
 - Nux vomica D6 y Galega (nerviosismo, intestino atónico, heces secas, retención de heces, bostezos).
 - Caulophyllum pentarkan (Anemone pulsatilla D3, Caulophyllum D3, Calcium fluoratum D6, Cimicifuga racemosa D2 y Arnica montana D2) dar de 8 a 10 días antes del parto, 10 gotas dos veces al día. (Si hay atonía del utero).
 - Caulophyllum pentarkan o Caulophyllum D3, 5 gotas cada media hora (parto débil y atonía del utero)(50).

TETANOS

- Nux vomica a dosis repetidas los primeros días y después a mayores intervalos (35).

TIFUS

- Arsenicum album 1 o 2 dosis en principio de la enfermedad.
- Si esta desarrollada utilizar el mismo medicamento cada 15 minutos hasta que sane (35).

TIMPANISMO

- 2 o 3 dosis de Colchicum autumnale en espacio de 1 hora (35).

TRASTORNOS EN LA FASE PERINATAL

- Arnica montana (tiene un efecto antiflogístico, por causas mecánicas como aplastamiento, hematoma, hemorragia. Disminuye el dolor, ayuda a la circulación, también en sangrados de la placenta, trastornos puerperales).
- Atropa belladonna (actúa sobre músculos, mejora el tono muscular).
- Caulophyllum (actúa sobre músculos del útero, como si fuera oxitocina).
- Gelsemium sempervirens (actúa sobre el sistema nervioso, calma y regulariza al corazón tiene efecto en el cervix rígido).
- Pulsatilla pratensis (en cerdas jóvenes, miedosas y sensibles, ayuda a normalizar la gestación, lactación y puerperio).
- Crataegus, Digitalis purpurea y Laurocerasus (como adyuvantes en la circulación, musculatura, en animales viejos con corazón enfermo, pulmón con insuficiencia).
- Digitalis purpurea D6 (en taquicardia)
- Digitalis purpurea D2 (en bradicardia).

Ejemplo: Cerdá muy nerviosa, con taquicardia la terapia es la siguiente:

- Anemone pulsatilla D4, 5 ml subcutáneos, y además
- Gelsemium sempervirens D3, 5 ml subcutáneos con
- Caulophyllum C30, 3 ml subcutáneos y luego cada media hora dar la siguiente combinación.

- Atropa belladonna D4 y Gelsemium sempervirens D3, 8 gotas cada media hora (49).

TUMORES

- Arnica montana al exterior e internamente.
- Atropa belladonna cuando existe inflamación de la cabeza (35).

VOMITO

- Cuprum y Veratrum album (35).

TRATAMIENTO DE PERROS CON HOMOPATIA

AGRESION

- Ignatia amara D30, 5 glóbulos 1 vez al día (1).

AGRESION POR MIRDO

- Aconitum napellus D1000, 5 glóbulos, 1 vez al día (47).

ASMA

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días (10)

CATARRO

- Nux vomica 4 gotas 3 veces al día.
- Mercurius vivus, 4 gotas tres veces al día (47).

COLICO

- Aconitum napellus 1 o 2 dosis
- Arsenicum (si existe constipación)
- Nux vomica (si existe constipación)
Dosis de anteriores: 3 gotas 1 vez al día (40).
- Lycopodium clavatum D3
- Veratrum album D6 (si existe vómito y diarrea)(1).

COLITIS

- Bryonia alba D4 (1).

CONMOCION CEREBRAL CON VOMITO

- Ipecacuahna D4 - D6 y C 30 combinadas con -

- Arnica montana C30 y
- Hypericum D4 (1).

CONSTIPACION FECAL

- Bryonia alba D4 (1).

CONVULSIONES

- Abrotanum (Artemisa de los jardines o Citronela), cuando las convulsiones aparecen durante el sueño y son acompañadas de un prurito intenso. (En animales ansiosos, hipernerviosos y agresivos. Se nota un adelgazamiento a pesar de tener un apetito voraz y alteraciones de constipación con diarrea).
- Aconitum napellus, cuando las convulsiones siguen a menudo a una exposición al sol, viento frío y seco por largo tiempo. (Animales jóvenes, pletóricos, ansiosos, tienen miedo sobre todo al exterior, apetito caprichoso y la toma de alimentos es seguida de una hinchazón dolorosa del abdomen, disnea durante las convulsiones -- acompañada de un envaramiento de la nuca).
- Actea racemosa (Actea de las uvas), las crisis convulsivas están en relación con las "cacerías". La hembra presenta una inestabilidad de humor y temores dolorosos de todo el cuerpo: pupilas dilatadas, apetito disminuido, poliuria, pulso irregular, constipación con diarrea, la sensibilidad de toda la columna vertebral.
- Agris muscarius (Palsa naranja), las crisis convulsivas están acompañadas de una incoordinación de movimientos, paresia del tren posterior, sacudidas musculares que desaparecen durante el sueño. (Remedio de -

los animales de edad, que se fatigan facilmente y de humor cambiante. El animal esta sensible al roce, la cabeza se agita con un movimiento continuo y es el comienzo de un prurito intenso. Apetito y sed exagerados, respiración corta y opresiva, excitación sexual exacerbada).

- Argentum nitricum, en el curso de las crisis, incoordinación motriz, marcha vacilante y precipitada. (Animales ansiosos que tienen miedo al movimiento de las muchedumbres, fotofobia, vómito viscoso, flatulencia con emisión de una diarrea verdosa, incontinencia urinaria).
- Arnica montana, después de traumatismos, debilidad general con envaramiento de todos los miembros, épistaxis, respiración difícil, incontinencia urinaria, falta de alimentos sobre todo de leche y carne.
- Atropa belladonna, las crisis aparecen una extrema violencia. Animales sobreexcitados con la necesidad de ladrar, morder y destruir. Sensibilidad excesiva de los organos de los sentidos con intolerancia al ruido y a la luz. (Las mucosas estan cianóticas, pupilas dilatadas y fijas, necesidad continua de ingerir, pero con dificultad a la deglución que empeora con los líquidos, rigidez del cuello, piel roja y caliente).
- Cicuta virosa, las convulsiones son de extrema violencia, tónicas y clónicas que comienzan por la cabeza; el menor ruido y el menor contacto puede desencadenar la crisis. (Envaramiento de la nuca, pupilas dilatadas, depravación del gusto).
- Chamomilla, las crisis se pueden atribuir a los problemas de la dentición en los jóvenes. Siempre estan

- acompañados de problemas digestivos.
- Cuprum, convulsiones tónicas y clónicas que comienzan por las extremidades, se presenta en animales tímidos y miedosos por lo tanto las crisis ven acompañadas de agresividad. (Cólicos espasmódicos dolorosos, diarrea violenta a menudo sanguinolenta, respiración acelerada).
 - Gelsemium sempervirens, las convulsiones están acompañadas de una debilidad de los miembros posteriores y de una incoordinación motriz. En animales lentos, perezosos pero muy irritables, miedosos a la soledad y al público. (Contracción de los músculos de la cara, a menudo una pupila está dilatada y la otra contraída. Tremor de la lengua, incontinencia urinaria, dolores en la región lumbosacra con envaramiento de la nuca, pulso lento).
 - Hyosciamus niger (juscuiame negro). las crisis convulsivas están siempre precedidas de una gran agitación con pupilas dilatadas, vómito, cólico, diarrea involuntaria, retención de orina.
 - Ignatia amara, convulsiones con sacudidas violentas de todo el cuerpo, variabilidad del carácter y de todos los síntomas. (Se puede pensar en un susto o parasitismo intestinal, inicio de un embarazo nervioso o psicológico).
 - Nux moschata (noix muscade), animales de humor cambiante pero que presentan una hipersensibilidad de todos los sentidos y sobre todo del oído (crisis convulsivas desencadenadas con un fuerte ruido). Pulso acelerado.
 - Nux vomica (Noix vomique), animales de carácter vivo, irritables, impacientes y susceptibles. Las crisis -

convulsivas son análogas a aquellas del tétanos. Hipersensibilidad al ruido y a la luz. Alimentación -- desequilibrada.

- Opio, las crisis convulsivas llevan rápidamente a una parálisis. Animales tranquilos que presentan abdomen blando, doloroso, inercia intestinal (pensar en una - oclusión intestinal).
- Plumbum, durante el curso de las crisis las pupilas - están contraídas, animales indiferentes, perezosos y gordos. Hay parálisis de los extensores, de los miembros posteriores con agrofia muscular progresiva. De sagrado por los alimentos, náuseas con vómitos violentos, constipación.
- Silicea, las crisis de epilepsia preceden o siguen a las supuraciones crónicas (fístulas dentarias), hipersensibilidad de todos los sentidos (sobre todo del - oído). Pérdida del apetito pero sed excesiva. Incontinencia urinaria (sobre todo en los animales jóvenes parasitados).
- Datura stramonium, crisis de locura con necesidad de morder, atacar y ladrar, convulsiones tónicas seguidas por provocada por el menor contacto o por la luz intensa. Animales gordos hipersensibles a soportar la obscuridad y la soledad. Ninfomanía (sobre todo en gatos), - deglución difícil, cólicos abdominales que se pueden atribuir a una constipación.
- Tarentula, convulsiones clónicas rítmicas que persisten durante el sueño, rigidez e inmovilidad cataleptica. Caracter inestable del animal a menudo poco inteligentes, agitados y tienen miedo de nada y sobre - todo a otros animales.

- Veratrum viride, los síntomas son violentos y cesan -- bruscamente. El animal esta agitado, gime y después busca morder, las pupilas estan dilatadas, necesidad incesante de atacar, mucha sed pero toma en pequeñas cantidades de agua fría, los miembros posteriores están agitados con violentas sacudidas dolorosas.
- Zincum, animales gordos de humor variable sobre todo -- cuando se les trata de desplazar. Hipersensibles al menor ruido, cólicos flatulentos, agitación constante de los miembros que también dura durante el sueño (33).

DERMATITIS (CUSHING)

- ACTH 30, 5 gotas cada tercer día (47).

DERMATITIS (CON TRICORREXIS)

- Lycopodium clavatum D30 (47).

DERMATITIS CRONICA (POR MORDIDA DE PULGA)

- Ctenocephalum D30, 5 glóbulos 1 vez al día, se puede -- combinar con:
- Anemone pulsatilla D3 - D6 (sabor fresa), 1 vez al día 5 glóbulos.
- Cimicifuga racemosa D3
- Grassollen D30 intercalado con Ctenocephalum, 1 vez al día, 5 glóbulos.
- Ledum D30
- Sulphur acid 10M, 1 dosis para terminar el tratamiento (47)

DERMATITIS POR LAMIDO PSICOGENICO

- Ignatia amara D30, 5 glóbulos, 1 vez al día (48).

DERMATITIS POR LAMIDO PSICOGENICO Y SOMATOGENICA

- Hypericum D30, 5 glóbulos, 1 vez al día (48).

DERMATOSIS Y EXEMAS

- Clophytol, 2 veces al día, 2 a 5 ml subcutáneo por 3 días

DESTRUCTIVIDAD E HIPERSEXUALIDAD

- Tarentula cubensis D6, 3 tabletas, 1 vez al día, después una diaria y luego 3 por semana (48).

DIARREA

- Arsenicum, 2 veces al día 3 gotas (si perro esta triste, con protrusión del recto y hace violentos esfuerzos al defecar)(40).
- Ipecacuahna D4 - D6 y C30.
- Phosphorus
- Argentum nitricum
- Aloe socotrina D4 (apetito feroz persiste después de haber comido, heces amarillentas)(1).
- Clophytol, 2 veces al día de 2 a 5 ml subcutáneo por 3 días (20).
- Chamomilla cada 2 o 3 horas, 3 gotas (dolor entre las evacuaciones).
- Mercurius vivus, 3 a 4 gotas, 3 veces al día (evacuaciones frecuentes, copiosas con sangre)(40).

DIARREA PSICOGENICA

- Nux vomica D30, 1 vez al día y después cada tercer día.
- Ignatia amara D30, 1 vez al día, 5 glóbulos (1).

DISPLASIA DE LA CADERA

- Phosphorus C30, 1 vez al día, lcc subcutáneo y repetir la inyección a los 3 días y dar también:
- Phosphorus 1M, 5 gotas diariamente.
- Primordian Depot de los laboratorios Schering, 1 inyección junto con la de Phosphorus C30 (la última) pa--

ra terminar el tratamiento (42).

DIVERTICULO RECTAL

- Nosoden D10, D15 y D20, cada 3 días por 10 a 14 días y
- Mucosa compositum.
- Nux vomica D6 y
- Carbo vegetabilis D6 (10)

ENFERMEDAD DEL MUSCULO CARDIACO

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días y
- Cralonin y Psorinoheel (10).

ENFERMEDAD DE VEJIGA Y RINON

- Cantharis D4, 2 l 4 veces al día una tableta o 1.0 ml subcutáneo. (Cuando se encuentre eleccado el pH, leu cositosis, albumina eritrocitos y cristales en orina) (curso agudo v subagudo).
- Berberis D4, D6, 1 o 2 veces al día una tableta o 1 ml subcutáneo. (Debilidad, espatis, molestias renales) (curso crónico).
- Mercurius vivus D6, D12, 2 veces al día, una tableta o 1.0 ml subcutáneo (37)

ENPRIAMIENTO (por haberlo bañado)

- Sulphur acie D30, 0.5 ml v der
- Selenium dulcamere D4, 3 veces al día, 5 gotas por 8 o 10 días. (Hipersensibilidad a la luz, lagrimeo, inflamación del nárpico inferior)(8).

EPILEPSIA PARCIAL

- Silicea 30, cada 8 horas una dosis para completar 3 dosis (28).
- Nervosyl, según el peso: para 5 kilos dar 5 gotas, 5 a 10 kg dar 10 gotas y más de 10 kilos dar 20 gotas, mañana y tarde y si es necesario a media mañana. (34).

ESTREÑIMIENTO

- Bryonia alba D4.
- Nux vomica D6, C30.
- Plumbum aceticum D6 (1).

FARINGITIS

- Bryonia alba D4.
- Nux vomica (1).

GANGRENA EN OREJAS

- Heber sulphuris, 2 veces al día, 3 gotas.
- Arsenicum album, 4 granos de la 3a. trituración diluida en 1 onza (28.35g) de agua, 2 veces al día, aplicar 1c en las orejas.
- Carbo vegetabilis, 2 veces al día, 3 gotas (40).

GASTRITIS

- Nux vomica.
- Acidum hydrochloricum D12 (gastritis hiperácida).
- Magnesium phosphoricum D4 (gastritis con cólico).
- Bryonia alba D4 (1).

GRIFE

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días y

- Echinacea compositum (10).

HEPATITIS

- Nux vomica (1).

HEPATOPATIAS

- Glophytol, 2 veces al día de 2 a 5 ml subcutáneos, por 3 días (20).

HIFERSEXUALIDAD

- Mejorana D30, 1 vez al día, 5 glóbulos (1).

INFECCION POR COLIFORMES

- Nosoden D10, D15 y D 20, cada 3 días por 10 a 14 días (10).

INFECCION EN RIÑONES

- Glophytol, 2 veces al día de 2 a 5 ml subcutáneo por 3 días (20).

INFECCIONES VIRALES

- Vincetoxicum
- Engystol
- Echinacea angustifolia (heridas).
- Calendula officinalis (antiflojístico).
- Ipecacuahna (si hay diarrea).
- Veratrum album (si hay diarrea)
- Aloe socotrina (si hay diarrea)
- Rheum
- Podophyllum (2).

INTOXICACION

- Vitamina K con
- Lachesis y
- Mexaformo (debido a insecticida, herbicidas y rodenticidas).
- Nux vomica (intoxicación iatrogénica).
- Plumbum aceticum D12 (intoxicación con metales pesados).
- Lycopodium clavatum D12
- Thallium aceticum (intoxicación por talio).
- Cuprum aceticum (intoxicación por cobre)(2).

LACTACION FALSA

- Nosoden D10, D15 y D20, cada 3 días por 10 a 14 días y
- Ferula asafoetida (10).

LEPTOSPIROSIS

- Nosoden D10, D15 y D20, cada 3 días por 10 a 14 días (10).

METRITIS AGUDA Y CRONICA

- Myron (myrrh, guggul, tharek bhasma y laha bhasma)
3 veces al día, 1 tablete por 15 a 21 días (30).

MIEDO Y DEFECA EN CUALQUIER LADO

- Nux vomica D30, 1 vez al día, 5 glóbulos (48).

MOQUILLO CANINO O DISTEMPER CANINO

- Aconite napellus, cada 2 o 3 horas, tres gotas (fiebre)
- Nux vomica, tres veces al día, 3 gotas (descarga nasal líquida y clara, constipación y vómito).
- Mercurius vivus (ojos pegados en la mañana, descarga nasal profusa densa y olor fétido).

- Arsenicum album, 2 veces al día, 3 gotas (cerebro afectado, espumo en hocico, trata de incorporarse y cae).
- Rhus toxicodendron, 2 veces al día, 3 gotas (comino intestable, ataques de estremecimiento, temblores, espasmos musculares).
- Sulphur acid (cuando la recuperación toma lugar)(40).

NEUMONIA

- Calcium naphellus, 1 dosis primeramente y luego
- Phosphorus 4 gotas o 6 glóbulos cada 1, 2 o 3 horas.
- Atropa belladonna, 4 gotas o 6 glóbulos cada 1, 2 o 3 horas.
- Eryonia alba, 4 gotas o 6 glóbulos cada 3 o 4 horas.
- Terterus emeticus 4 gotas o 6 glóbulos cada 3 o 4 hrs.
- Sulphur acid, 3 veces al día, 6 gotas (40).

OPTALMIA

- Calcium nap., cada 3 o 4 horas, 3 gotas, y después dar
- Euphrasia, 2 veces al día, 4 gotas (si párpado continuo cerrado).
- Atropa belladonna, 3 veces al día, 3 gotas y lavar el ojo con loción de árnica (20 gotas de árnica en 0.5 lt de agua), 2 veces al día.
- Sulphur acid, 2 o 3 dosis (si el ojo no se ha recuperado después de utilizar los remedios anteriores (40).

OSTIIS DE QUIJADA O MANDIBULA

- Mezodon M10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días (10).

PANCREATITIS

- Nux vomica (1).

POLIOMIELITIS

- Nosoden D10, D15 y D20, cada 3 días por 10 a 14 días (10).

FRURITO PSICOGENICO

- Hypericum D30 con
- Sulphur acid D30 y
- Ctenocephalum D30 y
- Blut Harn- Autonosode C15

Si no funciona el tratamiento anterior dar

- Nux vomica D30, 1 vez al día, 5 gotas y
- Mejorana D30, 1 vez al día, 5 gotas (47).

REUMATISMO

- Arnica montana
- Aconitum narellus
- Bryonia alba
- Rhus toxicodendron
- Sulphur acid

Todas las anteriores tienen la misma dosis: 2 veces al día, 3 gotas (40).

SARNA

- Sulphur acid, 1 vez al día, 1 dosis de 3 gotas. Lavar partes afectadas con jabón y agua 1 vez al día y secar con un paño limpio y seco.
Aplicar externamente 2 gramos de Sulphur acid en 4 onzas (1 onza=28.35 g.) de manteca.
- Arsenicum acidum y Mercurius vivus, 1 vez al día (en la noche), 3 gotas (40).

TOS

- Nux vomica, 2 veces al día, 2 o 3 gotas (acompañada de castorreo, se patea la mejilla).
- Mercurius vivus, cada 4 o 6 h, 3 gotas (tos violenta, atacas de estremecimiento).
- Bryonia alba y Atropa belladonna, 2 veces al día, 2 o 3 gotas (cuando la tos perdura después de haber dado los medicamentos anteriores)(40).

TRASTORNO EN EL COMPORTAMIENTO (DEBECA EN CUALQUIER LADO)

- Hyoscyamus niger D30, 1 vez al día, 10 glóbulos por 14 días y luego dar, 5 glóbulos por 14 días.
- Stramonium D6, 3 veces al día, 5 glóbulos (48).

TRAUMATISMO

- Nux vomica D30, 1 vez al día, 5 glóbulos (48).

URTICARIA

- Lasental 2 ml subcutáneos y
- Lachesis D12, 2 veces al día, 5 glóbulos por 1 semana (47)

VAGINITIS

- Myron (myrrh, B. mukul, throck bikam y loha bhesma)
3 veces al día, 1 tableta por 15 a 21 días (30).

VOMITO

- Glycythol, 2 veces al día, 2 - 5 ml subcutáneos por 3 días (20).
- Ignacacahua D4-16 y G30 (sed, anorexia, vómito seguido con estómago vacío)(20).
- Anemone pulsatilla (estómago vacío)(1).

TRATAMIENTO DE GATOS POR HOMEOPATIA

ABSCEOS

- Loción Calendula (1 cucharadita de Calendula tintura madre en media taza de agua caliente) cada 3 horas.
- Tarentula cubensis 30, en intervalos de cada hora.
- Loción Calendula en compresas y aplicarla en abscesos y cubril con vendas.
- Atrona belladonna D6, cada 2 horas.
- Hepar sulphuris D6 cada 2 horas y aplicar.
- Hepar sulphuris unguento para limpiar las descargas (43).

ANEMIA

- Calcium phosphoricum 3x, 3 veces al día (si es producido por una enfermedad aguda).
- Natrum muriaticum 6x, 3 veces al día.
Dar alimento completo y nutritivo y que el animal tome aire fresco (43).

ASMA

- Nosode D10, D15 y D20, cada 3 días por 10 a 14 días (10)
 - Sulphur acid 30, 1 dosis repetir cuando sea necesario.
 - Arsenicum album 30, 1 dosis solamente.
 - Inecacuahna 3, cada media hora (tose y vomita saliva parecida a clara de huevo).
 - Bryonia alba 6, cada 2 horas (si el animal esta sediento).
 - Spongia 1x cada 2 horas (j:des, dificultad al respirar, tos sofocante).
- No repetir la dosis si existe mejoramiento (43).

ATAQUES

- Chamomilla 6, cada 2 horas, por pocos días. Alimentar con dieta ligera (43).

BRONQUITIS

- Aconitum napellus 30, 1 dosis cada 4 horas.
- Rhus toxicodendron 6x, cada 2 horas (debido a humedad)
- Bryonia alba 6x, cada 2 horas (tos seca, animal sediento (43).

CASPA

- Sulphur acid 6, 2 veces al día por algunos días o semanas.
- Natrum muriaticum 6, 2 veces al día por algunos semanas (si se sospecha de parásitos). Se sugiere cambio de dieta (43).

CATARRO (CRONICO)

- Pulsatilla 30, 1 dosis cada 2 o 3 días por un mes de semanas (si el gato se encuentra siempre en un lugar caliente).
- Hepar sulphuris 30, cada 2 o 3 días por algunas semanas (si el gato tiene contacto con aire frío y mejora con aire caliente).
- Silicea 30 por algún tiempo (si los remedios anteriores no producen ningún efecto).
- Esorinum 200, 1 dosis (nariz obstruida, ojos inyectados)
- Teucrium morum 6, 3 veces al día (si gato ha tenido sobredosis sin buenos resultados)(43).

CISTITIS

- Rhus toxicodendron 6, cada 2 horas (orine gotas).
- Apis mellifica 3x, cada 2 horas (micción frecuente e involuntariamente, escasa y coloreada).
- Cantharis 3x, cada 2 horas (deseo frecuente de orinar).
- Terebinthine 3 cada media hora (enfermedad aguda, hema-
turia).
- Thelasma bursa tintura madre, 2 o 3 gotas cada media
hora (cálculos)(43).

COLICO

- Lycopodium D3
- Veratrum album L6 (si hay vómito y diarrea)(1).

COLITIS

- Bryonia alba D4 (1).

CONMOCION CEREBRAL CON VOMITO

- Itecauahna D4-D6 y C30 combinada con
- Arnica montana C30 e
- Hypericum D4 (1).

CONSTIPACION FECAL

- Bryonia alba D4 (1).

DERMATITIS (CUSHING)

- ACTH 30, 5 gotas cada tercer día (47).

DERMATITIS (CON TRICOBREXIS)

- Lycopodium clavatum D30 (47).

DERMATITIS CRONICA (POR MORDIDA DE PULGA)

- Ctenocephalum D30, 1 vez al día, 5 glóbulos, se pueden combinar con:
- Anemone pulsatilla D3-D6 (sabor fresa), 4 veces al día .
- Cimicifuga racemosa D3.
- Grasrollen D30 intercalado con Ctenocephalum.
- Ledum D30
- Una dosis de Sulphur acid 10M (47).

DERMATOMICOSIS (TIÑA)

- Sulfuro de potasio 2 onzas en 3.79 litros de agua.
- Solución de formaldehído al 40% en los lugares donde el animal frecuenta.
- Una dosis de Sulphur acid 200, después de cada baño (43).

DERMATOSIS Y EXEMAS

- Clophytol, 2 veces al día de 1 - 2 ml subcutáneos por 3 días (20).

DIARREA

- Inecacuahna D4 - D6 y C30.
- Arsenicum album
- Phosphorus
- Argentum nitricum
- Aloe socotrina D4 (apetito feroz y persistente después de haber comido, heces amarillentas)(1).
- Clophytol, 2 veces al día, 1 - 2 ml subcutáneos por 3 días (20).
- Anemone pulsatilla 6, cada 2 horas.
- Arsenicum album 3, cada 4 horas (animal deprimido, heces líquidas con sangre). No continuar con el remedio si no hay mejoramiento en 48 horas.

- Mercurius corrosivus 6, cada 4 horas (heces ligeramente marcadas con sangre).
- Phosphorus 3x, cada 2 horas (heces grises o blancas).
- Antimonium crudum 6, cada 2 horas (trozos duros con diarrea).
- Podophyllum 6, cada 2 horas (aguada y amarillenta).
- Chamomilla 6, 2 a 4 horas (heces grises, moco amarillento).
- Solanum dulcamara 6, cada 2 o 3 horas (43).

DIVERTICULO RECTAL

- Nosoden D10, D15 y D20, cada tercer día por 10 a 14 días y Mucosa compositum y
- Hux vomica D6 con Carbo vegetabilis D6 (10).

ECZEMA

- Natrum muristicum 6x, 2 veces al día (causada por dieta y si muestra signos de anemia).
- Arsenicum album 3, 2 veces al día o
- Una dosis de Arsenicum album 30 o 200 y no repetir por una semana (si piel esta arrietada).
- Sulphur acid6, 2 veces al día (piel roja e irritada)
- Sulphur acid 200, 1 dosis.
- Calendula unguento aplicarla en partes irritadas (43).

ENFERMEDAD DEL MUSCULO CARDIACO

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días, junto con los siguientes medicamentos.
- Cralonin y Psorinoheel (10)

ENFRIAMIENTO (POR HABERLO BAÑADO)

- Sulohur acid D30 0.5 ml y
- Solanum dulcamara D4, 3 veces al día 5 gotas por 8 o 10 días. (Hipersensibilidad a la luz, lagrimeo, inflamación del vértigo inferior)(2).

ENTERITIS INFECCIOSA

- Aconitum napellus 30, 2 veces al día por 1 o 2 días (si presenta signos de influenza, aparece en periodo frío y no muestra otros signos).
- Phosphorus 3 y Eryonia alba 3, alternados cada 2 h. por 24 horas. (Vómito, evacuaciones parecidas a clara de huevo, temperatura abajo de lo normal).
- Psorinum 200 (si gato se recupera)(43).

ERUPCIÓN DIENTE

- Calcium phosphoricum 6, 2 o 3 veces al día.
- Loción Calendula (una cucharadita de la tintura madre en la mitad de una taza de agua) en una torunda de algodón y colocarla en la boca (43).

ESTREÑIMIENTO

- Eryonia alba D4.
- Nux vomica D6, C30.
- Fluxum acetikum D6 (1).
- Nux vomica D6 cada 2 horas.
- Eryonia alba D6 cada hora.
- Opium 3, cada 6 horas (heces duras y pequeñas).
- Aceite de oliva en el alimento (43).

FARINGITIS

- Nux vomica.

- Bryonia alba D4 (1).

FRACTURAS

- Arnica montana 6, cada 2 horas (ayuda a superar el - ataque o shock) después dar el siguiente medicamento.
- Symphytum 1x, 3 veces al día (hasta que el hueso este unido).
- Silicea 6, cada 4 horas (hasta que el hueso este fortalecido) o dar el siguiente medicamento.
- Calcium phosphoricum 6, 2 o 3 veces al día (gatitos que no muestran debilidad actualmente).
- Silicea 6 y Calcium phos. 6, alternados cada 3 horas. (Cuando el gatito es delicado y tiene pobre desarrollo óseo)(43).

GANGRENA EN OREJA

- Sulphur 200 internamente y puede repetirse en una semana si la condición lo requiere.
- Tellurium 30 dar una dosis cada 2 o 3 días por un periodo largo (si persisten las descargas de la oreja).
- Limpiar bien la oreja e insertar un poco de Calendula unguento diariamente (43).

GASTRITIS

- Rux vomica.
- Acidum hydrochloricum D2-D4 (gastritis subácida con vómito).
- Acidum hydrochloricum D12 (gastritis hiperácida).
- Magnesium phosphoricum D4 (gastritis con cólico).
- Bryonia alba D4 (1).

GRIPE

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días.
Dar también el siguiente medicamento.
- Echinacea compositum (10).

HEPATITIS

- Nux vomica (1).

HEPATOPATIAS

- Glophytol, 2 veces al día, 1 a 2 ml subcutáneos por 3 días (20).

HERIDAS, CORTADAS

- Arnica montana 6, cada hora y después alargar el periodo de dosis.
- Loción Calendula (1 cucharadita de la tintura madre en media taza de agua).
- Lecum 6, internamente cada 2 horas en lugar de Arnica montana y aplicar externamente Loción Calendula (10 gotas de tintura madre en una copa de agua) (herida - por mordedura o estilla).
- Loción Hypericum (10 gotas en 1 copa de agua).
- Hypericum 6, cada 2 horas internamente (cuando son las cereceraciones, nervio lesionado y dolor fuerte) (43).

ICTERICIA

- Thalictrum majus 6, alternado con Bryonia alba 6 cada 2 horas (vérdida de apetito, constipación, orina - coloreada y poca). Dar alimento en pocas cantidades, - caldo de conejo varias veces al día, leche y agua de soda en partes iguales.
- Sulphur acid 30, 1 dosis en la mañana y otra en la tarde por 2 o 3 días. (Después de la recuperación) (42).

INDIGESTION

- Anemone pulsatilla 6, cada 3 horas (si hay diarrea).
- Carbo vegetabilis, Nux vomica 6, después de la comida por 1 semana o dos (43).

INFECCION POR COLIFORMES

- Nosoden D10, D15 y D20 cada tres días por 10 a 14 - días (10).

INFECCION EN RIÑONES

- Glophytol 1 o 2 ml subcutáneos, 2 veces al día por 3 días (20).

INFECCIONES VIRALES

- Vincetoxicum
- Engystol
- Echinacea angustifolia (heridas).
- Calendula officinalis (antiflojístico).
- Inecacuahna (si hay diarrea).
- Veratrum album (si hay diarrea).
- Aloe socotrina (si hay diarrea).
- Rheum (si hay diarrea).
- Podorhyllum (si hay diarrea) (2).

INFLUENZA FEBRIL

- Sulphur acid 30, 2 veces al día (hasta que temperatura descienda).
- Gelsemium sempervirens 30, cada 4 horas (estornudos, rechazo al alimento, descargas nasales acuáticas).
- Aconitum napellus 30, cada 4 horas (signos se presentan después de una exposición al tiempo frío o húmedo y se descubre a tiempo). No continuar con él en el término de 24 horas si no hay mejoría.

- Atropa belladonna (ojos inflamados, sensibles a la luz)
- Bryonia alba 3, alternada con Phosphorus 3 cada 2 h.
(Dificultad para respirar, tos seca y animal sediento).
Si no hay mejoría alargar el periodo de dosis.
- Arsenicum album 30x, cada 4 horas, 3 dosis solamente.
(Animal rostrado, diarrea y lengua roja).
- Baptisia 3x, cada hora (lengua presenta una apariencia
seca y oscura con bordes rojos, animal postrado).
- Pyrogen 30, una dosis (en gatitos moribundos).
- Phytolacca 30, cada 4 horas (babeo, garganta roja y -
dificultad al respirar)(43).

INTOXICACION

- Vitamina K con
- Lachesis y
- Mexaformo (debido a insecticidas, herbicidas y roden-
didas).
- Nux vomica (intoxicaciones iatrogénicas).
- Plumbum aceticum D12 (intoxicación con metales pesa-
dos) y Lycopodium D12.
- Thallium aceticum (intoxicación por talio).
- Cuprum aceticum (Intoxicación por cobre)(2).

LACTACION FALSA

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días,
junto con el siguiente medicamento.
- Perula asafoetida (10).

LEPTOSPIROSIS

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días (10).

METRITIS AGUDA Y CRONICA

- Myron (Myrr, suggul, thrak bhasma y laha bhasma) (30).

NEFRITIS

- Aconitum napellus 30 (caso agudo).
- Arsenicum album 30 (crónico). No repetir hasta que los signos vuelvan a presentarse (43).

NEUMONIA

- Aconitum napellus 30, cada hora, 3 dosis solamente. (Animal triste, deja de comer y presenta fiebre).
- Bryonia alba 30, alternada con Phosphorus 3, cada 2 horas, si no hay mejoría con los anteriores, después de 12 horas. Quitar al animal de corrientes, llevarlo a un lugar comodo y tibio (43).

OBSTRUCCION INTESTINAL (BOLA DE PELO)

- Petroleo o aceite de oliva, una vez a la semana, una cucharadita, durante la estación hasta desaparecer la bola de pelo.
- Sulphur 30 (43).

OJOS (INFECCION, INFLAMACION)

- Loción Calendula officinalis (5 gotas de Calendula tintura madre en una copa de agua), 3 veces al día lavar el ojo.
- Arnica montana 6, tres veces al día (internamente) en infecciones leves.
- Influenzinum 30, cada dos o tres días y lavar el ojo con Loción Calendula (en influenza).
- Aconitum napellus 30, una dosis (inflamación temporal

a causa del viento).

- Loción Euphrasia (10 gotas de tintura madre de Euphrasia en una copa de agua caliente), lavar el ojo tres o cuatro veces al día (si es causado por polvo).
- Calendula unguento, después del tratamiento anterior (si los párpados se encuentran pegados).
- Saline (una cucharadita de sal en 0.57 litros de agua), lavar los ojos si estos se encuentran sucios.
- Silicea 6, dos o tres veces al día por algunas semanas seguido de Silicea 30, 2 veces al día (gatitos que reciben constantemente viento en los ojos)(43).

OSTITIS DE MANDIBULA

- Nosoden D10, D15 y D20, cada tres días durante 10 a 14 días (10).

OVARIECTOMIA

- Arnica montana 6, 2 o 3 veces al día después de la cirugía.
- Loción Calendula (10 gotas en una copa de agua), mojar la gasa y colocarla sobre la cicatriz (43).

PANCREATITIS

- Nux vomica (1)

PARALISIS

- Nux vomica (si es producida por constipación y existe presión en los nervios).
- Aceite de oliva (43).

PARASITOSIS

- Chenopodium \emptyset en forma de pildora en la mañana y en la noche por unas semanas y después dar:
- Una dosis de Cina 200, la cual puede repetirse en una semana (Nematelmintos).
- Filix mas 3x, dos veces al día por algunas semanas y al final del periodo dar una dosis de Filix mas 200. (Platelmintos).
- Mercurius corrosivus 6, 2 veces al día por una semana. Animal presente heces con sangre. (Platelmintos)
- Natrum phosphoricum 6x, dos veces al día por algunas semanas (43).

PIOJOS

- Sulphur 200, repetir la dosis cada semana o tres.
Fumigar los lugares donde se encuentre el animal (43).

POLIOMIELITIS

- Nosoden D10, D15 y D20 cada 3 días por 10 a 14 días (10)

PRURITO PSICOGENICO

- Hypericum D30
- Sulphur acid D30
- Ctenocéphalum D30
- Blut Harn-Autonosome, si no funciona dar el siguiente medicamento.
- Nux vomica D30, una vez al día, 5 gotas con Mejorana D30, una vez al día, cinco gotas (47).

PULGAS

- Dar una dosis de Sulphur acid 200, repetir la dosis cada semana o tres.
Fumigar puertas y lugares donde frecuente el animal,

repetir cada 10 días o semana (43).

QUEMADURAS Y HERIDAS

- Urtica urens 30, puede retirarse en 2 o 4 h. si muestra dolor y aplicar un pedazo de tela (lana-algodón) caliente en el área quemada (quemadura 1er. grado).
- Urtica urens ϕ , 1 cucharadita ex. 0.57 l de agua, aplicar localmente o 20 gotas ex. 1 taza grande de agua cubrir con gasa y venda. Retirar el pedazo de tela cuando el vendaje este seco. Remover con una gota de loción.
- Urtica urens (si es superficial la quemadura o herida)(43).

RAQUITISMO

- Silicea 200 1 dosis, puede retirarse si es necesario a la semana o tres semanas. (Gato bajo de talla, delgado, indefenso)
 - Calcium phos. 3x en cada comida
 - Calcium carbonicum 30 cada 2 o 3 días por un periodo de 3 semanas (gato mameoso, con mucho grasa o gordo)
- Dar una buena dieta balanceada para los gatitos y hembra cruda suplementar más el alimento (43).

RESFRÍADO

- Acoritum navelius 30, 1 dosis cada 4 h (3 dosis si persiste)
- belli iod. 1x cada 2 horas alternado con
- Atrona bellezona 1x (si signos son marcados y no hay mejoramiento)
- Gelsemium 0, 3 veces al día (si estornuda mucho)
- Lycopodium 0, 3 veces al día (si estornuda)

REUMATISMO

- Rhus toxicodendron 30 alternado con
- Ervonia alba 30
- Urtica urens \emptyset 5 gotas en 1 onza (31.10 g) de agua caliente con 8 horas (si no existe respuesta con las anteriores)(43)

SARNA

- 2 onzas (1 onza= 31.10 g) de sulfuro de potasio en 1 galón(3.765 l) de agua y bañarlo.
- Solución de formaldehído 40% para rociar los lugares donde se encuentra el animal.
- Sulphur acid 30, 1 dosis, cada después de cada baño (43).

SOPORIFICIO, ASFIXIA, OBSTRUCCION

- Arnica montana 6, una dosis (ayuda el sistema después de haber vitado el objeto)(43).

TOS

- Ervonia alba 6, cada 2 horas.
- Arsericum album 6, 3 veces al día (tos seca o espasmódica)
- Cine 3, cada 4 horas (tiene nervietos o gusanos)(43)

TUBERCULOSIS

- Bacillinum 30, 1 dosis cada semana por algunas semanas (43)

TUMORES

- Phytolacca 30, 2 veces al día (mañana y noche) por pocos días (tumor benigno de glándula mamaria)(43).

URTICARIA

- Iaseptal 2 ml subcutáneos y Lachesis D12, dos veces al día, 5 glóbulos por una semana (47).

VAGINITIS

- Myron (Myrrh, guggul, thrak bhasma y laha bhasma), - 3 veces al día una tableta durante 15 a 21 días (30).

VOMITO

- Ipecacuahna D4 - D6 y C30
- Anemone pulsatilla (1).
- Clophytol 1 a 2 ml subcutáneos, dos veces al día por tres días (20)
- Ipecacuahna 6, tres veces al día (mala digestión).
- Chelidonium majus 3, cada tres horas (vomitan y muestran signos catarrales ligeros).
- Natrum sulphuricum 30, diariamente (signos estan más marcados en época húmeda)(43).

TRATAMIENTO DE AVES CON HOMEOPATIA

APTAS, AMPOLLAS EN PICO

- Sulphur acid 6a a 12a c, cada 2 días, 5 glóbulos administrados en un pan con agua pura (35).

CORIZA

- Mercurius vivus 15c
 - Sulphur acid 15c
- Alternados cada día y 3 glóbulos al día (35).

DESCENSO OVARICO

- Mercurius vivus 6c, 7 glóbulos, repetir si se requiere, darlo en pan humedecido en agua pura (35).

DIARREA

- Arsenicum 6c, 3 glóbulos en pan por 2 o 3 días.
- Chemomilla 6c, 3 glóbulos en miga de pan por 2 o 3 días.
- Administra alimentación seca. (35).

EMASIACION, DEBILIDAD

- Cannabis sativa 6c, 3 glóbulos en la mañana y tarde hasta curación (35).

ENTERITIS

- Aconitum napellus 6c, 3 veces al día 4 glóbulos. Palomas y pájaros:
- Aconitum napellus 6c, 4 o 5 glóbulos disueltos en 2 cucharadas de agua y que se tomen 9 gotas diarias por 3 días (3 gotas en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche)(35).

ESTREÑIMIENTO

- Nux vomica 6a.c, 2 veces al día 3 glóbulos en pan por 3 días (mañana y tarde)(35).

GOT:

- Rhus toxicodendron 6a. c, 1 glóbulo disuelto en 2 - gotas de agua por 2 días (majerillos). En aves gran des dar 2 glóbulos secos.
- Aconitum napellus- Bryonia alba 6a.c; 3 glóbulos en pan por 4 días alternando con Rhus toxicodendron (35).

INFLAMACION DEL BUCHE

- Aconitum napellus 6a. c, 1 glóbulo seco o disuelto en 3 gotas de agua. 1 gota en la mañana y otra por la - tarde en aves pequeñas. 2 glóbulos en seco o disueltos (aves de corral), repetir dosis 2 o 3 veces por día si es necesario (35).

MULA

- Aconitum napellus y China 6a.c, alternados 2 días uno y otros 2 días el otro. 1 glóbulo disuelto en 2 o 3 gotas de agua. En aves de corral dar 2 glóbulos en pan por 8 días (35).

FUSIULAS

- Solanum dulcamara y Sulphur scic 6a. c, alternados - cada día uno, 3 glóbulos hasta que desaparezcan (35).

TOS

- Cina 3a. c, 3 glóbulos por la mañana y después de 2 horas dar 1 cucharadita de aceite de olivo (35).

VERMINOSIS

- Delphinium staphisagria (cocción) y bañar.
- Sulphur acid 15a. 3 glóbulos (35)

VERTIGO

- Aconitum napellus 6a., 3 glóbulos por día (35).

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Es evidente que la presentación de los datos referentes a la homeopatía, deja en el lector un sentimiento de vaguedad y falta de método científico. Sin embargo, es factible - hacer énfasis en este peculiar sentimiento se debe a la disciplina en sí y no a la metodología o la exposición de este ensayo. Un hecho es ineludible, la homeopatía si funciona y esto lo demuestran los múltiples informes de la literatura especializada. Por esta razón se puede admitir la actitud de que no debe importar lo bizarro de una disciplina médica, si ofrece alternativas de eficacia reconocida y se examina del hombre para la cura de sus males o la de sus animales debe estudiarse y en su caso validarse.

Es quizá en este último punto de validación donde el presente trabajo tenga mayor aplicación. Esto es, en este caso el clínico podrá someter a evaluación los diferentes tratamientos propuestos por la literatura y de esta manera agregar racionalidad científica.

Un aspecto relevante y contradictorio de la disciplina homeopática en medicina veterinaria afecta la estructura misma del presente ensayo. Para los homeópatas un medicamento debe prescribirse para curar a un individuo y no para tratar una enfermedad. De esta manera es posible que un medicamento como la Bryonia resulte útil para una amigdalitis, dolor reumático, etcétera, en un individuo y que no tenga efecto alguno en otro aparentemente con la misma enfermedad. Esto explica en función de que cada individuo tiene características peculiares en lo que respecta a su forma de ser, hora del día en que se ve más afectado, la lateralidad de su afección, su biotipo y otros muchos factores. Es evidente que en animales

domésticos no es posible considerar estos factores y por ello a diferencia de lo que se estilaba para seres humanos la tendencia es establecer una correspondencia entre enfermedad y medicamentos (17,19). Sin embargo en atención a este punto - algunos artículos (26, 33, 34) llegan a presentar distinciones adicionales considerando la edad, sexo, raza, temperamento. Sin embargo la medida del carácter de un animal tiene una connotación antropomorfa y por lo tanto de juicio dudoso.

Así en animales resulta más práctico y congruente intentar tratamientos de grupo y diferenciar con el tiempo los medicamentos que mejor se aneguen a la psicología de una perra, perrada, hato.

En el desarrollo de este trabajo y quizá para el desarrollo de esta disciplina en el área veterinaria se puede asegurar que uno de los mayores obstáculos es de la obtención de la información. El 86% viene en idiomas extranjeros, especialmente Alemán, Francés e Inglés y están publicados en revistas periódicas que no se encuentran en México. Si la validación - clínica de los métodos homeopáticos lo justifica y las universidades del país contemplan su incorporación al campo veterinario resultará imprescindible el establecimiento de canales de obtención de la información mencionada ya que existen tesis doctorales y de maestría en diferentes partes del mundo.

No es posible establecer de momento un análisis comparativo de la eficacia entre la medicina Ortodoxa y la medicina Homeopática. Empero, la constatación de los resultados informados en la literatura permitirá llevar a cabo un análisis - de costo beneficio y porcentaje de eficacia de ambas medicinas. De cualquier manera la medicina homeopática ofrece recursos terapéuticos para problemas que no tienen solución.

con la medicina ortodoxa tal es el caso de lesiones de columna donde se indica Rhus toxicodendron, Ervonia alba, Arnica montana (6), las lesiones de índole emotivo en las que se indica Ignatia amara (6) y otros casos que añaden a la homeopatía su carácter tan distintivo.

LITERATURA CITADA

- 1) Burgerd, H.: Digestive disorders in small animals and their homeopathic treatment. Prakt. tierarzt, 161: 108-113 (1980).
- 2) Burgerd, H.: Digestive disorders of alimentary and infectious aetiologi and their treatment by the homeopathic veterinarian in small animal practice. Biol. tiermedizin, 4: 2-13 (1987)
- 3) Chief, R.: Guía de Plantas Medicinales. Grijalbo, Madrid, España, 1983.
- 4) Day, C.E.: Control of still births in pig using homeopathy. Vet. Rec., 114: 216 (1984)
- 5) Díaz, J.L.: Índice y sinonimia de las plantas medicinales de México. Instituto Mexicano para el estudio de las plantas medicinales, A.C., México, D.F., 1976.
- 6) Fernández de Lara L.: Homeopatía familiar. Imprenta de J.I. Muñoz, México, D.F., 1932.
- 7) Fischer, O.: Liver disease in cattle (homeopathy treatment). Prakt. tierarzt., 63: 12-14 (1982)
- 8) Fischer, O.: Causel homeotherapy in small animal practice. Prakt. tierarzt., 66: 562 (1985).
- 9) Frerking, H.: Possibilities and limits of treatment of liver diseases in cattle. Prakt. tierarzt., 66: 133-135 (1985).
- 10) Gatz, H.: Experiences with Nosoden in small animal practice. Biol. tiermedizin., 4: 14-17 (1987).
- 11) Greiff, W.: Homeopathy as sale and supplementary treatment of chronic blood in cattle. Tierarztl Umsch., 37: 647-650 (1982).
- 12) Greiff, W.: Homeopathy for cardiovascular disorders, particularly in cattle. Tierarztl. Umsch., 37: 865-866 (1982).
- 13) Greiff, W.: Gastrointestinal diseases in cattle (and homeo

- pathic treatment). Prakt. tiererzt. 63: 14-16 (1982)
- 14) Greiff, W.: Homeopathy in veterinary medicine as mass treatment for cattle. Tiererztl. Umsch., 39: 32-34. 38-39 (1984).
 - 15) Greiff, W.: Urogenital disorders in cattle. (Homeopathic treatment. Tiererztl. Umsch., 40: 364-368 (1985).
 - 16) Greiff, W.: Observations and investigations on the therapeutic efficacy of the homeopathic remedy "Flor de Piedra D3" in cattle and swine. Prakt. tiererzt., 56: 549-552, 554-558 (1985).
 - 17) Greiff, W.: Nature cure and veterinary medicine. Prakt. tiererzt., 57: 761-762, 765-778 (1986).
 - 18) Hahnemann, S.: Organón de la Medicina. Imp. y Linctivos "El Corvenir", Mérida, Yuc., 1929.
 - 19) Hapke, H.J.: Homeopathy and pharmacology. Prakt. tiererzt. 61: 94-99 (1980).
 - 20) Hausmann, G.: Use of Ononhytol in small animal practice. (Extract of leaves of artichoke, *Cynara scolymus* L.). Prakt. tiererzt., 57: 962 (1986).
 - 21) Hayagreeva R.B. and Sreemannarayana C.: Economical treatment of corneal opacity in bovines. Live Stk. Adviser., July (1981).
 - 22) Krüger, H.: Homeopathic therapy of colic in the horse. Tiererztl. Umsch., 37: 780-790 (1982).
 - 23) Krüger, H.: Homeopathy differential therapy of heart diseases in the horse. Prakt. tiererzt., 63: 18-21 (1982).
 - 24) Kumar, A., Tanwar, R.L. and Yadavj: treatment of bovine papillomatosis with some homeopathic drugs. Indian J. Vet. Rec., 4: 87-89 (1984).
 - 25) Lewoni, N.: Effect and efficacy of homeopathic drugs in veterinary medicine. Prakt. tiererzt., 66: 541-548 (1985).
 - 26) Maclean, G.: The treatment of horses by homeopathy.

- Clarke Doble & Brandon Ltd., Great Britain, 1977.
- 27) MD.: *Similia similibus*. M.D. en Español. Vol VIII: 129-146 (1970).
 - 28) Nunn, R.J.: Homeopathic treatment of partial epilepsy. Vet. Rec., 114: 24 (1984).
 - 29) Otto, H.: Experiences with homeopathic treatment of acute parenchymatous mastitis in cows. Tierärztl. Umsch., 37: 732-734 (1982).
 - 30) Pal, M.: Observations on the efficacy of Myron in the genital disorders of dog and cats. Indier. Vet. J., 56: 625-626 (1979).
 - 31) Peker, J.: Veterinary homeopathy. Prat. méd. chir. anim. comarcnie., 18: 71-72 (1983).
 - 32) Peker, J.: Prescription in veterinary homeopathy. Prat. méd. chir. anim. comarcnie., 16: 72-73 (1983).
 - 33) Peker, J.: Homeopathic remedies for convulsions and epilepsy in net animals. Prat. méd. chir. anim. comarcnie., 16: 69-72 (1983).
 - 34) Peker, J.: Behavioural disorders in net animals. Homeopathic treatment with Nervosyl. Prat. méd. chir. anim. comarcnie., 21: 399-400 (1986).
 - 35) Fellico, R.: Manual veterinario homeopático del ganadero. P. Olmedo, México, 1985.
 - 36) Pérez, G.H.: Catecismo de la Doctrina Homeopática. P. Olmedo, México, 1981.
 - 37) Rakow, R.: Possibilities for homeopathic therapy of bladder and kidney disorders in dogs. Prakt. tierarzt., 66: 136-141 (1985).
 - 38) Rakow, R.: Postoperative bone and soft tissue degeneration in cattle. Prakt. tierarzt., 62: 18-21 (1981).
 - 39) Rogers, P.A.: Alternative veterinary medicine. Vet. Rec., 114: 326 (1984).

- 40) Rush, J.: The hand-book to Veterinary Homeopathy, 7th. German Edition, Indian Books & Periodicals syndicate, New Delhi, 1963.
- 41) Sanfovel, L.G.: Farmacopea Homeopática Mexicana. Propulsora de la Homeopatía S.A., México, 1961.
- 42) Senczek, D.: Homeopathic therapy of hip dysplasia. Prakt. tierarzt., 65: 741 (1984).
- 43) Sheppard, K.: The treatment of cots by homeopathy. Health Science Press, Great Britain, 1960.
- 44) Stanek, C.: Contribution to the history of veterinary - homeopathy. Samuel Hahnemann and the first generation of veterinary homeopaths. (1829-1840)I. Prakt. tierarzt., 63: 910-912 (1982).
- 45) Stanek, C.: Contribution to the history of veterinary - homeopathy. Samuel Hahnemann and the first generation of veterinary homeopaths. (1829-1840)II. Prakt. tierarzt., 63: 1001-1006 (1982).
- 46) Thejomoorthy, P., Natarajan, R. and Selvasubramanian, S.: Pharmacological evaluation for R-compound and Amukkura choornam for antiinflammatory activity. Indian Vet. J., 67: 548-552 (1986).
- 47) Westerhuis, A.H.: Skin diseases in small animal practice (with case report). Tierarztl. Umsch., 38: 639-650 (1983)
- 48) Westerhuis, A.H.: Practical studies on the homeopathic - treatment of some behavioural disorders in the dog. -- Tierarztl. Umsch., 41: 408-417; 468-493; 556-560; 677-682. (1986).
- 49) Wiest, J.: Homeopathy in functional disorders. Disorders of perinatal phase in swine. Tierarztl. Umsch., 40:366, 371-378 (1985).
- 50) Wiest, J.: Mastitis-metritis-agalactia syndrome of sows (homeopathy). Tierarztl. Umsch., 40: 374-375 (1985).

- 51) Wiest, J.: Oedema disease of piglets (homeopathic). Prakt. tierarzt., 66: 558-559 (1985).
- 52) Wiest, J.: Internal diseases with effect on the muscle - skeletal system of swine. (Homeopathic treatment). Prakt. tierarzt., 66: 559-561 (1985).
- 53) Wolter, H.: The homeopathic preparation "Flor de Piedra D3" in acetonaemia in cattle. Prakt. tierarzt., 60: 289-306 (1979).
- 54) Wolter, H.: Homeopathy integration or alternative?. Prakt. tierarzt., 61: 113-116 (1980).
- 55) Wolter, H.: Homeopathy (an introduction). Tierarztl. Umsch. 37: 574-580 (1982).
- 56) Wolter, H.: Homeopathic treatment of limb bone diseases in the horse. Tierarztl. Umsch., 40: 355-362 (1985).