

11202  
6  
24

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA

"ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD  
EN DOS GRUPOS DE MEDICOS RESIDENTES: ANESTESIOLOGIA  
Y MEDICINA INTERNA"

DRA. MARINA CASTAÑEDA GARCIA

DRA. MARTHA VILLEGAS HERRERA

PSICOLOGA MA. LUISA TREVINO P.

FALLA DE ORIGEN

HOSPITAL ESP.



Secretaría de  
Educativa e Investigación  
PUEBLA, PUE.

*Truco*  
11-1-90

1990



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**CONTENIDO**

**PAGINA**

**TITULO**

**INTRODUCCION.....1**

**MATERIAL Y METODOS.....3**

**RESULTADOS.....4**

**DISCUSION.....30**

**CONCLUSIONES.....31**

**BIBLIOGRAFIA.....32**

El proceso de la personalidad se integra por una interacción que no se logra automáticamente, sino por el resultado de una transformación que ocurre a pequeños pasos, como alternativas de solución de conflictos. Conflictos que ocurren entre los im pulsos propios del hombre sobre bases biológicas, pero que han sido modificadas por la cultura, las demandas, impulsos e in tereses de otros individuos, con los cuales convive en una in terrelación ineludible.

Cada cultura o grupo étnico tiene una personalidad caracterís tica que es el conjunto particular de objetivos, ideales y ma neras de interactuar entre sus miembros. De esto se deduce - que cada cultura tiene sus propios márgenes de variabilidad, lo cual permite que dentro de ciertos márgenes los sujetos - puedan seleccionar aquello que es afín a sus intereses; con cientes e inconcientes.

Los factores que influyen en la integración de la personale dad del individuo, marcan la dirección de sus actividades fu turas y son el factor primordial en la elección de una profe sión. Del acierto con que dicha selección se haga, depende - la satisfacción o frustración del sujeto, así como su éxito o fracaso como factor productivo en la sociedad en la que vi ve y actúa.

El Médico como cualquier otro individuo, tiene ante sí mismo una gran responsabilidad en relación con los aspectos relati vos a su personalidad.

arios autores relacionan la autoevaluación de ciertas características personales con la búsqueda de ciertos satisfactores o necesidades primarias tanto como secundarias. Desafortunadamente en la mayor parte de las instituciones encargadas de la formación y el adiestramiento de médicos especialistas no existen criterios definidos de selección de candidatos, por lo que la decisión personal puede considerarse la regla. Decisión que no siempre es la correcta. Esto produce efectos negativos en el buen desempeño de la profesión y si aunamos situaciones complejas, tanto económicas como sociales y culturales, notaremos con mayor claridad, médicos con demasiada inestabilidad e impaciencia, así como un pobre control de sí mismos.

Estudios previos han tratado de definir rasgos o características de personalidad comunes en ciertos grupos médicos, a través del empleo de ciertos métodos psicológicos; 1, 2, 3.

Los objetivos de estos estudios se han orientado a identificar aspectos vocacionales, intereses, actitudes, adaptación emocional, rasgos sociales e incluso rasgos patológicos.

El propósito del presente estudio fue conocer y describir la personalidad del médico residente de Anestesiología comparándolo con el residente de Medicina Interna, en base a estudios realizados por el Dr. Bretón Marquez, el Dr. Flores Maldonado y el Dr. José Osorio Olivares; 1, 2, 3. Estos estudios se reali

zaron en grupos de residentes de Anestesiología, cirugía General, Medicina Interna y Gineco-obstetricia.

MATERIAAL Y METODOS:

En el presente estudio se empleo el inventario de la personalidad de Douglas N. Jackson, el cual consta de 300 reactivos divididos en 15 escalas de 20 reactivos cada una, constituidos en 10 afirmativos y 10 negativos. Las respuestas se marcan como "verdadero" o "falso". La calificación se efectuó por medio de plantillas, en primer lugar las escalas que se refieren a las diferentes necesidades, que mostraron en perfil psicológico de los grupos estudiados, en segundo la escala que midió el grado de confiabilidad en las respuestas al inventario. Las escalas medidas por el inventario de Douglas son: I Necesidad de logro; II Necesidad de afiliación; III Necesidad de agresión; IV Necesidad de autonomía; V Necesidad de dominación; VI necesidad de resistencia; VII Necesidad de exhibicionismo; VIII Necesidad de evasión; IX Necesidad de impulsividad; X Necesidad de interés por los demás; XI Necesidad de orden; XII Necesidad de humorismo; XIII Necesidad de reconocimiento social; XIV Necesidad de conocimiento intelectual; XV Escala de verdad. Este inventario de la Personalidad fue modificado en 1980 por el Dpto. de Psicología del Centro Médico Nacional del IMSS con el fin de adaptarlo a las características del Médico mexicano que ingresa a la Institución. Esta adaptación resume los resultados obtenidos por el inventario en 9 rangos;

- 1.- Inferior
- 2.- Deficiente
- 3.- Subnormal
- 4.- Normal bajo
- 5.- Normal medio
- 6.- Normal alto
- 7.- Superior al termino medio
- 8.- Superior
- 9.- Brillante.

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional de Especialidades Puebla. Se incluyeron 27 residentes; 15 de Anestesiología y 12 de Medicina Interna. Los residentes de Anestesiología fueron el 100%, de los cuales 3 fueron mujeres y 12 varones, con edades que fluctuaron entre 29 y 40 años con una mediana de 30. De los residentes de Medicina Interna se tomo un grupo de 12 de un universo de 18, las edades fluctuaron entre 27 y 30 años con una media aritmética de 27.5 años. A los dos grupos se les aplico el Inventario de la personalidad de Douglas y se les realizo la Adaptación correspondiente.

#### RESULTADOS:

##### ESCALA I: Necesidad de Logro:

Esta escala mide la necesidad de vencer obstáculos, esforzarse para hacer algo difícil, de alcanzar ciertas metas tan bien y tan rápido como sea posible. El sujeto se puede considerar: motivado, industrial, con afán de logro, emprendedor, productivo, hábil, competidor.

En esta escala encontramos resultados en 3 de los rangos: el mayor porcentaje se encontro en el rango normal medio con el 48.14%. El total absoluto en este rango fue de 13 residentes de los cuales el 61.5% lo representan los de Medicina Interna y el 38.5% los de Anestesiología. El siguiente rango en el que se encontraron resultados fue normal bajo con un 37.00%, y normal alto con un 14.83%. Cuadro y gráfica 1.

#### ESCALA II NECESIDAD DE AFILIACION:

Esta escala mide la necesidad del sujeto de afiliarse, asociarse con otra persona o personas, ya sea para un esfuerzo cooperativo, por compañerismo, satisfacción sexual o amor.

Las características de este sujeto: obsequioso, leal, cariñoso, amigable, de buen carácter, buen compañero, cooperativo, hospitalario, sincero, de buena voluntad.

En esta escala se encontraron resultados en 6 de los rangos; con un mayor porcentaje en el de normal alto con un 37.06%, seguido de normal medio con un 29.62%, normal bajo con 21.22% y los rangos subnormal, inferior y superior al término medio con un 3.70% respectivamente. De los 10 residentes que representan la totalidad en el rango normal alto el 60% son de Anestesiología y el 40% de Med. Int. Cuadro y Gráfica II.

#### ESCALA III NECESIDAD DE AGRESION:

Esta escala mide la necesidad de ofender, dañar o acusar, ridiculizar maliciosamente a una persona u objeto. Castigar severamente



ramente. Sadismo. El sujeto: Goza combatiendo y discutiendo es fácilmente irritable; algunas veces desea ofender a la gente para lograr un desco; puede vengarse de la gente de quien persibe que lo ha dañado. Agresivo, arrogante, irritable, amenazador, hace menos a los demás, se enoja fácilmente, hostil, vengativo.

En esta escala encontramos resultados en 5 de los rangos, representando el de normal bajo el mayor porcentaje 48.14%, este rango con un total absoluto de 13 residente de los cuales Anestesiología representa el 61.5% y Medicina Int. el 38.5%. En normal medio se encontró junto con el rango subnormal un 18.55%, en el inferior con un 7.40%. Cuadro y gráfica III.

#### ESCALA IV NECESIDAD DE AUTONOMIA:

Esta escala mide la necesidad de trabajar, de dirigir o controlar uno mismo sus propias acciones o conducta. Libertad de gobernarse por sus propias leyes. Resistir influencia o cohesión. El sujeto tiene los siguientes adjetivos: goza siendo libre, puede rebelarse cuando tiene restricciones, desafía la autoridad, lucha por la independencia, rebelde, independiente, no manejable, seguro de sí mismo. Individualista.

En esta escalase encontraron resultados en 5 de los rangos; normal medio con un 29.62%; de los cuales el 62.2% lo representan los residentes de Anestesiología y el 37.8% los de Med. Int. En el rango normal bajo se encontró también un 29.62%,

ESCALA V NECESIDAD DE DOMINACION:

Esta escala mide la necesidad de influir o controlar a otros, restringir, persuadir, prohibir, organizar, manipular la conducta de los demás. El sujeto intenta controlar el medio ambiente, dirigirá a otras personas, goza el papel de líder.

En esta escala encontramos resultados en 5 de los rangos: En normal alto el mayor porcentaje 44.45% del cual el 66% es de residentes de Medicina Interna y el 34% de Anestesiología. En normal bajo un 22.22% con un 83% de Anestesiología u un 17% de Med. Int. En el rango normal medio encontramos un 11.11% al igual que en subnormal con un 66% de residentes de Anestesiología y un 34% de Med. Int. Cuadro y gráfica V.

ESCALA VI NECESIDAD DE RESISTENCIA:

Esta escala mide la necesidad de tolerar dolor o adversidad, o persistir en una línea de acción a pesar de las adversidades. Ser estoico, tener fortaleza física y moral. El sujeto desea trabajar largas horas, no se rinde fácilmente, persevera aún en presencia de una gran dificultad. Paciente e inflexible en sus hábitos de trabajo. Firme, constante, enérgico.

En esta escala encontramos resultados en 4 de los rangos: normal medio con un 25.92%, del cual el 85% son residentes de Anestesiología y 15% de Medicina Int. Normal alto también con un 25.92% del cual el 57% son residentes de Med. Int.

y el 43% los de Anestesiología. En el rango normal bajo encontramos un 29.65% con un 50% para cada grupo. Cuadro y gráfica VI.

ESCALA VII NECESIDAD DE EXIBICIONISMO:

Esta escala mide la necesidad de atraer, excitar, seducir, conmovir, divertir, entretener a otros, adquirir seguridad mediante el logro de la atención de otros. El sujeto desea ser el centro de la atención, puede gozar siendo dramático o chistoso. Exhibicionista, ostentoso, no modesto, pretencioso.

En esta escala encontramos resultados en 6 de los rangos: Normal alto con el mayor porcentaje: 37.01%, con un 50% de cada grupo, en normal medio 29.65% con 75% de Anestesiología y 25% de Med. Int.. En normal bajo un 14.81%, el 75% de Anestesiología y 25% de Med. Int., en superior al ter. medio un 11.13% con un 66% de Anestesiología y un 34% de Med. Int. en subnormal e inferior un 3.79% respectivamente. Cuadro y gráfica VII.

ESCALA VIII NECESIDAD DE EVASION:

Mide la necesidad de evitar o huir del peligro, de aquellas situaciones o personas que de algún modo causan inseguridad; temen al daño, enfermedad o muerte; evita riesgos o daño al cuerpo, busca maximizar su seguridad personal. Temeroso.

En esta escala se encontraron resultados en 3 de los rangos

con un mayor porcentaje en normal bajo con un 48.16% del total del cual los residentes de Anestesiología representan el 61% y los de Med. Int. el 39%. En el rango normal medio encontramos en 29.62% con un 75% de Anestesiología y un 25% de Med. Interna, en normal alto se encontró un 22.22% representado por un 83% de Anest. y un 17% de Med. Int. Cuadro y gráfica VIII.

ESCALA IX NECESIDAD DE IMPULSIVIDAD:

Esta escala mide la necesidad de actuar sin deliberación o de reaccionar inmediatamente, aunque sin reflexión ante una situación. Conducta espontánea. El sujeto tiende a actuar de repente al momento, de inhibido, descuidado, impulsivo, hábil, rápido, impetuoso.

En esta escala se encontraron resultados en 6 rangos a saber: En normal medio y alto un 29.65% del total con un 50% de cada grupo, en normal bajo un 22.22%, representado por el 83% de Anestesiología y un 17% de Med. Int. En el rango subnormal un 11.11% con un 66% de Med. Int. y un 34% de Anest. en el rango inferior y superior al término medio un 3.70% cada uno. el 100% de Anestesiología. Cuadro y gráfica IX.

ESCALA X NECESIDAD DE INTERES POR LOS DEMÁS:

Esta escala mide la necesidad que conduce a uno a suministrar ayuda a los demás por ejemplo: comida, protección, y otros cuidados al niño, al débil o al incapaz, da simpatía y confort; ayu

da a otros siempre que es posible, interesado en el cuidado de los niños incapacitados o enfermos.

En esta escala encontramos resultados en 6 de los rangos. El normal medio ocupó el mayor porcentaje con un 33.33%, representado por un 77% de Anest. y un 23% de Med. Int. En el rango normal bajo se encontró un 29.62% con un 50% de cada grupo. En el normal alto encontramos un 60% de Anest. y un 40% de Med. Int. En el subnormal un 7.40%, con un 100% de Med. I. K. En el inferior también un 7.40%, con un 50% para cada grupo. Cuadro y grafica X.

ESCALA XI NECESIDAD DE ORDEN:

Mide la necesidad de un orden interno que se expresa en conductas diversas como: organización del sujeto y de su medio ambiente, la limpieza y cuidado de su cuerpo y vestimenta. Arreglo de sus objetos personales, poniendo cada cosa en su lugar. Escrupulosidad en su trabajo y en todas sus actividades. El sujeto le disgusta el orden, la confusión, la ausencia organización.

En esta escala encontramos resultados en 6 rangos el mayor porcentaje en normal medio con un 33.33% con un 55% de Anest. y un 45% de Med. Int. En normal bajo encontramos un 29.62% del cual el 63% es de Anestesiología y el 37% de Med. Int. , en normal alto encontramos un 14.81% , con un 75% de Anest. y

el 25% de Med. Int. En el rango inferior encontramos un 7.40%, del cual el 50% lo representa cada grupo. Aquí aparece un 3.70% representado por un residente de Med. Int. en el rango de Inferior deficiente. Cuadro y grafica XI.

ESCALA XII NECESIDAD DE HUMORISMO:

Esta escala mide la necesidad de relajamiento tanto físico como mental; buscar diversión, jugar, reír, evitar una tensión y tomar la vida un tanto en broma.

En esta escala encontramos un 51.85% en el rango normal medio con un 57% de Anest. y un 43% de Med. Int., seguido de normal alto con un 29.62%, representado por un 75% de Anest. y un 25% de Med. Int., en el rango sup. al ter. medio encontramos un 11.11% con un 100% de Med. Int., tanto en normal bajo como en subnormal encontramos un 3.70% respectivamente representado por un residente de Med. Interna y uno de Anest. Cuadro y gráfica XII.

ESCALA XIII NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO SOCIAL:

Mide la necesidad de exigir respeto, buscar distinción, aprobación, prestigio social u honores. De alcanzar un status social. El sujeto desea estar en alta estima por sus conocimientos, interesado en su reputación y lo que piense la gente de él. Trabaja para la aprobación y reconocimiento de otros.

En esta escala encontramos un 44.47% en el rango normal medio con un 61% de residentes de Anest. y un 39% de Med. Int. En los rangos normal bajo y subnormal encontramos un 18.51% cada uno representando para el primero un 60% los residentes de anest. y un 40% los de Med. Int. y el segundo un 80% de Med. Int. y un 20% Anest., en los rangos normal alto y sup al ter. medio encontramos un 3.70% respectivamente. Cuadro y gráfica XIII.

ESCALA XIV NECESIDAD DE CONOCIMIENTO INTELECTUAL:

Esta escala mide la necesidad de preguntar o contestar preguntas generales; interés en la teoría, la inclinación a analizar eventos y generalizar, discusión y debate; énfasis en lo lógico y razonable; autocorrección y crítica. El hábito de exponer una opinión en forma precisa; especulación desinteresada. El sujeto desea atender muchas áreas del conocimiento, analítico, explotador, lógico, probador, teórico, astuto, racional, inquisitivo.

En esta escala encontramos resultados en 5 rangos; con un 51.85% en el de normal medio representado por un 57% de Anest. y un 47% de Med. Int. En el rango normal bajo encontramos un 25.92%, con un 56% de Anest. y un 44% de Med. Int. En el de normal alto aparece un 14.83%, con un 50% para cada grupo. En los rangos sup. al término medio e inferior encontramos un 3.70%. 100% de Med. Int. Cuadro y gráfica XIV.

ESCALA XV NESCALA DE VERDAD:

Esta escala mide la veracidad de las respuestas al inventario.

En esta escala encontramos un 40.74% en normal medio con un 75%

de residentes de Anest. y un 25% de Med. Int., seguido de un

37.03% de normal bajo con un 60% de Anest. y un 40% de Med.

Int. en normal alto se observaron un 11.13% con un 75% de Med.

Int. y un 25% de Anest., en el rango inferior un 7.40% con un

50% para cada grupo, en el rango subnormal un 3.70% de Med.

Int. Cuadro y gráfica XV.



**ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD  
RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA  
HEP 1989**

**Distribución por edad y sexo**

| EDAD    | TOTAL | SEXO |   | % DEL TOTAL |
|---------|-------|------|---|-------------|
|         |       | M    | F |             |
| 27 años | 2     | 2    | 0 | 7.45%       |
| 28 "    | 6     | 5    | 1 | 22.22%      |
| 29 "    | 2     | 1    | 1 | 7.40%       |
| 30 "    | 13    | 11   | 2 | 48.10%      |
| 31 "    | 3     | 3    | 0 | 11.11%      |
| 40      | 1     | 1    | 0 | 3.70%       |
| TOTAL   | 27    | 23   | 4 | 100.00%     |

**Distribución por peso**

| PESO Kg | TOTAL | CATEGORIA |   |              |   | % TOTAL |
|---------|-------|-----------|---|--------------|---|---------|
|         |       | R. Anest. |   | R. Med. Int. |   |         |
|         |       | M         | F | M            | F |         |
| 46 - 50 | 1     | 0         | 1 | 0            | 0 | 3.70%   |
| 51 - 55 | 1     | 0         | 1 | 0            | 0 | 3.70%   |
| 56 - 60 | 7     | 3         | 1 | 3            | 0 | 25.92%  |
| 61 - 65 | 7     | 5         | 0 | 2            | 0 | 25.92%  |
| 66 - 70 | 5     | 2         | 0 | 3            | 0 | 18.51%  |
| 71 - 75 | 6     | 3         | 0 | 3            | 0 | 22.25%  |
| + 75    | 0     | 0         | 0 | 0            | 0 | 0.00%   |
| TOTAL   | 27    | 13        | 3 | 11           | 1 | 100%    |


# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HE P 1989

CUADRO I NECESIDAD DE LOGRO

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0              |
| INFERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0              |
| SUBNORMAL       | 0         | 0         | 0            | 0              |
| NORMAL BAJO     | 10        | 6         | 4            | 37.03%         |
| NORMAL MEDIO    | 13        | 5         | 8            | 48.14%         |
| NORMAL ALTO     | 4         | 4         | 0            | 14.83%         |
| SUP. TER. MEDIO | 0         | 0         | 0            | 0              |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0              |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad

GRAFICA I




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HEP 1989

CUADRO II NECESIDAD DE AFILIACION

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |             | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med.int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0           | 0              |
| INFERIOR        | 0         | 0         | 1           | 3.70%          |
| SUBNORMAL       | 1         | 1         | 0           | 3.70%          |
| NORMAL BAJO     | 6         | 3         | 3           | 22.22%         |
| NORMAL MEDIO    | 8         | 5         | 3           | 29.72%         |
| NORMAL ALTO     | 10        | 6         | 4           | 37.06%         |
| SUP. TER. MEDIO | 1         | 0         | 1           | 3.70%          |
| SUPERIOR        | 1         | 0         | 1           | 3.70%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0           | 0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>   | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA. HE P 1989

CUADRO III NECESIDAD DE AGRESION

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 00.00%         |
| INFERIOR        | 2         | 1         | 1            | 7.40%          |
| SUBNORMAL       | 5         | 2         | 3            | 18.51%         |
| NORMAL BAJO     | 13        | 8         | 5            | 48.14%         |
| NORMAL MEDIO    | 5         | 3         | 2            | 18.51%         |
| NORMAL ALTO     | 2         | 1         | 1            | 7.40%          |
| SUP. TER. MEDIO | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD  
RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA  
HEP 1989

CUADRO IV NECESIDAD DE AUTONOMIA

| CLASIFICACION   | TOTAL | CATEGORIA |              | % TOTAL |
|-----------------|-------|-----------|--------------|---------|
|                 |       | R. Anest. | R. Med. Int. |         |
| DEFICIENTE      | 0     | 0         | 0            | 0.00%   |
| INFERIOR        | 3     | 0         | 3            | 11.11%  |
| SUBNORMAL       | 5     | 4         | 1            | 18.54%  |
| NORMAL BAJO     | 8     | 4         | 4            | 29.62%  |
| NORMAL MEDIO    | 8     | 5         | 3            | 29.62%  |
| NORMAL ALTO     | 3     | 2         | 1            | 11.11%  |
| SUP. TER. MEDIO | 0     | 0         | 0            | 0.00%   |
| SUPERIOR        | 0     | 0         | 0            | 0.00%   |
| BRILLANTE       | 0     | 0         | 0            | 0.00%   |
| TOTAL           | 27    | 15        | 12           | 100.00% |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HEP 1989

CUADRO V NECESIDAD DE DOMINACION

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| SUBNORMAL       | 3         | 2         | 1            | 11.11%         |
| NORMAL BAJO     | 6         | 5         | 1            | 22.22%         |
| NORMAL MEDIO    | 3         | 2         | 1            | 11.11%         |
| NORMAL ALTO     | 12        | 4         | 8            | 44.45%         |
| SUP. TER. MEDIO | 3         | 2         | 1            | 11.11%         |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>24</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad

GRAFICA V




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HEP 1989

CUADRO VI NECESIDAD DE RESISTENCIA

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| SUBNORMAL       | 5         | 2         | 3            | 18.51%         |
| NORMAL BAJO     | 8         | 4         | 4            | 29.65%         |
| NORMAL MEDIO    | 7         | 6         | 1            | 25.92%         |
| NORMAL ALTO     | 7         | 3         | 4            | 25.92%         |
| SUP. TER. MEDIO | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad

GRAFICA VI




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA. HEP 1989

CUADRO VII NECESIDAD DE EXIBICIONISMO

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | O/o TOTAL      |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 1         | 0         | 1            | 3.70%          |
| SUBNORMAL       | 1         | 1         | 0            | 3.70%          |
| NORMAL BAJO     | 4         | 1         | 3            | 14.81%         |
| NORMAL MEDIO    | 8         | 6         | 2            | 29.65%         |
| NORMAL ALTO     | 10        | 5         | 5            | 37.01%         |
| SUP. TER. MEDIO | 3         | 2         | 1            | 11.13%         |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad






# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HE P 1989

CUADRO VIII NECESIDAD DE EVASION

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| SUBNORMAL       | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| NORMAL BAJO     | 13        | 8         | 5            | 48.16%         |
| NORMAL MEDIO    | 8         | 6         | 2            | 29.62%         |
| NORMAL ALTO     | 6         | 1         | 5            | 22.22%         |
| SUP. TER. MEDIO | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HE P 1989

CUADRO IX NECESIDAD DE IMPULSIVIDAD

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 1         | 0         | 1            | 3.70%          |
| SUBNORMAL       | 3         | 1         | 2            | 11.11%         |
| NORMAL BAJO     | 6         | 5         | 1            | 29.62%         |
| NORMAL MEDIO    | 8         | 4         | 4            | 29.62%         |
| NORMAL ALTO     | 6         | 4         | 4            | 29.62%         |
| SUP. TER. MEDIO | 1         | 1         | 1            | 3.70%          |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA. HEP 1989

CUADRO X NECESIDAD DE INTERES POR LOS DEMAS

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 2         | 1         | 1            | 7.40%          |
| SUBNORMAL       | 2         | 0         | 2            | 7.40%          |
| NORMAL BAJO     | 8         | 4         | 4            | 29.62%         |
| NORMAL MEDIO    | 9         | 7         | 2            | 33.33%         |
| NORMAL ALTO     | 5         | 3         | 2            | 18.55%         |
| SUP. TER. MEDIO | 1         | 0         | 1            | 3.70%          |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HEP 1989

CUADRO XI NECESIDAD DE ORDEN

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 1         | 0         | 1            | 3.70%          |
| INFERIOR        | 2         | 1         | 1            | 3.70%          |
| SUBNORMAL       | 3         | 1         | 2            | 11.11%         |
| NORMAL BAJO     | 8         | 5         | 3            | 29.63%         |
| NORMAL MEDIO    | 9         | 5         | 4            | 33.33%         |
| NORMAL ALTO     | 4         | 3         | 1            | 14.81%         |
| SUP. TER. MEDIO | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HEP 1989

CUADRO XII NECESIDAD DE HUMORISMO

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| SUBNORMAL       | 1         | 0         | 1            | 3.70%          |
| NORMAL BAJO     | 1         | 1         | 0            | 3.70%          |
| NORMAL MEDIO    | 14        | 8         | 6            | 51.85%         |
| NORMAL ALTO     | 8         | 6         | 2            | 29.62%         |
| SUP. TER. MEDIO | 3         | 0         | 3            | 11.11%         |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HEP 1989

CUADRO XIII NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO SOCIAL

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 3         | 2         | 1            | 11.11%         |
| SUBNORMAL       | 5         | 1         | 4            | 18.51%         |
| NORMAL BAJO     | 5         | 3         | 2            | 18.51%         |
| NORMAL MEDIO    | 12        | 8         | 4            | 44.47%         |
| NORMAL ALTO     | 1         | 1         | 0            | 3.70%          |
| SUP. TER. MEDIO | 1         | 0         | 1            | 3.70%          |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad

GRAFICA I II




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA HE P 1989

CUADRO XIV NECESIDAD DE CONOCIMIENTO INTELECTUAL

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 1         | 0         | 1            | 3.70%          |
| SUBNORMAL       | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| NORMAL BAJO     | 7         | 4         | 3            | 25.92%         |
| NORMAL MEDIO    | 14        | 8         | 6            | 51.85%         |
| NORMAL ALTO     | 4         | 2         | 2            | 14.83%         |
| SUP. TER. MEDIO | 1         | 1         | 0            | 0.00%          |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad




# ESTUDIO COMPARATIVO DE RASGOS DE PERSONALIDAD RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA. HEP 1989

CUADRO XV NECESIDAD : ESCALA DE VERDAD.

| CLASIFICACION   | TOTAL     | CATEGORIA |              | % TOTAL        |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|                 |           | R. Anest. | R. Med. Int. |                |
| DEFICIENTE      | 0         | 0         | 0            | 0.00%          |
| INFERIOR        | 2         | 1         | 1            | 7.40%          |
| SUBNORMAL       | 1         | 1         | 0            | 3.70%          |
| NORMAL BAJO     | 10        | 6         | 4            | 37.03%         |
| NORMAL MEDIO    | 11        | 6         | 5            | 40.74%         |
| NORMAL ALTO     | 3         | 1         | 2            | 11.13%         |
| SUP. TER. MEDIO | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| SUPERIOR        | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| BRILLANTE       | 0         | 0         | 0            | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>27</b> | <b>15</b> | <b>12</b>    | <b>100.00%</b> |

Fuente: Inventario de Douglas para la interpretación de la personalidad

GRAFICA XV





### DISCUSION:

La poca importancia que se ha concedido al estudio de los rasgos de personalidad que caracterizan a médicos especialistas, donde el factor humano al que les obliga el ejercicio de suprofesión, es de vital importancia; los antecedentes de otros estudios realizados con residentes nos ha llevado a realizar el presente estudio, con el único fin de aportar datos que ayuden a integrar en un momento dado, - instrumentos de selección y orientación vocacional en candidatos a realizar una especialidad, y de esta forma lograr mejores profesionistas tanto médica como humanamente en su trato.

Los resultados obtenidos del Inventario de Douglas N Jackson nos muestra a un grupo de médicos residentes con necesidades comunes, sin que se observen diferencias significativas en cuanto a la satisfacción de estas, encontrando a ambos grupos dentro de los rangos de normalidad el mayor porcentaje de ellos, notandose en algunas necesidades como la de orden, un porcentaje bajo en el rango de deficiente; dicho resultado no altera mayormente los resultados ya que no es significativo. Como este aparecen varios ejemplos en las 14 necesidades estudiadas, sin embargo el mayor porcentaje de los residentes de halla dentro de la normalidad sin rasgos que hagan sobresalir a un grupo de otro. Se debe hacer notar que casi no existen resultados en las escalas superiores lo que podría indicarnos una medianidad en cuanto a la personalidad de los médicos estudiados.

### CONCLUSIONES:

- 1.- Los resultados del Inventario de la personalidad de Douglas N Jackson, nos dicen que no existían diferencias claras en la personalidad de los grupos estudiados.
- 2.- Estas similitudes se explican por el origen de los dos grupos que es un grupo médico básico general.
- 3.- Al encontrar todos los rangos dentro de la normalidad sin que ningún grupo tenga elementos sobresalientes, nos debe hacer reflexionar sobre la mediocridad de que nos hablan estos resultados; sobre todo si consideramos que se trata de médicos jóvenes, que se están iniciando en la vida profesional y que deberían mostrar un rango superior en cuanto a necesidades como las de logro, de conocimiento intelectual, etc.
- 3.- Es necesario implementar medidas tendientes a motivar a los residentes a dar más de sí, a interesarse por adquirir mayores conocimientos que la mayoría de los individuos, ya que el médico ante todo debe de ser un humanista, con un elevado nivel moral y académico.
- 4.- Es conveniente realizar estudios comparativos con los Anestesiólogos de base o de otras especialidades, tendientes a descubrir psicopatologías, con el fin de aplicar una terapia adecuada ya que si los médicos residentes deberían estar en rangos superiores de motivación y apenas alcanzan la normalidad baja, puede inferirse que los médicos de base, se encontrarían en un mayor porcentaje dentro de rangos infe-

## BIBLIOGRAFIA

- 1.- JORGE HUMBERTO BRETON MARQUEZ: " Estudio de la personalidad en dos grupos de residentes de Anestesiología" Rev. Mex. Anest. 1985, No.8: 13-22.
- 2.- VICTOR FLORES MALDONADO: " Estudio de la personalidad en tres grupos de médicos residentes: Anestesiología, Cirugía General, Medicina Interna. A través del Inventario de Douglas N Jackson. Rev. Mex. Anest. 1985; 8: 97-103.
- 3.- JOSE OSORIO OLIVARES: " Estudio de la personalidad de un grupo de médicos residentes de Ginecología y Obstetricia. Rev. Mex. Anest. 1986, No. 15: 12-26.