1978

"ESTUDIO PRACTICO COMPARATIVO, DE
LOS PRINCIPALES METODOS DE DOSIFI-
CACION DE LA TRANSAMINASA GLU-
TAMICO OXALACETICA, EN SUEROS
HUMANOS".

U. N. A. M. 1959

ADELA MUJICA MIRANDA

T E S I S P R O F E S I O N A L

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Ciencias Químicas

**"ESTUDIO PRACTICO COMPARATIVO, DE LOS
PRINCIPALES METODOS DE DOSIFICACION
DE LA TRANSAMINASA GLUTAMICO
OXALACETICA, EN SUEROS
HUMANOS".**

T E S I S

que para su examen profesional de Químico
Farmacéutico Biólogo

P R E S E N T A

ADELA MUJICA MIRANDA

México, D. F.
1959.

A mis padres con cariño.

Hago presente mi gratitud a la Dirección del Instituto Nacional de Cardiología y muy especialmente al Sr. Dr. Dn. Tomás Perrín y a la Srta. Q. F. B. Clementina López Cárdenas - jefe y subjefe del laboratorio de Química de dicho Instituto.

Con afectuoso reconocimiento al Sr. Dr. Dn. Edmundo Calva C. jefe del Depto. de Bioquímica del I. N. C. por su valiosa dirección en la realización de este trabajo.

C A P I T U L O S

- I.- INTRODUCCION.
- II.- ANTECEDENTES.
- III.- METODOS Y RESULTADOS.
- IV.- OTROS METODOS.
- V.- CONCLUSIONES.
- VI.- BIBLIOGRAFIA.

I N T R O D U C C I O N

Está ampliamente demostrado que la transaminasa glutámico-oxalacética aumenta en el suero de pacientes con infarto del miocardio, durante la primera semana siguiente al infarto. Este hecho sirve de valiosa ayuda en el diagnóstico diferencial de dicha enfermedad.

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Química del Instituto Nacional de Cardiología. El propósito fué seleccionar un método, entre los ya establecidos, para cuantificar la transaminasa glutámico-oxalacética, en el trabajo habitual de los laboratorios de dicho Instituto.

A N T E C E D E N T E S .

Transaminación.-

La reacción biológica de transaminación fué observada desde -- hace más de 40 años por Neubauer y Knoop (1). La primera descripción de la transaminación enzimática fué hecha por Braunstein y Kritzman -- que la estudiaron en tejidos animales y la definieron como una trans-- ferencia intermolecular de grupos aminos (2).

La reacción se efectúa entre un aminoácido y un cetoácido; el primero cede su grupo amino al segundo y se forman los correspondien-- tes cetoácido y aminoácido.

El aminoácido al transferir su grupo amino se oxida, mientras el cetoácido, al transformarse en aminoácido, se reduce.

La reacción es reversible y está catalizada por enzimas llamadas transaminasas o aminotransferasas. En los casos en que se ha demostrado la participación de una coenzima, se ha encontrado que interviene el -- fosfato de piridoxal.

En investigaciones recientes se ha llegado a comprobar la -- existencia de varias transaminasas ya que todos los aminoácidos natu-- rales conocidos pueden participar en procesos de transaminación (1).

Transaminasa glutámico-oxalacética ... o también llamada transaminasa glu-- támico-aspartica.-

La enzima transaminasa glutámico-oxalacética cataliza reversi-- blemente y con un grado relativamente alto de especificidad la trans-- ferencia del grupo amino del ácido L-glutámico al ácido oxalacético --

con la formación de los ácidos alfa-cetoglutarico y L-aspartico.

Ac. L-glutamino

Ac. oxalacético.

Ac. alfa-cetoglutarico

Ac. L-aspartico.

O'Kane y Gunsalus demostraron que el fosfato de piridoxal es el grupo prostético enzimático (3).

La enzima está ampliamente distribuida en el organismo humano. La máxima concentración se registra en el músculo cardíaco (4). La lesión miocárdica, en los casos de infarto, va seguida de un aumento en la actividad enzimática del suero de dos a veinte veces el valor normal (5). Presentan también actividad transaminásica en orden decreciente: el músculo esquelético, el cerebro, el hígado, el riñón, el páncreas, el bazo, los pulmones, los testículos, etc. (6).

La presencia de la enzima en el suero sanguíneo y en los glóbulos rojos humanos fue demostrada por Karmen y sus colaboradores. Estos autores encontraron que la concentración en el suero y en el plasma es la misma, pero es diez veces mayor en los glóbulos rojos (7).

El nivel de la actividad de la enzima en el suero en individuos normales es prácticamente el mismo día a día (8).

Por otra parte, la actividad enzimática del suero permanece constante por un periodo de dos semanas, cuando se guarda a una temperatura entre 30° y 50° C (7). El congelamiento y la liofilización no producen alteración en la actividad, así como tampoco el calentamiento a 60° C durante 25 minutos. A la temperatura de la ebullición se destruye a la enzima (7).

M E T O D O S

Primero.-

El primer método empleado en este trabajo, para la determinación de la transaminasa glutámico-oxalacética, fué el espectrofotométrico descrito por Karmen (9).

El ácido oxalacético, formado en la reacción de transaminación (I), es determinado por medio de una reacción auxiliar (II), en la que oxida al difosfopiridinucleótido reducido en presencia de deshidrogenasa málica y se reduce a ácido málico.

La actividad enzimática es proporcional a la cantidad de ácido oxalacético reducido. La reducción del ácido oxalacético es concomitante a la oxidación del DPNH y esta última se mide por la disminución de absorción luminosa a la longitud de onda de 340 mμ. En esta longitud de onda el DPNH, en contraste con su forma oxidada DPN⁺, tiene un máximo de absorción.

Aparato empleado.-

Se uso el espectrofotometro Beckman modelo DU con lámpara de Tungsteno.

Reactivos.-

Fueron adquiridos de la "California Foundation for Biochemical Research" 3625 Medford Street, Los Angeles 63, Cal.

- 1.- Solución estabilizada de deshidrogenasa málica, (MDH) -- conteniendo 10,000 Unidades Karmen por ml. (Preparada de corazón de cerdo por el método de Strab).
- 2.- Sal disódica del difosfopiridinucleótido, (DPNH).- Disponible en ampolletas de 2 mg. para disolverse en 1 ml de solución amortiguadora de fosfato.
- 3.- Solucion 0.1 M de ácido alfa cetoglutarico.
- 4.- Acido L-aspartico 0.2 M. en solución amortiguadora de pH 7.5
- 5.- Solución amortiguadora de fosfatos 0.1 M. pH 7.5

Procedimiento.-

Para cada suero que se ensayó se usaron dos cubetas Beckman de cuarzo de 1 cm. de grosor. La mezcla de reacción se preparó en el siguiente orden:

	<u>Cubeta problema</u>	<u>Cubeta testigo</u>
Soluciones	(ml)	(ml)
1- Ac. L-aspartico	0.5	0.5
2- MDH	0.1	0.1
3- DPNH	0.1	---
4- Suero	0.1	0.1
5- Sol Amortiguadora.	2.0	2.1

Se cubrió cada cubeta con su tapa respectiva y se mezcló el contenido por inversión. Durante 30 minutos se dejaron reposar a la temperatura del laboratorio. Esta preincubación sirve para obtener una densidad óptica constante, ya que una cantidad variable de PPH es oxidado por sustratos del suero, principalmente el ácido pirúvico que en presencia de deshidrogenasa láctica se reduce a ácido láctico. Asimismo sirve para que la temperatura de los tubos se equilibre con la temperatura ambiente.

Al final de los 30 minutos se añadió:

G-Ac. Alfa-ceto glutarico.	0.2	0.2
-------------------------------	-----	-----

Inmediatamente después de añadir este último reactivo se empezó a contar el tiempo de incubación. La cubeta testigo sirvió para fijar el 100% de transmisión y la cubeta problema se leyó a los 2, 4, 6, 8, 10 y 12 minutos contados a partir de la adición del ácido alfa-cetoglutarico.

Calculos.

Para expresar los resultados obtenidos se tomo como unidad de Actividad Transaminasica el cambio en unidades de la densidad óptica - por centímetro . de medio absorbente, por minuto, por ml de suero y estando el sistema a 25°C. (6) (7).

$$U.T. = \frac{(D_{0_2} - D_{0_1}) \cdot 1000}{v \cdot (t_2 - t_1) \cdot f_T \cdot f_p}$$

U.T. = unidades de transaminasa.

D_{0_2} = Densidad óptica al tiempo t_2 , en minutos.

D_{0_1} = Densidad óptica al tiempo t_1 , en minutos.

f_p = Longitud de medio absorbente en la cubeta, en centímetros.

f_T = Factor de conversión para la temperatura (7).

v = volumen de suero, en ml.

Actividad de la transaminasa glutámico-oxalacética en 25 sueros de personas normales.

Método espectrofotométrico de Karmen

<u>Núm</u>	<u>Nombre</u>	<u>Sexo</u>	<u>U. de T. por ml. de suero</u>
1	A.M.	F	18
2	E.M.	F	20
3	L.N.	F	23
4	R.N.	F	18
5	M.G.	F	17
6	R.M.	F	18
7	C.S.	F	18
8	J.S.	F	22
9	J.L.	F	25
10	R.R.	F	14
11	E.S.	M	17
12	R.M.	M	18
13	L.M.	M	19
14	M.S.	M	24
15	R.J.	M	23
16	A.S.	M	16
17	A.B.	M	13
18	C.R.	M	49
19	D.H.	M	27
20	A.P.	M	27
21	M.S.	M	15
22	J.L.	M	22
23	R.H.	M	22
24	M.V.	M	26
25	R.D.	M	37

valores normales.-

De la gráfica anterior se ve que el máximo valor registrado en sueros normales fue de 49 unidades y el mínimo de 13 U. El valor promedio que se obtiene es de 22 unidades. La desviación tipo es de 5 unidades calculada de la ecuación.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}}$$

Para esta técnica sus autores reportaron como resultados de -- las determinaciones hechas a sueros de personas normales; un valor -- promedio de 16 unidades, 33 unidades como cifra máxima obtenida y 10 -- unidades como cifra mínima.

NOTA: Se tomaron como personas normales a los médicos, enfermeras y -- químicas del Instituto; así mismo a los donadores de sangre que fueron aceptados en la misma institución.

Segundo Método.-

Método de Cabaud, Leeper y Wróblewski.-

El método que se estudió en segundo término fué el propuesto -- por Thonhazy, White y Umbreit modificado por Cabaud, Leeper y Wróble-- ski (10).

Base del método.-

Las reacciones empleadas en este método son las siguientes:

El ácido oxalacético que se forma en la reacción (I) catalizada por la transaminasa, es convertido a ácido pirúvico por el citrato de anilina en la reacción (II). El ácido pirúvico se hace reaccionar -- con la dinitrofenilhidrazina y se forma la dinitrofenilhidrazona co-- rrespondiente que se extrae con tolueno. La solución de la hidrazona --

en tolueno desarrolla un color canela al tratarla con solución alcohólica de hidróxido de potasio. La intensidad de la coloración es -- proporcional a la cantidad de ácido pirúvico y éste a la actividad de la transaminasa.

Reactivos.-

- 1.- Substrato para la transaminasa: Acido DL-aspártico, 2.66 g; Acido alfa-cetoglutarico, 0.6 g; KH_2PO_4 , 2.0 g. Para facilitar la solución del ácido aspártico en agua destilada se agrega su equivalente de solución 0.1 N o KOH y al final se ajusta el pH a 7.4 con la misma solución de KOH y se completa a 100 ml con agua destilada. La solución se conserva en el refrigerador al menos por un mes.
- 2.- Acido tricloroacético al 100%. Partes iguales de tricloroacético y agua destilada. La solución se conserva en el refrigerador.
- 3.- Citrato de anilina: Acido cítrico 5 g. disueltos en 5 ml de anilina. La solución se pone en frasco ámbar y al abrigo de la luz.
- 4.- Dinitrofenilhidrazina: A 100 mg. de 2,4-dinitrofenilhidrazina se les agregan 20 ml de ácido clorhídrico concentrado, se agita la mezcla hasta disolución y luego se agregan 80 ml de agua destilada.
- 5.- Tolueno.
- 6.- Potasa alcohólica: se disuelven 2.5 g de KOH en 5 ml de agua destilada y se completa a 100 ml con alcohol etílico de 95%.

Procedimiento.

- A.- Se preparan dos tubos de ensayo para cada suero por analizar, uno se marca como testigo y el otro como problema.
- B.- A cada uno de los dos tubos se les añade 0.5 ml de suero y 0.5 ml de agua destilada.
- C.- Al tiempo cero a ambos tubos se les agrega 0.5 ml del substrato y sin pérdida de tiempo al tubo marcado como testigo se le añade una gota de ácido tricloroacético y una gota de citrato de anilina y se agita su contenido.

- D.- El tubo marcado como problema se incubó a 26°C. durante 20 minutos, contados desde el momento en que se añadió el -- substrato. Al final de este tiempo se le agrega una gota -- de ácido tricloroacético y una de citrato de anilina. -- -- (Estos dos reactivos nunca se mezclan antes de que sean -- añadidos). Se agita bien el tubo y se deja reposar durante 20 minutos como tiempo mínimo.
- E.- A los dos tubos se les agregan 2 ml de tolueno. Se tapan -- con un tapón de hule, previamente lavado y además protegido -- con cubierta de plástico. Se agitan vigorosamente los -- tubos y se centrifugan durante 5 minutos o hasta separar -- la emulsión y obtener la cantidad adecuada de líquido so-- brenadante.
- F.- Se saca, de cada uno de los tubos, 1 ml de la capa de to-- lueno (líquido sobrenadante claro) y se vacía por separado en dos tubos de ensayo.
- G.- Se añaden exactamente 3 ml de potasa alcohólica a cada tu-- bo. Se mezcla su contenido se pasa a dos cubetas del colo-- rímetro y se mide inmediatamente la transmitancia en 490 -- mμ, usando agua destilada para ajustar el 100% de trans-- misión.

Calibración.-

La curva de calibración se estableció usando una solución pa-- trón de ácido pirúvico que contenía 1,000 μg de ácido pirúvico por ml. Esta solución fué adquirida de la casa "Harleco". También se hizo la -- curva con una solución de piruvato de sodio que contenía una concentra-- ción equivalente de ácido pirúvico.

Se prepararon diluciones apropiadas para obtener muestras que -- contuvieran de 0 a 500 /ug. por ml de ácido pirúvico.- Cada una de es-- tas diluciones fueron analizadas igual que las soluciones problema, ex-- cepto que no se sometieron a incubación. Tanto el testigo que no conte-- nía ácido pirúvico, como cada una de las diluciones se leyeron a 490 -- mμ. El 100% de transmisión se determinó con agua destilada.

Aparato empleado.-

El aparato que se empleó fué el espectrofotómetro Coleman Jr. y las cubetas que se usaron fueron cubetas cilíndricas de 10 mm de diáme-- tro por 75 mm: de largo (Coleman).

Resultados.-

curva de calibración.

<u>Acido pirúvico</u> (μg)	<u>Transmisión óptica %</u>	
	Lecturas 1 min.	a 60 min.
0	93.0	93.0
10	88.5	89.0
25	82.5	82.5
50	71.5	71.5
100	59.5	59.5
200	39.0	39.0
250	32.0	32.0
500	15.0	15.0

<u>Piruvato de Sodio</u> (μg)	<u>Transmisión óptica %</u>	
	Lecturas 1 min.	a 60 min.
0	93.0	93.0
10	88.5	88.5
---	---	---
50	73.5	73.5
100	60.0	60.0
200	39.0	39.0
---	---	---
---	---	---

1.- Las lecturas permanecían constantes desde los 60 segundos hasta los 60 minutos siguientes a la adición de la potasa alcohólica.

2.- Las lecturas correspondientes a las distintas diluciones--eran prácticamente las mismas con la solución de ácido pirúvico y con la de piruvato de sodio.

3.- El logaritmo de la transmisión óptica resultó función li--neal de la concentración de ácido pirúvico hasta concentraciones de --200 $\mu\text{g/ml}$. Esto se ilustra en la gráfica trazada en papel semiloga--rítico. (Fig. A). A concentraciones mayores la curva se desvía hacia arriba, por lo cual los sueros con actividad alta fueron diluidos has--ta que la lectura obtenida en la reacción cayera en la posición li--neal de la curva de calibración.

FIG. A

cálculos.-

Los autores de este método definieron la unidad de Transaminasa como la actividad enzimática presente en 1 ml de suero que origina la producción de material cromógeno equivalente a 1 μ g de ácido pirúvico en las condiciones del método.

Las unidades de transaminasa de un suero problema se obtenían al leer en la curva de calibración los μ g de ácido pirúvico correspondientes a la transmisión óptica obtenida en la reacción.

Determinaciones hechas en sueros de personas normales.

Método de Cabaud, Leeper y Wroblewski:

Núm.	Hombre.	Sexo.	Edad (años)	Peso (kg)	U.T.*
1	R.M.	F	20-30	40-50	3
2	A.M.	F	20-30	40-50	14
3	A.H.	F	20-30	50-60	16
4	S.C.	F	20-30	60-70	6
5	C.P.	F	20-30	40-50	14
6	M.G.	F	20-30	40-50	6
7	G.L.	F	30-40	60-70	10
8	A.E.	F	20-30	40-50	15
9	L.B.	F			13
10	M.A.	F	40-50	50-60	23
11	J.O.	F	40-50	60-70	21
12	M.B.	F	30-40	60-70	27
13	A.D.	F	20-30	40-50	24
14	C.D.	F	20-30	50-60	6
15	G.F.	F	30-40	60-70	6
16	F.L.	M	30-40	50-60	11
17	A.G.	M	30-40	60-70	6
18	M.T.	M	30-40	60-70	12
19	B.L.	M	30-40	60-70	3
20	T.B.	M	40-50	60-70	24
21	L.R.	M	30-40	40-50	29
22	T.R.	M	30-40	50-60	9
23	T.T.	M	10-20		12
24	O.C.	M	10-20	50-60	12
25	M.D.	M	30-40	50-60	25
26	L.D.	M	50-60	30-40	35
27	Z.D.	M	40-50	50-60	26
28	J.R.	M	40-50	60-70	20
29	F.L.	M	20-30	50-60	33
30	C.L.	M	30-40	70-80	22

* unidades de Transaminasa.

cálculos.-

Los autores de este método definieron la unidad de Transaminasa como la actividad enzimática presente en 1 ml de suero que origina la producción de material cromógeno equivalente a 1 μ g de ácido pirúvico en las condiciones del método.

Las unidades de transaminasa de un suero problema se obtenían al leer en la curva de calibración los μ g de ácido pirúvico correspondientes a la transmisión óptica obtenida en la reacción.

Determinaciones hechas en sueros de personas normales.

Método de Cabaud, Leeper y Wroblewski:

Núm.	Nombre.	Sexo.	Edad (años)	Peso (kg)	U.T.*
1	R.M.	F	20-30	40-50	3
2	A.M.	F	20-30	40-50	14
3	A.N.	F	20-30	50-60	16
4	S.C.	F	20-30	60-70	6
5	C.P.	F	20-30	40-50	11
6	M.G.	F	20-30	40-50	6
7	G.L.	F	30-40	60-70	10
8	A.E.	F	20-30	40-50	15
9	L.B.	F			13
10	M.A.	F	40-50	50-60	33
11	J.O.	F	40-50	60-70	21
12	M.B.	F	30-40	60-70	27
13	A.D.	F	20-30	40-50	24
14	C.D.	F	20-30	50-60	6
15	G.E.	F	30-40	60-70	6
16	E.L.	M	30-40	50-60	11
17	A.G.	M	30-40	60-70	6
18	M.T.	M	30-40	60-70	12
19	B.L.	M	30-40	60-70	3
20	T.B.	M	40-50	60-70	24
21	L.R.	M	30-40	40-50	29
22	T.R.	M	30-40	50-60	9
23	T.T.	M	10-20		12
24	O.C.	M	10-20	50-60	12
25	M.D.	M	30-40	50-60	25
26	L.D.	M	50-60	30-40	35
27	Z.D.	M	40-50	50-60	26
28	J.R.	M	40-50	60-70	20
29	F.L.	M	20-30	50-60	33
30	C.L.	M	30-40	70-80	22

* Unidades de Transaminasa.

Valores normales.-

El promedio de actividad, para sueros normales, que reportaron los autores para esta técnica es de 16.4 unidades con una desviación tipo de (± 8.4) y con una amplitud de 4 a 40 unidades.

Los resultados obtenidos de los 30 sueros ensayados, de personas aparentemente normales fueron los siguientes: Promedio de actividad 16 unidades, desviación estándar (± 9.4), valores máximo y mínimo observados 35 y 3 unidades respectivamente.

Tercer Método.-

Método de Reitman y Frankel.-

El método de Reitman y Frankel (11) es una modificación del método colorimétrico de Cabaud, Leeper y Wroblewski estudiado anteriormente.

Fundamento.-

En este procedimiento se omiten la precipitación de las proteínas, la conversión del oxalacétato a piruvato y la extracción de este último con tolueno. La solución de fenilhidrazina se agrega directamente para terminar el período de incubación. La mezcla de las fenilhidrazonas así formadas se determina colorimétricamente a 505 m μ en medio alcalino. El coeficiente de absorción de la fenilhidrazona del ácido oxalacético a esta longitud de onda es mucho mayor que el de la fenilhidrazona del ácido alfa-cetoglutarico; por lo que es posible aceptar que la absorción óptica a 505 m μ traduce la actividad de la enzima.

Material.-

- 1.- Solución amortiguadora de fosfatos, 0.1 M., pH 7.4
Se prepara mezclando 420 ml de fosfato disódico con 80 ml de fosfato monopotásico 0.1 M.
- 2.- Solución patrón de piruvato. 2 mM por litro. Se disuelven 22 mg de piruvato de sodio en 100 ml de solución amortiguadora de fosfatos.
- 3.- Substrato. ácido alfa-cetoglutarico 2 mM y ácido DL-aspar-

tico 200 mM. Se pesan 29.2 mg de ácido alfa cetoglutarico y 2.66 g de ácido DL-aspartico. La solución se prepara como se señaló en el procedimiento anteriormente descrito, excepto que se usó hidróxido de sodio 1 N para obtener el pH de 7.4

- 4.- Dinitrofenilhidrazina, 1 mM. Se prepara disolviendo 19.8 mg de 2,4-dinitrofenilhidrazina en 100 ml de ácido clorhídrico 1 N.
- 5.- Solución de hidróxido de sodio 0.4 N.
- 6.- Aparato empleado, fue el Coleman Jr., y las cubetas usadas fueron de 10 mm de diámetro por 150 mm de largo. En la técnica original (11) se usó un colorímetro Bausch and Lomb y se usaron cubetas de 15 mm de diámetro.

Procedimiento.-

- A.- Se pone 1 ml del sustrato en un tubo de ensayo y se lleva a 40° durante 10 minutos, en un baño de agua de temperatura constante.
- B.- Se agregan al tubo 0.2 ml del suero por analizar. Se mezcla el contenido. Se incuba durante 60 minutos a la temperatura del baño (40°).
- C.- Al final de los 60 minutos, se saca el tubo del baño y se le añade 1 ml del reactivo de 2,4-dinitrofenilhidrazina, con lo que se detiene la reacción.
- D.- Se deja el tubo a la temperatura del laboratorio por un mínimo de 20 minutos.
- F.- Se añaden 10 ml de hidróxido de sodio 0.4 N. Se tapa el tubo y se mezcla el contenido por inversión. Con las precauciones que se señalaron en el procedimiento anterior.
- G.- Se deja desarrollar la coloración durante 30 minutos a la temperatura ambiente. Al final de este tiempo se mide la densidad óptica de la solución a 505 m μ , usando agua para ajustar el 100% de transmisión.

Durante la incubación del problema conviene preparar como sigue un tubo testigo para cada suero analizado

1. Se mezclan 1 ml del sustrato, o 2 ml del suero y 1 ml del reactivo de dinitrofenilhidrazina

- 2.- Se deja el tubo reposar durante 20 minutos como tiempo mínimo.
- 3.- Al final de este tiempo se añaden 10 ml de hidróxido de sodio 0.4 N.
- 4.- Se deja desarrollar la coloración y se mide la densidad óptica como en el caso anterior.

calibración.-

Rietman y Frankel expresaron sus resultados en unidades Karmen, relacionando, en una gráfica, el cambio de la densidad óptica medida por su método contra unidades de actividad transaminásica medida espectrofotométricamente por el método de Karmen. También expresaron en una gráfica, el cambio en densidad óptica correspondiente a diversas cantidades de micromoles de piruvato y en otra curva relacionaron μM de piruvato con unidades Karmen de Transaminasa.

En el presente estudio se define la Unidad de Actividad Transaminásica como la formación de cetoácidos cuya hidrazona equivale a la de $1 \mu\text{M}$ de ácido pirúvico a 40°C con una incubación de 60 minutos y en las demás condiciones de la técnica.

Con objeto de comparar las unidades que se obtenían de acuerdo con la definición anterior, con unidades Karmen, se usó la gráfica de Rietman y Frankel (11), en la que el cambio en densidad óptica está marcado contra unidades de transaminasa Karmen. Al comparar dos de los sueros se obtuvieron los siguientes resultados: aquel en que se midió un cambio en densidad óptica de 0.0469 y que correspondía a 14 unidades, éstas fueron equivalentes a 12 unidades Karmen, en otro con un cambio en la densidad óptica de 0.2311 y correspondiente a 69 unidades, éstas fueron equivalentes a 66 U Karmen. Por los ejemplos analizados se observa que las correcciones no son trascendentes.

Curva de calibración.-

Se preparó de acuerdo con Rietman y Frankel usando dos soluciones, una de piruvato de sodio que contenía $2 \mu\text{M}/\text{ml}$ y otra de ácido alfa-cetoglutarico de la misma concentración.

Se mezclaron cantidades conocidas de cada una de las dos soluciones de manera de obtener siempre una concentración de $2 \mu\text{M}$ de cetoácidos por ml. Se prepararon cinco tubos de ensayo de la siguiente manera:

<u>TUBOS</u>		1	2	3	4	5
Acido pirúvico	(ml)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Acido alfa-ceto glutárico	(ml)	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
Sol. amortiguado- ra	(ml)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2,4-dinitrofenil hidrazina	(ml)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Las soluciones se dejaron reposar durante un tiempo mínimo de 20 minutos, contados a partir de la adición del reactivo de 2,4-dinitrofenilhidrazina. En seguida se añadieron 10 ml de hidróxido de sodio a los cinco tubos y se dejó estabilizar el color durante 30 minutos. La transmitancia se leyó a 505 m μ .

De la gráfica (Fig. 8) en que se trazó la densidad óptica -- contra microgramos de pirúvato se determinó el coeficiente de extinción que correspondía a 1 μ g de ácido pirúvico.

FIG. B

Determinación de la precisión del método.-

Para calcular la precisión del método se usó una misma preparación en la que se hicieron diez determinaciones de transaminasa en igualdad de condiciones. La desviación tipo (± 5.44) se calculó usando la siguiente ecuación:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum \text{des}^2}{N-1}}$$

En donde:

des = desviación de la media

N = número de determinaciones

$\sum \text{des}^2$ = suma de las desviaciones al cuadrado.

Núm.	Densidad Total	Optica Neta.	U de T	Desviación de la media	Desviación al cuadrado.
1	0.5120	0.2991	89.7	- 6.1	37.21
2	0.4650	0.2521	75.6	+ 8.0	64.00
3	0.4720	0.2591	77.7	+ 5.9	34.81
4	0.4980	0.2851	85.5	- 1.9	3.61
5	0.5090	0.2961	88.8	- 5.2	27.04
6	0.5050	0.2921	87.6	- 4.0	16.00
7	0.5020	0.2891	86.7	- 3.1	9.61
8	0.5020	0.2891	86.7	- 3.1	9.61
9	0.4980	0.2751	82.5	+ 1.1	1.21
10	0.4650	0.2521	75.6	+ 8.0	64.0
Testigo	0.2129				

M=83.6

267.10

$$\sigma = \sqrt{\frac{267.10}{9}} = 5.44$$

Relación de la actividad enzimática y la temperatura.-

Para determinar la relación entre la temperatura y la máxima -

actividad de la enzima se preparó inactivada de acuerdo con el método de Damman-Deper (1950) (Proc. 197 235 11950). El extracto no purificado se diluyó y se le hicieron cinco determinaciones de actividad usando diferentes temperaturas de incubación. Se observó un máximo de actividad a 40°C, muy próximo a la temperatura a la que se lleva a cabo el suero en la técnica usada en este trabajo.

FIG. C

Estabilidad de la coloración obtenida al reaccionar las hidrazonas -- con el hidróxido de sodio.--

El tiempo de reacción entre estos dos componentes no es crítico: la coloración de las hidrazonas fué la misma en las lecturas -- que se hicieron del problema desde 10 minutos antes del tiempo indicado por el método hasta veinticinco minutos después.

Resultados obtenidos al variar el tiempo de reacción de la 2,4-dinitrofenilhidrazina para formar las hidrazonas del producto .

Se ve una ligera tendencia de la densidad óptica a aumentar -- a medida que se alarga el tiempo; sin embargo no es considerable en -- 20 minutos más de reacción. Puede dejarse este tiempo sin que los resultados se alteren.

Tabla de Valores Normales.

Resultados en unidades de transaminasa obtenidos en 130 sueros de personas normales. Métodos de Rietman y Frankel.

Núm.	Nombre	Sexo	Edad	Peso	U. de T.
1	G.H.	F	26	50	14
2	V.L.				15
3	M.C.	M	37	50	13
4	H.G.	M	46	73	15
5	F.G.	M	38	76	14
6	E.G.	M			12
7	O.S.	M	34	66	11
8	J.M.	M			14
9	R.R.	M	45	70	20
10	O.R.	M	38	68	12
11	M.M.	F	16	58	14
12	F.M.	F	18	65	8
13	F.I.	M	35	65	22
14	M.M.	M	25	77	18
15	A.T.	M	21	68	22
16	A.V.	M	21	68	19
17	M.V.	M	33	64	17
18	J.C.	M	34	76	21
19	I.C.	M	32	75	22
20	D.S.	M	16	61	15
21	A.L.	F	20	65	25
22	F.A.	M	26	75	16
23	J.R.	M	36	84	13
24	M.S.	F	33	68	9
25	G.L.	F	23	66	25
26	S.G.	M	18	60	11
27	B.B.	M	25	65	11
28	R.P.	M	28	84	16
29	P.R.	M	26	66	16
30	J.C.	M	21	85	17
31	A.V.	M	34	64	17
32	E.C.	F	31	80	13
33	J.M.	M	20	72	14
34	R.R.	M	25	72	13
35	P.O.	M	19	62	9
36	B.O.	M	23	56	17
37	M.S.	M	23	54	18
38	V.T.	M			21
39	S.P.	M	18	56	16
40	A.R.	M	29	75	17
41	N.V.	M	22	55	16

Núm.	Nombre	Sexo	Edad	Peso	U. de T.
42	F.O.	M	39	80	29
43	C.L.	F			10
44	M.G.	M			16
45	V.B.	M	19	68	15
46	S.C.	M	36	85	17
47	C.M.	M	20	65	17
48	A.M.	F			12
49	G.M.				22
50	A.S.	M	22	64	11
51	C.M.	F	26	90	20
52	S.B.	M			17
53	J.L.	M	18	57	18
54	R.F.	M	23	65	20
55	D.S.	M			20
56	C.B.	F	39	66	16
57	M.L.	F	21	52	15
58	J.M.	M	34	66	14
59	C.C.	M			12
60	B.A.	M	30	55	12
61	M.P.	M	25	66	20
62	G.H.	F	33	75	39
63	S.P.	M	18	56	18
64	C.B.	F	39	66	16
65	H.F.	M			24
66	F.R.	M	21	65	10
67	M.T.	M			28
68	S.R.	F	18	52	14
69	J.P.	M	23	68	13
70	H.E.	M	20	75	10
71	R.R.				17
72	C.M.	M			25
73	J.C.	F	29	78	32
74	E.H.	M	20	65	12
75	C.L.	F			14
76	S.A.	M	15	51	18
77	P.N.	M	29	64	18
78	M.J.	F	29	58	19
79	A.M.	M	29	78	19
80	J.C.	M	20	77	16
81	E.J.	M	23	65	24
82	F.J.	M	20	70	23
83	S.V.	M	18	65	17
84	J.R.	M	21	55	25
85	R.L.	M	26	62	18
86	R.R.	F			17
87	R.I.	M	22	73	26
88					19

Núm.	Nombre	Sexo	Edad	Peso	U. de T.
89					25
90	E. B.	M			10
91	C. N.	M	28	84	13
92	J. R.	M			11
93	J. M.	F			13
94	M. A.	M	29	78	16
95	J. C.	M	23	66	12
96	E. J.	M	22	60	19
97	F. J.	M	25	70	15
98	S. V.	M	20	70	9
99	J. R.	F	30	60	15
100	L. H.	M	25	62	13
101	B. R.	M	30	60	11
102	R. I.	M			15
103	J. I.	F			15
104	C. M.	M			17
105	V. Z.	M			13
106	D. G.	M	21		21
107	F. M.	M			14
108	E. C.	M			7
109	L. V.	M			9
110	R. L.	M			9
111	M. F.	M			20
112	A. P.	F			14
113	R. S.	M			25
114	S. C.	M			16
115	M. V.	F			28
116	G. L.	M			21
117	S. T.	M			32
118	R. R.	M			22
119	V. R.	M			33
120	J. G.	M			20
121	R. R.	M			15
122	A. M.	M			26
123	S. G.	F			18
124	L. A.	M			25
125	G. R.	M			22
126	V. A.	M			21
127	R. T.	F			24
128	F. S.	M			41
129	S. T.	F			13
130	J. M.	M			16

cálculo de la desviación tipo-

Se calculo aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Desviación estandard} = \sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N-1}} = 5.6$$

Se aplicó esta fórmula, en lugar de la anterior que se usó para calcular la precisión del método, porque se evitan las numerosas restas necesarias para obtener la desviación de la media. El resultado que se obtiene al final es el mismo.

valores normales.-

El margen de las cifras normales que obtuvieron Reitman y Frankel para este metodo fué de 8 a 40 unidades, con un promedio de la diferencia con la media de -0.4 y una desviación tipo de ± 4.9 . El valor promedio normal que se obtuvo en este trabajo fue de 17 unidades, con una desviación tipo de 5.6. El valor máximo fue de 41 unidades y el mínimo de 7.

O T R O S M E T O D O S .

Cromatográfico.-

Se mide la cantidad de glutamato formado después de un periodo de incubación, por cromatografía en papel, usando ninhidrina para su estimación (7).

Electroforético.-

Se analizan las proteínas por electroforesis en papel para separar con la fracción alfa, la actividad de la transaminasa glutámico-oxalacética. Esta fracción se incuba con el substrato conveniente para determinar su actividad transaminásica ya sea por la formación de aspartato, que se estima cromatográficamente, o bien, por el método de Rietman y Frankel midiendo la hidrazona del oxalacético sintetizado (12).

Fluorométrico.-

Larsen T y Hansen P reportan una técnica fluorométrica para la determinación de la transaminasa pirúvica y que puede ser también aplicada a la oxalacética. En su técnica miden la formación de DPNT, en un sistema semejante al usado en el método Karmen, por la fluorescencia que produce su producto de condensación con metil etil cetona (13).

C O N C L U S I O N E S .

El método propuesto por Karmen que se ensayó en primer término, tiene como ventaja el de ser altamente específico, pero resulta costoso por el uso del reactivo pPNH y la preparación enzimática de deshidrogenasa málica y además requiere el uso de un espectrofotómetro caro y no común en los laboratorios clínicos.

El método colorimétrico de Cabaud, Lepper y Wróblewski es menos específico que el anterior. La medición colorimétrica se hace con espectrofotómetros al alcance de los laboratorios clínicos, es menos costoso, pero tiene como desventaja que el tiempo de centrifugación para separar la fase de tolueno, con el que se extrae la hidrazona, algunas veces se alarga más de lo previsto.

El método de Rietman y Frankel es más sencillo en su técnica, los reactivos usados son de fácil adquisición y menos costosos y aun cuando es menos específico que los dos anteriores sus resultados satisfacen la exactitud requerida para ser aplicado a la clínica. Por estas razones ha sido el método que se sugirió para ser usado en el Laboratorio de análisis Químicos del Instituto Nacional de Cardiología.

B I B L I O G R A F I A

- 1.- Meister, A.: Advances in Enzymology, Fordham University, New York, N.Y., 1955. Interscience Publishers, INC. p 185-246.
- 2.- Braunstein, A.E., Kritzmann, M.G., Enzymology 2, 129 (1937-38)
- 3.- O'Kane, D.E., and Gunsalus, I.C.: The resolution and purification of glutamic aspartic transaminase, J. Biol. Chem. 170: 425-433, - 1947.
- 4.- Cohen, P.P.: Transamination with purified enzyme preparations, J. Biol. Chem 136: 565-584, 1940.
- 5.- S. Spiegelman, in The Enzymes, J.B. Sumner and K. Myrbäck, Eds. (Academic Press, New York, 1950) Vol. 1, p-267
- 6.- Awampara, J., and Seale, B.: Distribution of transaminases in rat organs, J. Biol. Chem. 194: 497-502 1952.
- 7.- Karmen, A., Wróblewski, F., and LaDue, J. S.: Transaminase activity in human blood, J. Clin. Invest. 34: 126-131, 1955.
- 8.- Steinberg, D., Baldwin, D., and Ostrow, B.H.: A clinical method for the assay of serum glutamic — — — — oxalacetic transaminase, J. Lab. Clin. Med. 48: 144, 1956.
- 9.- Karmen, A.: A note on Spectrophotometric assay of glutamic oxalacetic transaminase in human blood serum, J. Clin. Invest. 34: - 131-133, 1955.
- 10.- Cabaud, P., Leeper, R., and Wróblewski, F.: Colorimetric measurement of serum glutamic oxalacetic transaminase, J. Clin. Path. 26: 1101-1105, 1956.
- 11.- Stanley Reitman, M.D., and Sam Frankel, Ph. D.: A colorimetric — — method for the determination of serum glutamic oxalacetic and glutamic pyruvic transaminases, Am. J. Clin. path. 28: 56-63, 1957.

- 12.- Sevela, M.: Determination of transaminase activity of serum protein fractions separated by paper electrophoresis, *Nature, Lond.* 181 (4613): 915-916, Mar. 1958.
- 13.- Lanrsen T From Hamsen P.: A fluorometric method for measuring - the activity in serum of the enzyme glutatamic pyruvic transaminase, *Scand. J. Clin. Lab. Invest.* 10 (1): 53-58, 1958.