44
2 ej.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**TERAPEUTICA DE MANIFESTACIONES BUCALES
EN EL
SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA**

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

CIRUJANO DENTISTA

P R E S E N T A :

MARIA JOSEFINA CAMPOS VARGAS

MEXICO, D F.

1992

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

INTRODUCCION

I	GENERALIDADES DEL SINDROME	1
A.-	VIROLOGIA	4
B.-	MANIFESTACIONES CLINICAS	11
II.-	INFECCIONES MICOTICAS	17
A.-	CANDIDIASIS O MONILIASIS ORAL	18
B.-	HISTOPLASMOSIS	22
C.-	GEOTRICOSIS	22
D.-	CRIPTOCOCOSIS	23
III.-	INFECCIONES BACTERIANAS	24
A.-	GINGIVITIS ASOCIADA A VIH	25
B.-	PERIODONTITIS ASOCIADA A VIH	25
C.-	ESTOMATITIS NECROSANTE ULCEROSA	26
D.-	MICOBACTERIUM AVIUM-INTRACELULAR	26
E.-	ESTOMATITIS POR KLEBSIELLA	27
IV.-	INFECCIONES VIRALES	28
A.-	HERPES SIMPLE	28
B.-	HERPES ZOSTER	29
C.-	LEUCOPLASIA PILOSA	29

V.-	NEOPLASIAS	36
A.-	SARCOMA DE KAPOSTI	37
B.-	LINFOMA No HODCKIN	39
C.-	CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	42
VI.-	OTRAS ENFERMEDADES IDIOPATICAS	
A.-	ULCERA AFTOSA RECURRENTE	44
B.-	PURPURA TROMBICITOPENICA IDIOPATICA	45
C.-	XEROSTONIA	48
D.-	AGRANDAMIENTO DE GLANDULAS SALIVALES	49

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFIA.

INTRODUCCION

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es -- una enfermedad infecto-contagiosa descrita por los centros -- de Control de Enfermedades de Estados Unidos en 1981 con lo -- que se introdujo un nuevo complejo clínico de la medicina -- actual.

La enfermedad presenta tres grandes problemas intimamen -- te relacionados entre sí. El primero es el agente causal del -- mismo. El segundo que sigue inexorablemente al primero, pero -- con un retardo de varios años, es la enfermedad del SIDA, ya -- que a diferencia que la mayoría de las enfermedades infeccio -- sas en las cuales los síntomas aparecen días o semanas des -- pues del contagio, el SIDA puede presentarse años y probable -- mente desenos después de la infección inicial con el virus. -- Finalmente el tercero de los problemas lo constituye la res -- puesta social, cultural, económica y política hacia el SIDA.

El agente causal del SIDA es un retrovirus conocido co -- mo Virus de la Deficiencia Humana (VIH) el cual se transmite -- por contacto sexual, sangre o sus derivados, y de madres a -- hijos, no siendo privativo de grupo humano alguno. Dentro -- del organismo, el VIH infecta y daña células del sistema in --munológico, del tejido nervioso, del sistema neuroendócrino -- y de los vasos sanguíneos, favoreciendo el desarrollo de de --fectos inmunológicos, trastornos neuropsíquicos y neoplasias -- de tejido linfoide y vascular.

La enfermedad presenta una amplia gama de manifestaciones que van desde una infección asintomática hasta el síndrome completamente manifiesto. Se calcula que cerca del 60% de los individuos infectados pueden permanecer asintomáticos durante seis o más años y que durante ese tiempo son capaces de transmitir la infección y la única forma de identificarlos es por el exámen de laboratorio que detecta anticuerpos anti VIH. La sobrevida de los pacientes con la enfermedad completamente establecida es de menos de dos años.

Ante este problema de salud mundial, es necesario atacar en dos frentes: primero, estableciendo medidas de salud pública para prevenir y detener la propagación del SIDA y segundo, favoreciendo la investigación científica que permita avanzar en el conocimiento de su agente causal y de su mecanismo de acción con el objeto de lograr un tratamiento y alguna vacuna capaz de curar y prevenir la enfermedad.

1 GENERALIDADES DEL SINDROME

A.- VIROLOGIA

B.- MANIFESTACIONES CLINICAS EN GENERAL DEL SINDROME.

I.- GENERALIDADES DEL SINDROME.

ORIGEN DEL SIDA.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se re-
dió a conocer en 1981, el cual se introdujo como un nuevo -
complejo clínico en la medicina actual.

Esta información apareció en 1981, en la revista "Repor-
te Semanal de Morbilidad y Mortalidad" del Centro de Con --
trol de Enfermedades de Atlanta (USA) y consistió, en el re-
porte sobre cinco hombres jóvenes homosexuales afectados por
una rara forma de neumonía por Pneumocistis Carinii, admiti-
dos en tres hospitales de los Angeles entre octubre de 1980-
y mayo de 1981. Unas pocas semanas mas tarde la misma revis-
ta informó sobre un aumento en el número de Sarcomas de Kapo-
si en hombres jóvenes de Nueva York y California.

Para el tres de julio de 1981 se habian reportado 26 ca-
sos de Sarcoma de Kaposi, todos en homosexuales. Siete de es-
tos pacientes también habian sufrido Neumonía por Pneumocis-
tis Carinii.

Estas publicaciones de 1981, fueron las primeras des-
cripciones de una epidemia que ha ganado importancia mundial
Sin embargo, se han identificado en retrospectiva casos an--
tes de 1981.

Por ejemplo, el de una Médico Danesa quien trabajó como
Cirujano en Zaire (Africa) desde 1972 y regresó a su país en
1977 con una enfermedad indeterminada consistente en diarrea
crónica, linfadenopatias y neumonia. Posteriormente a su ---
muerte, se comprobó que sus transtornos habian sido causados
por infección de VIH, enfermedad muy prevalente en Zaire don
de ella trabajó.

Al observar que la mayoría de los casos inicales de es-
te nuevo Síndrome se daba en varónes homosexuales, se pensó,
lógicamente que éste Síndrome debía estar relacionado con un
determinado modo de vida.

En las décadas de 1960 y 1970, la Revolución Sexual lle
vó a una mayor aceptación social de la homosexualidad.

La proliferación de saunas y otros lugares para contag-
tos homosexuales produjeron un incremento de promiscuidad y
determinados segmentos autoseleccionados de la población ho-
mosexual masculina, aumentó el número se contactos sexuales,
a veces de forma indiscriminada. Debido a ello, no es sor --
prendente que consideraran determinados factores como cau --
sas potenciales del SIDA, por ejemplo, la frecuente exposi -
ción al esperma, la exposición del recto al semen, a las am

pollas de nitrito de amilo o de butilo utilizadas para estimular la capacidad sexual. Sin embargo, a medida que se hizo evidente que el SIDA era una enfermedad nueva, muchas de estas formas de comportamiento cambiaron sólo en sentido relativo.

En un período breve, comenzaron a describirse casos de SIDA en otras poblaciones, como; drogadictos por vía intravenosa y hemofílicos y aunque estos grupos no habían sufrido necesariamente una exposición a las ampollas de nitrito de amilo o butilo, a frecuentes dosis de semen por vía rectal, se pensó, que, al igual que los homosexuales masculinos, podrían haberse visto expuestos a frecuentes dosis inmunostimulantes de proteínas extrañas y antígenos histicos.

En el caso de los hemofílicos, se pensó en la responsabilidad de los preparadores de los factores de la coagulación obtenidos a partir de la mezcla de sangre de un gran número de donantes.

En lo que se refiere a los drogadictos por vía intravenosa el aumento de la exposición a antígenos histicoextraños, podría deberse al uso de agujas sucias y contaminadas, por pequeñas cantidades de sangre de usuarios anteriores. Se observó, que incluso en ausencia de un SIDA clínico los hemofílicos y drogadictos por vía intravenosa asintomáticos presentaban una inversión del cociente de linfocitos T colaboradores y supresores, lo mismo que sucedía en los enfermos de

SIDA y en una determinada proporción de varones homosexuales promiscuidos asintomáticos.

Con una visión retrospectiva, parece que en los pacientes no infectados por el VIH ello es consecuencia sobre todo, el aumento de linfocitos T supresores y no a disminución de los T colaboradores como ocurre en los pacientes con SIDA y en los portadores de VIH con enfermedad progresiva. El incremento de células T supresoras se debe, probablemente a la - frecuente estimulación antigénica.

Inmediatamente despues, se pensó en la existencia de -- SIDA asociado a transfusiones sanguíneas. Se sospecho la existencia de estos casos debido a que algunos individuos con -- SIDA clínico no mostraban ninguna característica de los, grupos de riesgo antes definidos; homosexuales, hemofilia o drogadicción por via intravenosa. (3), (5), (11).

A.- VIROLOGIA.

El SIDA es un síndrome clínico caracterizado con infecciones oportunistas y con recurrencias malignizadas en la -- gente relativamente sana, como resultado de una profunda deficiencia de los linfocitos T₄ llamados cooperadores inducidos por una infección a partir del virus VIH.

ETIOLOGIA INFECCIOSA DEL SIDA.

Actualmente tenemos dos retrovirus humanos; VIH-1 y el VIH-2, han sido reconocidos como agentes etiológicos para el desarrollo del SIDA.

EL AGENTE CAUSAL.

Pertenece al grupo de los retrovirus, que almacenan su información genética en una forma especial de RNA no compatible con la estructura genética celular; por ello, debe transcribir dicha información a otra molécula capaz de ser leída por la célula parasitada y convertida a productos virales; esto se logra gracias a una enzima viral que tiene por función transcribir la información viral de forma RNA a forma DNA: debido a que la enzima se conoce como transcriptasa reversa.(3) (5)

PATOGENESIS

Los retrovirus son RNA, virus que poseen la enzima -- transcriptasa reversa, la cual es capaz de sintetizar DNA en copia viral, a partir de un genoma, utilizando toda la maquinaria de la célula afectada para toda su sintetización.

Los receptores CD₄ junto con los linfocitos (cooperadores) son mucho mas susceptibles a la infección que los macrófagos y las células de origen neural, por lo tanto permiten una mejor replicación viral, el VIH aparece para ser el simulador linfotrópico de retrovirus y patológicamente se ree -

samban para replicarse. En la célula huésped el DNA copiado a partir de un genoma viral es insertado dentro del material genético de la célula huésped.

Esto puede tener dos caminos:

- 1.- En una forma latente.
- 2.- Inducir la síntesis de una nueva partícula viral.

Este proceso que resulta eventualmente mas seguro.

El estímulo de la replicación viral no ha sido totalmente bien definido, pero probablemente consiste en un antígeno capaz de incluir la diferenciación terminal de la célula huésped. La respuesta inicial de la célula huésped no es específica, con la estimulación de células beta, seguidas por un número elevado de los llamados linfocitos supresores y gradualmente declinan en el número de células T CD.

Por lo general las células beta empiezan a funcionar anormalmente ocurriendo esto como una muestra de la presencia de gamoplastia policlonal y trombocitopenia himune, sin embargo el efecto inmunológico y predominante es una deficiencia severa celular inmune. (3) (5) (11)

COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL VIH

Los principales componentes del VIH son:

Envoltura, Nucleocápside y enzimas.

El material hereditario consta de nueve genes formados por RNA o DNA, recubiertos de núcleo proteínas rodeados de una capa protéica (Capside y de una envoltura constituida -

tanto por elementos propios del virus (glucoproteínas), como elementosprovenientes de la membrana de la célula parasitada los cuales se reincorporan al virus durante su salida.

CICLO DE VIDA DEL VIH.

Debido a que ambos virus de la inmunodeficiencia poseen en un mismo tipo de ácido nucléico (RNA) y carecen de citoplasmapara producir su propia energia y elaborar sus propios componentes , únicamente pueden vivir y multiplicarse en el interior de la célula huesped; por tal motivo son considerados " Parásitos intracelulares obligados".

Para que el VIH penetre en las células y se multiplique en su interior, debelleverse a cabo los siguientes Pasos:

- 1).- Reconocimiento celular. 3.- Entrada
- 2).- Adhesión 4.- Formación de provirus
- 5.- Integración del provirus al gema celular.
- 6.- Biosíntesis de los componentes virales.
- 7.- Ensamblado y 8.- Salida.

Los primeros cinco pasos constituyen la primera mitad del ciclo de vida del VIH y conducen al establecimiento de la enfermedad, los siguientes pasos representan la mitad del ciclo de vida del virus y conducen a la enfermedad.(3) (5)- (11)

MECANISMOS DE TRANSMISION DEL VIH.

- 1.- Sexual (Tanto homosexuales como busexual)
- 2.- Sanguíneo (fundamentalmente a través de transfusiones - de sangre y derivados).
- 3.- Perinatal (durante el embarazo, el parto y el puerperio)
- 4.- Transplante de tejidos u órganos).

INACTIVACIÓN DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA.

Por el hecho de que la envoltura es sumamente rica en lípidos puede ser fácilmente degradable, por diversos procedimientos de limpieza utilizados en forma rutinaria como el agua y el jabón, los blanqueadores caseros (hipoclorito de sodio) el alcohol al 70 grados y el calor; estos procedimientos son útiles cuando se aplica a superficies inertes, pero desafortunadamente esto no sucede cuando el virus se encuentra dentro del organismo (3) (5) (11)

CICLO DE VIDA DEL VIH

Ciclo de Vida del VIH

Reconocimiento de la célula que va a atacar (1), adherencia al receptor celular (2), entrada del núcleo cápsida de al citoplasma (3), formación de ADN viral (provirus) a partir del ADN viral original, por acción de la transcriptasa reversa (4), - integración del virus a los cromosomas de la célula (5), biosíntesis de los diversos componentes del virus (6), ensamblado y empaquetado de los componentes virales a nivel de la membrana de la célula parasitada (7), salida del virus por gemación (8).

B.- MANIFESTACIONES CLINICAS.

La infección por el VIH en el adulto progresa en cuatro etapas distintas, la última de las cuales se conoce como -- SIDA.

INFECCION AGUDA POR VIH

La mayoría de los individuos que cursan por esta enfermedad desarrollan anticuerpos antivirales. las primeras seis -- semanas de la infección, con una variación de dos semanas -- hasta un año, sin presentar manifestación alguna, sin embar-- go el 10% de estos pacientes presentan, de tres a seis sema-- nas después de la infección, una enfermedad, la mononucleo-- sis infecciosa, caracterizada por cefalgia, fiebre, artral -- gia, mialgia, manifestaciones orofaríngeas, erupción cutánea maculopapular, dolor abdominal, diarrea, artropia y esplenomegalia, no presentan cambios inmunológicos detectables.

El cuadro desaparece en forma espontánea en un lapso menor a tres semanas y no existe tratamiento específico.

INFECCION ASINTOMATICA.

Dentro de este grupo se incluye a aquellos individuos -- que se sabe están infectados por VIH y no presentan evidencia de la enfermedad; generalmente no muestran cambios inmunológicos detectables por el laboratorio, un 60 % puede conti -- nuar asintomático por un lapso de seis años; el resto evoluciona a otras etapas de la infección.(3) (5) (11)

LINFADENOPATIA GENERALIZADA.

De un 25 a 40% de los individuos infectados asintomáticos llegan a esta etapa en los primeros cinco a seis años, pertenecen a este grupo aquellos pacientes con consecuencias de infección VIH (demostrada por el laboratorio) presentan adenomegalia en dos o mas sitios extrainguinales durante mas de un mes. Los gánglios linfáticos mas afectados son los cervicales, axilares y occipitales, aunque tambien pueden estar crecidos los submaxilares y otros. Los ganglios miden de 1 a 5cm, son movibles (fluctuantes) y tienden a ser dolorosos.

Esta clasificación propuesta por CDC, acepta de manera general que los siguientes rubros de la clasificación comprenden al SIDA: enfermedad constitucional, encefalopatía por VIH, infecciones oportunistas y neoplasias asociadas con infección por el VIH. Cerca de 70% de los individuos infectados por VIH presentan alguna forma de trastorno neuropsiquiátrico; alrededor de 60% desarrolla infecciones oportunistas un 30% cursa con neoplasias y menos de 10% presenta tanto infecciones oportunistas como neoplasias. (5) (11)

ENFERMEDAD CONSTITUCIONAL.

La enfermedad constitucional debida a infección por VIH se caracteriza por: 1) pérdida involuntaria de peso mayor a 10% del peso habitual del individuo. 2) fiebre documentada en forma intermitente o constante durante 30 días o mas.

(tres o mas evacuaciones líquidas al día)

ENCEFALOPATIA POR VIH.

pertenecen a este grupo aquellos individuos infectados por el VIH que cursan con daño neurológico en ausencia de -- otros padecimientos que lo provoquen; los trastornos neurológicos del sistema nervioso inducidos por el VIH se clasifican en: 1) demencia asociada con el SIDA, 2) meningoencefalitis aguda aséptica, 3) meningitis crónica, y 4) trastorno -- del sistema nervioso periférico.

INFECCIONES SECUNDARIAS.

Debido al daño inducido por el VIH sobre la población de linfocitos CD₄ esenciales para la integridad del sistema inmunológico celular, se pierde progresivamente la inmunidad contra aquellos microorganismos que son parásitos intracelulares; esto permite que el paciente severamente infectado -- por el VIH desarrolle infecciones secundarias. (5) (11)

MANIFESTACIONES ORALES ASOCIADAS CON VIH.

El VIH induce defectos inmunológicos que permiten el desarrollo de infecciones oportunistas y neoplasmas, la boca es particularmente susceptible a la enfermedad relacionada con el VIH y una gran variedad de lesiones orales, incluyen algunas nuevas que han sido descritas en asociación con la epidemia, el tiempo desde la infección con VIH para el desarrollo del SIDA es impredecible y un estudio sugiere que puede variar la relación entre el tiempo de infección de VIH y la aparición de lesiones orales pueden presentar una diagnosis del SIDA o pueden ser la primera característica clínica de inmunosupresión, los tipos de lesiones orales vistos en la infección del VIH pueden ser clasificados en : micóticas-bacterianas, virales, neoplasmas y lesiones idiopáticas.

De las enfermedades micóticas la mas común de las cuales es la Candidiasis.

Varias enfermedades de origen bacterial han sido descritas en asociación con la infección de VIH. Estas incluyen reportes de casos de lesiones orales de Micobacterium Avium-intracelular y Klebsiella Neumonie. (2)

TABLA I GUÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES OPORTUNISTAS
EN LA INFECCION CON EL VIH

INFECCION	REGIMEN
COCCIDIOIDOMICOSIS	AMOFOTERICIN B (0.4-0.6 mg/kg/día IV) ó Ketoconazol (400mg/día oralmente)
CRIFTOCOLOSIS	Amfotericin B(0.4-0.6 mg/kg/día IV) con o sin flucito--sin (75-100mg/kg/día oralmente) por 6 semanas ⁺ ó fluco--nazol (200mg/día oralmente)
HISTOPLASMOISIS	Fluconazol (200-400mg/día oralmente ó IV), Ketoconazol--(400mg/día oralmente) ó Itraconazol (200mg/día oral--mente).
KLEBSIELLA PNEUMONIAE	Piperacilin, Cefotazidim, ó Cefoxetamin (2gm cada 6-8hrs IV) ó Ceftriaxon (2gm. cada 6 hrs. IV) y aminoglicoside
PROTEUS MIRABILIS/HAEMOPHILUS INFLUENZAE	Igual que K.P. ó Cefuroxim (1-5-3gm cada 8hrs. IV), y - Aminoglicoside ⁺
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	Piperacilin (4gm cada 6 hrs IV) ó Cefotazidime (2gm - - cada 8 hrs. IV) y Aminoglicoside ⁺
SALMONELA O SHIGELLA	Ampicilina (4-8 gm/día oralmente), Co-trimazol (7mg/kg) ó Ciprofloxacilina (250-750 mg oralmente dos veces al - día)

II INFECCIONES MICÓTICAS.

- A.- CANDIDIASIS O MONILIASIS ORAL.
- B.- HISTOPLASMOSIS.
- C.- GEOTRICOSIS.
- D.- CRIPTOCOCOSIS.

II INFECCIONES MOCOTICAS.

La micología, es el estudio de las infecciones fungoi - des, los factores de nuestro sistema contribullen a contraer las infecciones causadas por hongos, ya que estos viven li - bremente en el suelo como restos vegetales en putrefacción y escretas de pájaros propiciando un foco de infección difícil de controlar.

La infección secundaria se adquiere por inhalación y en pocos casos por infiltración traumática. El foco primario -- suele estar en el pulmón y la infección se disemina por via - hemática y menos frecuentemente por extensión directa.

Se cree que se puede ser lábil con previos tratamientos de antibióticos, corticoesteroides, medicamentos hormonales - o padecer estres. (8) (12).

A.- CANDIDIASIS O MONILIASIS ORAL.

La candida bucal es una característica muy prevalente y ocurre en casi el 75% de los pacientes positivos VIH. Mas -- aún entre las personas de los grupos de riesgo puede ser de valor predecible para el subsecuente desarrollo del SIDA.

Por lo tanto el Odontólogo debe estar al pendiente de -- posibles complicaciones al descubrir candidiasis bucal en -- forma continua en personas aparentemente sanas.

En esta enfermedad se han definido cuatro tipos.

- 1.- Seudomembranosa
- 2.- Hiperplásica.
- 3.- Eritematosa (Atópica).
- 4.- Queilitis Angular.

1.- La Candidiasis de tipo Seudomembranoso está caracterizado por la presencia de unas placas amarillentas cremosas sobre una mucosa normalmente roja, que al raspar la placa blanca puede ser removida para revelar la superficie sangrante. Este tipo de candidiasis puede involucrar cualquier parte de la mucosa pero más frecuentemente afecta al paladar, mucosa labial, bucal y dorso de la lengua.

2.- El tipo Hiperplásico está caracterizada por placas blancas que no pueden ser removidas al rasparse, la localización mas común es la mucosa bucal. En contraste para pacientes no infectados por VIH, en queines la Candidiasis Hiperplásica -- es mas a menudo localizada en las comisuras, y es raramente afectada en pacientes con VIH, consiste en placas blancas --

fuertemente adheridas a la mucosa.

3.- El tipo Eritematosa (Atópica) se caracteriza por una --
aparición roja, la intensidad del color puede variar desde
roja a unas manchas rosadas, las localizaciones más comunes
son; el paladar y el dorso de la lengua, puede también apare
cer como áreas punteadas de la mucosa bucal, usualmente no -
presenta síntomas clínicos manifiestos.

4.- El tipo de candidiasis Queilitis Angular, en los ancianos
no es una lesión inusual y puede ser debida a anemia o pérdi
da de la dimensión vertical oclusal o deficiencias de vitami
nas.

La lesión está caracterizada por fisuras desde los ángu
los de la boca, a menudo, asociadas con pequeñas placas blan
cas. En la actualidad es reconocido el factor etiológico de
la Candida Albicans.(7)

TERAPEUTICA DE MANIFESTACIONES MICOTICAS.

El tratamiento para la candidiasis puede ser con medica
ción tópica o sistémica.

Los agentes antimicóticos se incluyen en las tablas de
medicamentos.

TABLA II TRATAMIENTO ANTIMICOTICO DE CANDIDIASIS ORAL EN INFECCIONES DE VIH

MEDICAMENTO	COMENTARIO	DOSIFICACION ORAL
AMFOTERICINA^x	Tópicamente activo; absorción despreciable tracto GI; efectos laterales en grandes dosis.	10-100 mg cada 6hr ⁺
FLUCONAZOL	Reducir la dosis en enfermedad renal. No recomendado para niños o durante el embarazo o lactancia. Aumenta la warfarina, sulfonilureas y fenitoin; actividad reducida por rifampicin; puede causar náuseas, diarrea, salivado o dolor de cabeza.	50-100 mg una vez al día
NISTATINA^x	Tópicamente activo; absorción despreciable del tracto GI.	500,000 U. Losenge, 100,000 U en pastillas ó 5 ml. de - - - 100,000 U/ml. de suspensión - cada 6hr.
MICONAZOL^x	Tópicamente activo: también tiene actividad antibacteriana; absorción despreciable del tracto GI. teóricamente mejor antimicótico para tratar la estomatitis angular.	250mg en tabletas c/6hr. ó 25 mg/ml de gel como 5ml o/6hr.

Tabla II TRATAMIENTO ANTIMICOTICO DE CANDIDIASIS ORAL EN INFECCIONES DE VIH

MEDICAMENTO	CONVETARIO	DOSIFICACION ORAL
-------------	------------	-------------------

KETONAZOL [†]	<p>Contraindicado en el embarazo y enfermedad del hígado; puede causar náuseas, sarpullido, erupción y daño al hígado (observar el funcionamiento del hígado); raramente causa anafilaxis, trombocitopenia ó ginecomastia; realiza la nefrotoxicidad del ciclosporina; -- realiza la cumarina; interactiva con el rifampicina y puede potenciar agentes hipoglicémicos, el foricoin y los medicamentos que reducen el ácido gástrico.</p>	<p>200-400 mg una vez al día con la comida</p>
------------------------	---	--

GI -- Gastro Intestinal

* -- Disuelto lentamente en la boca

† -- Tratamiento por 14 días solamente

+ -- Raramente 0.3-0.6 mg/kg por día intravenosamente, puede causar reacciones febriles nefrotoxicidad y otras reacciones.

B.- Histoplasmosis.

Infección endémica, la etiología es el histoplasma *Capulatum*, encontrado en el suelo contaminado, hongo dismórfico, en forma de levadura, en forma de hifa tiene alta infectividad, la infección se transmite por inhalación de aire.- Las manifestaciones clínicas; granulomas e infecciones localizadas en individuos con SIDA. Los síntomas son inespecíficos; fiebre, escalofrío, sudoración, pérdida de peso, náuseas. Las lesiones cutáneas y el desarrollo de adenopatías ha sido a veces los cuadros iniciales mas prominentes.(7)

TERAPEUTICA

- Anfotericina B, con Flucitosina, Ketaconazol.

C.- GEOTRICOSIS.

Se le ha dado el nombre de Geotricosis a ciertos trastornos de la boca, de los bronquios y del tubo digestivo en los cuales se ha aislado *Geotrichium Candidum*.

Se ha demostrado que este hongo es patógeno para el hombre, pero a la fecha todavía se duda de la validez de la Geotricosis como entidad patológica.

Habita normalmente en la faringe y en el intestino, puede proliferar localmente produciendo colonias blancas visibles sobre la mucosa. Asimismo puede aparecer en los tejidos desvitalizados en las secreciones nasofaríngeas, del árbol -

bronco pulmonar y del colon, aunque probablemente no como pa
tógeno primario.

Manifestaciones Clínicas.

Se ha publicado que la Geotricosis causa cavidades pul-
monares y colítis. En la Geotricosis broncopulmonar el pa --
ciente expulsa al toser un espito gelatinoso, teñido con san
gre, y en raros casos se han descrito cavidades de pared del
gada parecida a la de la coccidioidomicosis. (1)

Tratamiento.

Es a base de Anfotericina B con flucitosine, Ketoconazol

D.- CRIPTOCOCOSIS.

El agente etiológico es el hongo C. Neoformans, hongo -
monoformo con levadura de tamaño variable con brotes simples,
se localiza en todo el mundo, encontrandolo en el suelo in -
fectado por excremento de pichón, infección por inhalación -
de levaduras, existen infecciones ocultas pulmonares o lesio
nes de órganos en pacientes con VIH, la presentación clínica
es meningitis, fiebre, cefaleas, el 50% de los pacientes su-
fren náuseas y vómito. (1) (7)

Tratamiento.

A Base de Anfotericina B con Flucitosine, Ketoconazole.

III INFECCIONES BACTERIANAS.

- A.- GINGIVITIS ASOCIADA A VIH.
- B.- PERIODONTITIS ASOCIADA A VIH.
- C.- ESTOMATITIS NECROSANTE ULCEROSA.
- D.- MICROBACTERIUM AVIUM-INTRACELULAR.
- E.- ESTOMATITIS POR KLEBSIELLA.

III INFECCIONES BACTERIANAS.

Las bacterias pertenecen al genero de esquizomicetos y tienen forma de bastones, son vegetales unicelulares, corresponden a la flora normal de la boca, pero cuando actúan desfavorablemente pueden pasar a sangre originando septicemias graves.

La infección que produce el VIH origina múltiples infecciones de origen bacteriano, de gran interes para el odontólogo, que son las lesiones gingivales y periodontales; caracterizadas por la inflamación de la gingiva y mucosa alveolar - que no responden a higiene oral y sus resultantes en necrosis de tejido suave periodontal y pérdida severa de adherencia periodontal, la progresión de la enfermedad puede ser rápida a menudo ocurre en un periodo de unos cuantos días a varias semanas. (12)

A.- GINGIVITIS ASOCIADA A VIH.

Los signos clínicos de esta enfermedad incluyen: eritema y edema de la gingiva libre, a menudo presentandose como una banda roja lineal, como lesiones rojas (petequias) de la gingiva adherida y mucosa vestibular adyacente, estas áreas punteadas llegan a estar revestidas por eritema difuso de la gingiva y la mucosa alveolar como avance de la enfermedad, - el sangrado prevalece y el dolor no es usualmente asociado - en casos moderados. (2) (9)

B.- PERIODONTITIS ASOCIADA A VIH.

Etiología: hay una firme indicación de alteraciones de la flora microbiana oral, un aumento de los microorganismos- anaerobios Gram- subgingivales y la presencia de especies de Candida.

Sus características clínicas corresponden a una lesión- gingival ulcerativa necrozante aguda es super impuesta sobre una pérdida severa rápida y progresiva de la adherencia. --- Existe dolor y sangrado espontáneo y nocturnal, las lesiones severas son intensamente dolorosas y exhiben necrosis exten- siva y algunas ocasiones involucran al hueso alveolar y producen severos secuestros óseos. (6) (7) (9)

C.- ESTOMATITIS NECROSANTE ULCEROSA.

Con la aparición de la infección por VIH la ocurrencia de Gingivitis Necrosante ha alcanzado una nueva diseminación ya que ha sido diagnosticado en un gran número de pacientes infectados por VIH, con la nueva característica de crónica y recurrencia por lo que se llama Gingivitis Ulceronecrosante.

Sus características clínicas puede presentarse en forma repentina o insidiosa con sangrado al cepillado, dolor y halitosis. Los síntomas pueden desaparecer gradualmente en tres o cuatro semanas pero la condición frecuentemente ocurre.

Las encías aparecen frecuentemente rojas e inflamadas y tanto el margen de la encía como las puntas de las papilas interdentes son el asiento de una lesión necrótica amarilla-grisácea, que sangra fácilmente (papilas truncadas). La encía anterior es la mas frecuentemente afectada. Parece que la Gingivitis Necrosante en algunos pacientes con VIH tiene un curso destructivo, llevado a una pérdida de tejido blando y hueso, así como a la formación de sequestros.

La necrosis puede progresar a la mucosa palatina y faringea con exposición ósea.(6) (7)

D.- MICOBACTERIUM AVIUM-INTRACELULAR.

Provoca enfermedad diseminada en un 25 a 50 % de los pacientes con SIDA; rara vez afecta a los individuos que no están infectados por el VIH.

Se ha sabido que causa enfermedad pulmonar localizada, las manifestaciones clínicas se caracterizan por fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, debilidad, sudoración nocturna y disnea.

La respuesta del tejido puede incluir abscesos rodeados por lesiones granulomatosas.

E.- ESTOMATITIS POR KLEBSIELLA.

La Klebsiella Pneumoniae y el Enterobacterium Clocae -- han sido reportados en asociación con lesiones ulcerosas bucales en pacientes inmuno suprimidos por quimioterapia en -- cáncer. Lesiones similares se han visto en la boca de homosexuales infectados por VIH.

Estas úlceras pueden llegar a ser tan profundas que -- afectan al hueso maxilar en forma de osteítis y osteomielitis. (9) (11)

TERAPEUTICA DE LAS MANIFESTACIONES PERIODONTALES.

Se realiza desbridamiento local, con la aplicación de -- un antimicrobial tal como :

- POVIDONA-YODO y la posible inclusión de antimicóticos para tratar la Candidiasis.
- Enjuagues orales con CLOREXIDIN acuoso dos veces al día, -- ayudando grandemente a reducir el eritema gingival, el sagrado y las bolsas periodontales.
- METRONIDAZOL: 200-300mg en tabletas cuatro veces al día. durante una semana.

IV INFECCIONES VIRALES.

A.- HERPES SIMPLE

B.- HERPES ZOSTER

C.- LEUCOPLASIA PILOSA

IV INFECCIONES VIRALES.

Cualquiera de los agentes infecciosos, mas pequeños que las formas corrientes de bacterias, algunos apenas visibles y otros a veces invisibles con el microscopio ordinario, que pasan a través de los filtros, de un tamaño entre 0,2 y 0.01 μ . Se multiplican en el cuerpo animal pero no pueden ser culti-vados en medios inertes sino que requieren células vivas. (12)

A.- HERPES SIMPLE.

El virus del HS se manifiesta en la cavidad oral como enfermedad primaria y recurren, ésta puede ser o no ser -- asintomática y es seguida por una latencia de por vida, en el nervio trigémino, los pacientes son usualmente niños o personas jóvenes. Hay fiebre y malestar usualmente acompañado por linfadenopatías cervicales, luego de uno o dos días pueden ocurrir las lesiones en encía, paladar duro y en cualquier sitio de la mucosa. Las lesiones son vesículas que se rompen y se convierte en úlceras irregulares y dolorosas, que pueden infectarse secundariamente y cubrirse de costras. (6)

B.- HERPES ZOSTER.

El virus HZ produce varicela en su primer infección y zoster en infecciones posteriores. En el paciente inmuno comprometido existe el riesgo de una activación de un virus latente de la varicela. Las vasículas epiteliales formadas por el virus acaban rompiendose y formando costras, tienen una distribución unilateral. Son dolorosas a demas de pruriginosas (comezón). Aunque las lesiones son casi siempre autolimitantes, la parte mas molesta de la infección es la neuropatía por zoster con dolor asociado, que a menudo es muy intenso. (6)

C.- LEUCOPLASIA PILOSA.

Las manifestaciones clínicas de la Leucoplasia Pilosa se han observado en homosexuales positivos al VIH. Las lesiones son blancas y pueden ser de diferentes tamaños y apariencias, unilateralmente o bilaterales. La superficie es irregular y pueden verse como pliegues prominentes o proyecciones, a veces tan marcadas que semejan pelos. Las lesiones pueden ser tambien pequeñas con corrugaciones finas y en algunas áreas pueden ser suaves y planas. Se encuentran en los márgenes laterales de la lengua y algunas veces se pueden expandir hasta cubrir toda la superficie dorsal, también pueden crecer hacia la superficie ventral de la lengua, donde usualmente tiene apariencia plana. Rara vez, la Leucoplasia Velloosa puede aparecer en otras áreas como la mucosa bucal, la --

orofarínge y el piso de la boca. La causa de la leucoplasia-Velosa es desconocida. Todavía no está claro si la presencia de VEB es una causa o resultado. La leucoplasia pilosa - puede aparecer en todos los grupos infectados por VIH, aunque es más frecuente en homosexuales y bisexuales. Es de suma importancia el hecho de que tenga un alto valor de predicción con el desarrollo del SIDA.(6)

TERAPEUTICA EN INFECCIONES VIRALES DE HERPES SIMPLE Y HERPES ZOSTER.

- El ACICLOVIR: en dosificaciones orales diarias de 1-4gr en dosis divididas, en la terapia generalmente mas aceptada para infecciones de HS y varicela zoster positivas con VIH. Mantenimiento subsecuente de 200mg oralmente dos a cinco veces diario es requerido si existe la necesidad de suprimir la recurrencia.

El VHS es algunas veces resistente al Aciclovir y el Fosfocarnet ocasionalmente puede producir úlceras orales.

TERAPEUTICA DE LA LEUCOPLASIA PILOSA.

Las personas infectadas con la LP asociada con VIH pueden mejorar ocasionalmente en forma espontánea con AZT, el GANCICLOVIR y el DENSICLOVIR y si en la terapia se requiere el Aciclovir oral hasta 800mg c/6-8hs hasta por veinte días - El Desiclovir oral 250mg tres veces al día hasta por 14 días aclara las lesiones sin efectos adversos, el cual es mejor -

absorbido oralmente pero desafortunadamente la LP es muy -
recurrente.

El TRETINOIN tópico tambien puede colaborar.

La remisión quirúrgica de la lesión ha sido efectuada, pero
es difícil de efectuar y se obtiene poco éxito. (11)

TABLA III. TRATAMIENTO ANTIVIRAL DE INFECCIONES DE VIRUS HERPES Y INFECCIONES DE VIR

VIRUS	ENFERMEDAD	TERAPIA	COMENTARIOS*
VHS	Estonatitis herpética primaria	Aciclovir, 200mg. oral 5 veces/día, ó 5-13 mg. /kg. IV cada 8hr. por 10-14 días.	El aciclovir está vir- tualmente libre de efec- tos, pero pueden resul- tar virus resistentes al aciclovir; El fosarnet oralmente, 50mg./kg./día por 14-21 días, puede ser entonces lo indicado insuficiencia renal y al- teraciones en el suero - Ca ⁺⁺ ó PO ₄ ⁻⁻⁻ son efecto- adversos comunes del fosarnet.
	Infecciones herpéticas recurrentes	Se considera el aciclo- vir como de indicac - - arriba.	
HERPES	VARICELA-ZOSTER Varicela	Aciclovir, oralmente - 800mg., ó 15-30mg./kg. IV cada 8hr. por 10-14 días.	

Tabla III. Tratamiento antiviral de las infecciones por herpes en las lesiones de VIH.

Virus	Exposición	Terapia	Indicaciones*
CMV	Zoster (shingles) Úlceras bucales	Como se indica arriba- Ganciclovir, 7.5-15mg/ hr./día IV por 10-14 - días.	El tratamiento es indi- cado solamente en un - cuadro amenazante ó in- fecciones severas; pue- de causar neutropenia, trombocitopenia y eosi- nofilia y puede altera el funcionamiento del higado. El foscarnet es una alternativa.
VIRUS EPSTEIN-BARR	Leucoplasia Filosa	Aciclovir, 800mg. oral mente cada 4hr. ó des- ciclovir, 250mg. oral- mente 3 veces/día por- 10-14 días.	El tratamiento no es - usualmente requerido, las lesiones vuelven a aparecer después de su- pender el tratamiento.

TABLA IV. REACCIONES ADVERSAS POSIBLES, INTERACCIONES Y CONTRAINDICACIONES
 DE MEDICAMENTOS ANTIVIRALES UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE - -
 LESIONES ORALES EN INFECCIÓN DEL VIH

MEDICAMENTO	REACCIÓN ADVERSA	INTERACCIONES	CONTRAINDICACIONES
ACICLOVIR	Hipersensibilidad al aci- clovir o al glicol propi- leno en crema; aciclovir sistematico puede causar incremento de urea en la sangre y de los niveles de creatinina a menos que sean dados ligeramente;- Extravasación despues de IV la inyección puede -- conducir a inflamación;- Aciclovir IV puede causar reacciones neurológicas- reversibles.	Probenecid incrementa su vida al aciclovir.	Reducir la dosis en - enfermedad renal; cont- indicado en hipersensi- bilidad al aciclovir.
FOSCARNET	Nefrotóxico; cambios en- los niveles de Ca^{++} y -- PO_4^{--} en el suero, posi- ble hipoglicemia, convul- siones, reducido nivel - de hemoglobina.	Aditiva toxicidad con - agentes nefrotóxicos; -- hipocalcemia si se usa - con Pentamidina IV.	Reducir la dosis en - enfermedad hepática o renal; contraindicado en hipersensibilidad, embarazo y lactación.

TABLA IV. REACCIONES ADVERSAS POSIBLES, INTERACCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE MEDICAMENTOS ANTIVIRALES UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE - - LESIONES ORALES EN INFECCION DEL VIH

MEDICAMENTO	REACCION ADVERSA	INTERACCIONES	CONTRAINDICACIONES
GANCICLOVIR	Leucopenia, Trombocitopenia, Eosinofilia, posible carcinogenicidad y toxicidad reproductiva; función alterada del hígado la extravasación despues de la inyección-IV puede causar daño al tejido; varios sistemas nerviosos centrales acontecimientos y efectos -- sobre el sistema musculoesquelal, respiratorio o urogenital.	Aditiva toxicidad con -- Darsona, Pentamidina, - Flucitocina, Vicristina, Vinblastina, Doxorubicin Amfotericin, Co-trimoxazole, AZT; Convulsiones- con iminemen-cilastatin.	En infecciones con citomegalovirus sin amenaza de la vida o la vista. Reducir la dosis en enfermedad renal contraindicado en embarazo y lactancia, hipersensibilidad al ganciclovir leucopenias, trombocitopenia.

V NEOPLASIAS.

A.- SARCOMA DE KAPOSI

B.- LINFOMA NO HODGKIN.

C.- CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS.

V NEOPLASIA.

A menudo se denomina "TUMOR", y al estudio de estos se llama "Oncología".

Tumor es una tumefacción que pudiera ser producida, por edema o hemorrágia en tejidos, sin embargo la palabra tumor ha llegado a aplicarse casi exclusivamente a masas neoplásicas, que claro está, pueden causar tumefacción cuando están en la superficie corporal. Es muy importante la diferenciación entre neoplasias benignas y malignas. Esta clasificación se funda sobre la base de su potencial de "comportamiento" clínico. Se dice que un tumor es benigno cuando los caracteres citológicos y macroscópicos se concideran comparativamente inocuos, lo cual significa que seguirá localizado, no puede propagarse en otro sitio, y en consecuencia, suele ser susceptible de extirpación quirúrgica local y permite la supervivencia del enfermo. Sin embargo los tumores benignos pueden producir mas que abultamientos localizados, y a veces origina enfermedad grave. Un tumor benigno que ocluye en arteria vital por compresión puede ser más grave para el paciente que un tumor dérmico maligno fácil de extirpar.

Los tumores malignos se llaman en conjunto cánceres. El

calificativo "maligno" aplicado a una neoplasia, significa -- que puede invadir y destruir estructuras adyacentes y propagadas a sitios alejados para causar la muerte. Algunos se -- descubren en etapa temprana y se tratan con exito.

Desde el inicio de la epidemia del SIDA se hizo eviden te que estos pacientes tienen un riesgo superior (100 veces- mayor) de desarrollar carcinomas. Se cree que entre los facotores responsables de estas neoplasias podría encontrarse el estado de inmunosupresión en que se encuentra el paciente. (12)

A.- SARCOMA DE KAPOSI

Este es el proceso maligno que mas frecuente se encuentra en los pacientes con SIDA (SK). Puede afectar sistemas- orgánicos principales, es generalmente multicéntrico y puede ser la causa primaria de muerte. La localización mas fre -- cuente del SK es la piel, sin embargo, en casos estudiados- en grandes series, al rededor de la mitad de los pacientes- presentan SK oral.

Se manifiesta clínicamente como un proceso neoplástico multicéntrico que inicialmente empieza con máculas, pápulas o nódulos únicos o múltiples, rosados, rojos o violeta en -- la piel, generalmente se vuelven oscuras y alargadas.

Frecuentemente están involucrados el tracto gastrointestinal y los nódulos linfático, también pueden encontrarse lesiones en los pulmones, hígado, páncreas, glándulas su prarrenales bazo y testículos.

MANIFESTACIONES BUCALES.

En algunos pacientes el SK puede iniciar en la mucosa bucal, sin embargo la mayoría aparece primero en la piel.

Las diversas formas de SK del paladar, es la localización intraoral mas frecuente, la punta de la nariz es la localización favorita para las lesiones faciales.

En boca aparecen como máculas azuladas, negruscas y rojizas las cuales son usualmente planas en los estadios tempranos. En los estadios mas avanzados las lesiones se pueden poner mas oscuras, elevadas y frecuentemente lobuladas y ulceradas. La ulceración de las lesiones bucales es mas común que las lesiones ulcerativas de piel. La mucosa gingival está frecuentemente involucrada. En algunos pacientes las manifestaciones gingivales del tumor pueden tener la forma de granuloma piógeno (8) (10) (12)

TERAPEUTICA

- Terapia con radiación de un fuerte láser y/o el uso de medicamentos quimioterápicos. Las lesiones orales aisladas pueden ser tratadas con quimioterapia directa, aproximadamente 800 o 1500 CGV o equivalente en terapia fraccionada por 10 días. La mucositis y la Xerostomía son el resultado de todos los pacientes irradiados aunque las lesiones del SK retornan al menos parcialmente, existe peligro de osteoradio necrosis como en otros pacientes que han recibido quimioterapia.

- Terapia de interferón como tratamiento sistémico.
- Incisión quirúrgica , como paleativo
- Debido a la naturaleza de diseminación del SK se puede indicar tratamiento sistémico: Interferón sistémico con Blimvagin (I.V.) o Vincristina, el cual tiene la ventaja de producir escasas mielotoxicidad. El Doxorubicin y el Etoposide también han sido usados en el tratamiento sistémico, Dapsone oral 100 mg/día.

B.- LINFOMA No HODGKIN.

El linfoma No Hodgkin afecta a ganglios y órganos linfáticos, como a órganos extraganglionares y tejidos. Frecuentemente están afectados los ganglios linfáticos de cabeza y cuello, así como los tejidos extraganglionares de esta área.

El linfoma No Hodgkin es un grupo de desordenes malignos del rango de derivación linfoide en la conducta biológica que va del sistema relativamente indolente a muy agresivo.

Es predominante en hombres con mas incidencia en adultos de 50 y 70 años de edad.

Las causas de muerte en este tipo de pacientes son infecciones, falla de órganos, hemorragia y tumores diseminados. La enfermedad presenta cuatro etapas, las dos primeras corresponden a la enfermedad de Hodgkin y la tercera y cuarta etapa corresponden a la enfermedad No Hodgkin..

Para detectar en el paciente el linfoma No Hodgkin los -

procedimientos a seguir incluyen una historia y examinación - clínica médica completa, Roentgenograma de torax, exploración del abdomen y pelvis y biopsia de médula osea. El Roentgeno - grama nos indica el tamaño de los linfonodos, tambien se estu - dian las funciones del hígado (fosfatasa Alcalina, aminotrans - ferasa de aspartasa, lactados dehidratados), aspiración de mé - dula osea o biopsia de la misma nos revelan (linfoma nodular)

MANIFESTACIONES CLINICAS.

Los linfomas No Hodgkin afectan a personas de todas las - edades, desde lactantes hasta ancianos, y se presentan en am - bos sexos. El inicio de los síntomas puede ser agudo o engaño - so e incluye linfadenopatía, agrandamiento abdominal y del me - diastino y a veces aparecen síntomas constitucionales como -- fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso., se presenta - una afección extraganglionar de una amplia variedad de órga - nos, puede presentarse en sistēma nervioso central, aparato -- gastrointestinal, riñon, testículos, hueso y piel. De manera - concomitante se puede presentar en la región ganglionar y ex - tra ganglionar. Una forma de linfoma cutáneo de células T se conoce como micosis fungoides y se manifiesta como lesiones - de la mucosa bucal y de la piel facial. el lugar mas afectado es el anillo de Waldeyer, lo senos paranasales, cavidad bucal y glándula parótida.

MANIFESTACIONES BUCALES.

En muchas ocaciones la lasión es simplemente una manifes

tación de la enfermedad diseminada. Además, muchas lesiones son la única expresión de la enfermedad o el síntoma inicial de la enfermedad generalizada.

Las lesiones bucales se caracterizan por abultamientos que crecen con rapidez y después se ulceran. En algunos casos se vuelven masas grandes, fungosas necróticas, con olor fétido. El dolor es un aspecto variable.

Cuando está afectado el hueso subyacente se desarrolla movilidad dental y dolor. Se ha señalado un número de casos en los cuales se desarrolla parestesia en los nervios mentales. (8) (10) (12)

TERAPEUTICA DEL LINFOMA No HODGKIN.

Las opciones terapéuticas para linfomas están limitadas y consisten en radiación o regimenes citostáticos de baja intensidad, el tratamiento es típicamente por radioterapia a menos que las lesiones esten ampliamente extendidas entonces sería la intervención quimioterapéutica, la respuesta inicial a la quimioterapia ha sido lograda en 50% de los casos con protocolos tales como CHOP (ciclofosfamida, doxorubicin, vincristin y prednisone). por lo tanto la mayoría es usualmente temporal y el control por largo tiempo ha sido reportado solamente en unos cuantos pacientes principalmente con histología favorable en la etapa inicial de la enfermedad.

C.- CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS.

El carcinoma de células escamosas puede surgir en cualquier superficie epitelial o mucosa que consista de epitelio-escamoso o pavimentoso estratificado. Y por eso, esta forma de cáncer puede ocurrir en lengua, labios, esófago, cuello de útero o en vagina. Sin embargo la mayor parte aparece en piel, generalmente en las superficies descubiertas. Son particularmente susceptibles a otra variante de cáncer en los individuos de tez blanca. Con frecuencia los tumores van precedidos de la llamada queratosis actínica (solar), una forma de displasia y anaplasia de células epidermicas, en consecuencia, se considera que la radiación actínica es factor etiológico muy importante, pero también se han considerado arsénico y alquitran de hulla.

La inflamación crónica duradera predispone al carcinoma de células escamosas, y esta forma de cancer a veces se observa en los bordes de fístulas húmedas duraderas y en cicatrices antiguas de rayos X o quemaduras. A veces la neoplasia aparece decenios después de la lesión con rayos X o térmica.

En los casos característicos el carcinoma epidermoide o de células escamosas, comienza con un foco pequeño de aumento queratinización concomitante con algo de elevación del sitio atacado. La lesión crece progresivamente en un lapso de meses a años y produce una meseta dura algo elevada y puede alcanzar diámetro de 3 a 4 cm, y suelen acompañarse de ulceración-

central de la placa cancerosa, lo cual produce un cráter necrótico de aspecto desagradable circunscrito por bordes apilados de tumor viable. En casos descuidados el tumor puede tornarse profundamente invasor y quizá aparezca metástasis a ganglios linfáticos regionales.

MANIFESTACIONES BUCALES.

El carcinoma de células escamosas (epidermoide) es la neoplasia maligna más común de la cavidad bucal, aunque se puede presentar en cualquier sitio dentro de la boca, ciertos lugares son afectados con más frecuencia que otros. Generalmente aparece en las últimas décadas de la vida, sin embargo, se ha encontrado en todas las edades, incluso niños.

Se sospecha que los factores etiológicos externos más frecuentes en el desarrollo del carcinoma bucal son: tabaco, alcohol, sífilis, deficiencias nutricionales, luz solar (en caso de cáncer labial), diversos factores que incluyen calor en particular el proveniente de la boquilla de la pipa en el caso de cáncer de labio, traumatismo, sepsis e irritación por bordes afilados de los dientes o de las prótesis.(10)

TRATAMIENTO.

En pacientes con SIDA es poco satisfactorio, debido a la supresión del sistema inmunológico.

El tratamiento más viable es la radiación (rayos X) según el grado de extensión de la lesión y la presencia de metástasis aunque al aplicarlo se puede dañar tejido sano. El tratamiento quirúrgico puede ser exitoso.

VI OTRAS ENFERMEDADES IDIOPATICAS.

A.- ULCERA AFTOSA RECURRENTE.

B.- PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA.

C.- XEROSTOMIA.

D.- AGRANDAMIENTO DE GLANDULAS SALIVALES.

A.- ULCERA AFTOSA RECURRENTE.

La causa de UAR es desconocida, pero se cree que facto -
res hormonales, alergias a los alimentos, factores virales y -
stress han sido factores predisponentes, se ha suge-
rido una enumeración para defectos inmunocelulares en la pato
génesis, quizá los defectos locales y sistémicos en la infec
ción de VIH. Las lesiones a menudo tienen la apariencia típi-
ca de ulceraciones aftosas recurrentes, éstas son bien circun
scritas con un márgen eritematoso, algunas veces los pacien -
tes exhiben úlceras necróticas extremadamente grandes, las --
cuales son muy dolorosas y pueden persistir por varias sema -
nas, (10)

TERAPEUTICA.

Usualmente responde al uso de esteroides , en forma de -
elixir como Dexametasone 0.5mg/5ml, utilizados como lavado bu
cal de 5ml por un minuto, despues de esto es espectorado. Los
esteroides pueden tambien ser administrados mezclados para --
ser aplicados directamente a la úlcera ejm. Lidex pomada de -
0.05% Fluocinonide mezclado 50/50 y pude ser aplicada direc-

ta a las lesiones 6 veces al día.

Otras preparaciones típicas incluyen el uso de agentes antibacteriales, esta incluye Tetraciclina 250mg/5ml de agua bidestilada usadas como un enjuague bucal 4 veces al día por 4 días. O Clorhexidina 0.1-0.2% usado como enjuague bucal 2 veces al día por 4 ó 7 días. El tratamiento antimicótico debe aplicarse en conjunto con los enjuagues de Tetraciclina para prevenir la candidiasis oral, generalmente este tratamiento es mas efectivo cuando se aplica tempranamente.

B.- PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA.

Es una enfermedad en la cual existe una reducción anormal en el número de plaquetas circulantes. Cuando esto ocurre el paciente presenta hemorragias focales en diversos órganos y tejidos, incluidas la piel y las mucosas.

Se reconocen dos formas básicas de trombocitopenia:

- 1.- Primaria que es de etiología desconocida.
- 2.- Secundaria que se puede deber a una gran variedad de trastornos asociados con la reducción de la producción de plaquetas.

Se piensa que la trombocitopenia primaria, púrpura hemorrágica y púrpura idiopática es un trastorno autoinmunitario en el cual una persona se inmuniza y desarrolla anticuerpos contra sus propias plaquetas. El descubrimiento del suero en pacientes con trombocitopenia de una globulina antiplaquetaria que da como resultado una disminución en el número de pla-

quetas circulantes cuando se administra a personas normales.- Sin embargo, algunos casos parece que se debe a la ausencia - de un factor estimulador de plaquetas o de maduración de megacariocitos. La forma aguda del tipo primario de la enfermedad comúnmente se presenta en niños y a menudo después de ciertas infecciones virales, mientras que el tipo crónico es mas común en los adultos, en especial en las mujeres en edad de procrear.

Las diversas manifestaciones de la púrpura trombocitopenica primaria y secundaria son casi idénticas y por esta razón se puede describir juntas.

MANIFESTACIONES CLINICAS.

La purpura trombocitopenica se caracteriza por la aparición espontánea de las lesiones purpúricas o hemorrágicas de la piel que varían de tamaño, desde petequias que tienen el tamaño de la punta de un alfiler, muy pequeñas, rojas, hasta -- grandes equimosis purpúreas e incluso hematomas masivos. El paciente tambien tiene tendencia a magulladuras.

La epistaxis o sangrado proveniente de la nariz, es una manifestación común de la enfermedad, igual que del aparato - urinario, que da como resultado hematuria y el sangrado en el aparato gastrointestinal, que produce melena o hematuria. Una complicación posible es la hemorragia intercraneal, que provoca hemiplejia. El bazo por lo regular no es palpable. Si se - palpa, se debe sospechar de leucemia en vez de púrpura trombo

citopénica.

Los casos de púrpura trombocitopénica primaria ocurre antes de los 30 años de edad; la mayor frecuencia es antes de los diez años. Muchos de los enfermos tienen antecedentes fgmiliares de púrpura. La trombocitopenia secundaria no tiene predilección particular por una edad.

MANIFESTACIONES BUCALES.

Una de las manifestaciones prominentes de la púrpura -- Trombocitopénica, es que en la mayor parte de los casos se presenta una hemorragia gingival grave y a menudo profusa, que puede ser espontánea y con frecuencia surge en ausencia de lesiones cutáneas.

Las petequias también se ven en la mucosa bucal, comunumente en el paladar, y aparecen como numerosos grupos de manchas muy pequeñas de color rojizo, que sólo miden 1mm o menos de diámetro. En ocasiones, hay equimosis.

La tendencia al sangrado excesivo contraindica el realizar cualquier procedimiento quirúrgico bucal, en particular -- la extracción dental, hasta que se haya compensado la defi -- ciencia. (8) (10)

TRATAMIENTO.

Terapia sistémica.

C.- XEROSTONIA.

Puede no estar asociada a lesiones específicas de la mucosa oral, el efecto de la reducción de saliva puede producir efectos orales que requieren la resolución dental. Al parecer existe una relación entre el VIH y la boca seca en algunos pacientes VIH positivos.

En algunos casos los pacientes se quejan de sequedad o quemazón, pero la mucosa aparece normal. En otros casos existe carencia completa de saliva.

Cuando la deficiencia de saliva es muy intensa, puede presentar graves alteraciones en las mucosas y el paciente sufre gran malestar, la mucosa aparecerá seca y atrófica, algunas veces inflamada o, con mas frecuencia, pálida y translúcida. La lengua puede manifestar la deficiencia por atrófia de las papilas, inflamación, fisuración y agrietamiento y en los casos graves por áreas de denudación. Las úlceras dolorosas, la sensación de quemazón y el dolor de la mucosa son síntomas comunes (10)

TRATAMIENTO

A la mayoría de los pacientes sólo puede ofrecérsele alivio sintomático. También se puede administrar estimulantes salivales o cambio de medicamento sistémico o ambos. otro es Floruro tópico.

D.- AGRANDAMIENTO DE GLANDULAS SALIVALES.

La causa del agrandamiento focal se desconoce, sin embargo se cree que el crecimiento de las glándulas salivales se debe a: - Trastornos endócrinos, parotiditis, diabetes sacarina, menopausia enfermedad hepática, inanición, alcoholismo, inflamación, lesión linfoepitelial benigna. síndrome de Sjögren, adiposidad, hipertermiaoligomenorrea y síndrome de hinchazón de la parótida, síndrome aglosia-adactilia, macroglobulinemia, fiebre uveparótida, algunos medicamentos, proceso de envejecimiento.

Caractrísticas clínicas..

La hiperplasia de la glándula aplatina se presenta como una hinchazón localizada pequeña, que mide desde varios milímetros a un centímetro o mas de diámetro, localizada habitualmente en el paladar duro o en la unión de éste con el paladar blando. La superficie está intacta y firme, sésil y de color normal. Por lo regular es asintomática y el paciente puede ignorar la lesión.

En niños y adultos con infección de VIH, se han observado que usualmente involucra la glándula parótida, esto acompañado con molestias de Xerostomía, la etiología de la inflamación es desconocida.(10)

TRATAMIENTO.

Es importante extirpar las glándulas afectadas para realizar el exámen microscópico. El tratamiento ulterior es innecesario.

TABLA V DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ORAL DEL VIH

CONDICION	DIAGNOSIS	TRATAMIENTO
<u>MICOTICA</u>		
CANDIDIASIS	Apariencia Clinica Frotis Cultivo	Antimicroticos
HISTOPLASMOISIS	Biopsia Frotis Cultivo	Terapia sistematica ^x
Geotrichosis	Biopsia Frotis Cultivo	Antimicroticos Polyene
CRUPTOCOCOSIS	Cultivo	Terapia Sistematica ^x
<u>BACTERIAL</u>		
GINGIVITIS ASOCIADA-VIH	Apariencia Clinica	Remocion de placa Clorhexidina
PERIODONTITIS ASOCIADA-VIH	Apariencia Clinica	Remocion de placa, debridamiento Fovidone-Yodo Netrohidazol

TABLA V DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ORAL DEL VIH

CONDICION	DIAGNOSIS	TRATAMIENTO
<u>BACTERIAL</u>		
ANUG Y ESTOMATITIS NECROTIZANTE	Apariencia Clinica Cultivo y Biopsia (para excluir otras causas)	Debridamiento Fovidone-Yodo, Metronidazol Clorhexidina
MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEJO INTRACELULAR	Cultivo	Terapia sistémica
ESTOMATITIS KLEBSIELLA	Biopsia Cultivo	Terapia sistémica (Basada sobre pruebas de sensibilidad antibio- tica)
<u>VIRAL</u>		
HERPES SIMPLS	Apariencia Clinica Inmunofluorescencia sobre frotis	La mayoría de los casos son -- autolimitantes Aciclovir oral para casos sever- ros (más de 10 días)
HERPES ZOSTER	Apariencia clinica Aciclovir oral o IV	
LEUCOPLACIA VILLOSA	Apariencia clinica Biopsia; Hibridación para el virus Epstein-Barr	No tratado rutinariamente Aciclovir oral para casos severos

TABLA V DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ORAL DEL VIH

CONDICION	DIAGNOSIS	TRATAMIENTO
VERRUGAS	Apariencia Clínica	Excisión
<u>NEOPLASTICA</u>		
SARCOMA DE KAPOSI	Apariencia Clínica Biopsia	Cirugía paliativa ó extensiva -- Laser para algunas lesiones -- abultadas o invisibles Terapia por radiación Quimoterapia
LINFOMA NON/HODGKIN	Biopsia	Quimoterapia
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCUELAS	Biopsia	Excisión ó terapia por radiación ó ambos.
<u>OTRO</u>		
ULCERAS APTOSAS RECURRENTES	HISTORIA Apariencia Clínica Biopsia (para excluir otras causas)	Esteroides tópicos Tetraciclina Tópica
PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	Apariencia Clínica Trabajo Hematologica	Terapia Sistémica ^x

TABLA V DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ORAL DEL VIH

CONDICIONES	DIAGNOSIS	TRATAMIENTO
XEROSTOMIA	Apariencia Clínica mediciones del flujo salival	Estimulantes salivales ó - cambio de medicamento siste- mico, ó ambos
AGRANDAMIENTO DE LA GLANDULA SALIVAL	Apariencia Clínica Biopsia (para excluir otras causas Biopsia de la glándula salival - - aguda o labial)	Fluoruros tónicos

* La ternaria sistémica indica que el tratamiento es usualmente llevado a cabo por - - -
Médicos.

CONCLUSIONES

La práctica Odontológica es una profesión de alto riesgo, por lo que el Odontólogo debe tomar las medidas pertinentes de prevención por seguridad propia y para el mejor manejo del resto de los pacientes.

Se debe realizar una Historia Clínica, cuidadosa, amplia y apropiada

Debido a la constante exposición que CD tiene con los pacientes en un determinado momento pueden o no estar infectado con VIH u otras enfermedades transmisibles, por lo cual es conveniente realizarse periódicamente exámenes de rutina incluyendo la prueba de ELISA.

Un punto muy importante es desinfectar el instrumental con los métodos recomendados, por supuesto deben tomarse también los medios adecuados para una completa esterilización y realizar una asepsia de las superficies ambientales del consultorio.

Todos los instrumentos afilados, especialmente agujas y hojas de bisturí son material de desecho.

La sangre, saliva y detritos de enjuagues deben ser vertidos en una tubería, conectada a un sistema de desagüe sanitario.

En caso de que en algún paciente se sospeche sea portador de VIH habrá que aumentar las precauciones de seguridad-

durante su tratamiento.

Es responsabilidad del Odontólogo el saber detectar y -preveer a temprana hora a un portador de VIH,,conociendo de-antemano todas las manifestaciones clínicas y orales de di-cho virus, lo que nos puede llevar a un diagnóstico final --que puede ser el SIDA.

Parte de ésta responsabilidad es la de propiciar un trabajo integral (Odontólogo, paciente y familia) para ayudar al paciente a no sentir rechazo social.

La terapeutica que se utiliza en las diferentes infecciones relacionadas con el SIDA son sólo paleativos que aminoran los malestares, pero generalmente cae en recidivas. Hasta la fecha no se ha encontrado un tratamiento eficaz que --ataque definitivamente este mal que aqueja a la humanidad.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- BATES Barbara. Propedéutica médica
Edit. Interamericana S.A.
1988. 773- 781
- 2.- CONASIDA. El odontólogo frente al SIDA.
Editorial Yagia. 1ª Edición 1989
p.p. 15-31 71-79.
- 3.- DANIELS Victor G. Síndrome de Inmuno De
ficiencia Adquirida 2ª Edición 1989.
p.p. 86-106.
- 4.- Diccionario Terminológico de Ciencias Mé
dicas. Undécima Edición Salvat p. 1073.
- 5.- FUDENBERG H. Hugh, Stites Daniel P., Caldwell
Joseph. L. Wells Vivian J.
Inmunología Clínica. Edit. El Manual -
Moderno S.A. 1987. p.p. 50, 388, 460-461
555, 586-587, 594-596.
- 6.- FUDENBERG H. H ugh, Daniel P. Stites, Joseph -
L. Caldwell, J. Vivian Wells.
Journal of Oral Pathology. Surgery AND -
Radiology March 1992. p.p. 745.
- 7.- GREENSPSN Johns, Pindborg Jens J., Schido Morten.
El Sida en la Cavidad Bucal. 1990
Edit. Actualidades Médico Odontológicas
Latinoamericanas p.p. 48-55, 77- 87.
- 8.- ROSE Louis F. Internacional Medicine For Dentiste.
2ª Edición 1990. p.p. 130-132, 239, 240-270,
339-342, 348-350.

- 9.- TYLDESLEY William R. Atlas a color de --
Medicina Oral, 1983 Edit. Excel
cior p.p. 22-24.
- 10.- SHAFER W. G., Leuy B. M. Tratado de Patología Bucal p.p. 33-35, 88-89, 92-93, 175-177, 375-380, 782.
- 11.- VINCENT T. De Vita Jr, Samuel Hellman, -
Steven A. Rosenberg. SIDA, Etiología, diagnóstico, tratamiento y Prevención. 2ª Edición 1990 - Editorial Salvat S.A. p.p. 38,- 229-240.
- 12.- ROBBINS Stanley L., Marcia Angell Patología Básica Segunda Edición Edit. Inter Americana.1979.m p.p. 74-76, 103-105, 437-440.