UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE QUIMICA

DISEÑO DE AZO-PIRROLES COMO PRECURSORES DE
MATERIALES MOLECULARES

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

QUIMICO

PRESENTA

FRANK FRITZ KLAUS HOCHBERGER ROA

MEXICO, D.F. 11 DE JUNIO AÑO 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

JURADO ASIGNADO:

Presidente José Manuel Méndez Stivalet

Vocal Blas Flores Pérez

Secretario José Guadalupe López Cortes

1er suplente Arturo Navarro Ocaña

2do suplente Cristina del Carmen Jiménez Curiel

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Química Inorgánica 4 del Instituto de Química de la UNAM en conjunto con el departamento de Química de radiaciones y radioquímica del Instituto de Ciencias nucleares de la UNAM, bajo la asesoría del Dr. José Guadalupe López Cortes y de la Dra. María del Carmen Virginia Ortega Alfaro.

Asesor del tema:

Dr. José Guadalupe López Cortes

Supervisor técnico:

Dra. María del Carmen Virginia Ortega Alfaro

Sustentante:

Frank Fritz Klaus Hochberger Roa

GRACIAS TOTALES

AGRADECIMIENTOS

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Al Dr. José Guadalupe López Cortes, a la Dra. María del Carmen Virginia Ortega Alfaro, al Dr. Cecilio Álvarez Toledano y al M. en C. Cesar Sandoval Chávez por la asesoría brindada en este trabajo, por estar siempre dispuestos a aclarar alguna duda y por sus sugerencias, y sobre todo por su amistad.

A los proyectos CONACYT 82982 y DGAPA PAPIIT IN223108, por el apoyo otorgado a esta tesis

Al Consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT). Por la beca otorgada para la realización de esta tesis (No. de registro 82982)

A los técnicos de IR, EM, y rayos X.

Luis Velasco, Javier Pérez, Ma. de las Nieves Zavala, Roció Patiño, Rubén Alfredo Toscano.

A mis compañeros y amigos del laboratorio

Ricardo, Beto, Alex P., Alex T., Toño, Luis, Manuel, Azucena, Nadia, Jenny, Maribel, y Jesús.

Al H. Jurado por su valiosa colaboración a esta tesis

A mis amigos

Aura, Alin, Nelly, Andrea, Gezer, Carlos, Javier, Polo, Moisés, Hugo, Oscar, Alma, Gabriela, Francisco, Erika, Salomón, Fabián, Gerardo, Gustavo, Isaac, Patricia, Carolina.

A mi familia

Fritz Hochberger

Para mi abuelo

INDICE DE COMPUESTOS

1a

2a

2b

3a

3b

3c

INDICE TEMATICO

	Pág.
CAPITULO I	
1. INTRODUCCION	9
CAPITULO II	
2. ANTECEDENTES	10
2.1 Aminas	10
Basicidad de las aminas	11
Aminas heterocíclicas	11
2.2 Pirroles	12
Estructura molecular	12
Propiedades físicas y químicas	13
Aromaticidad	13
Importancia	14
Reactividad	14
Efectos de sustituyentes	15
Acoplamiento Diazo	16
2.3 Azocompuestos	17
Azocolorantes	17
Azocolorantes heterocíclicos	17
Fotoisomerización	18
2.4 Propiedades de la luz	19
Conceptos básicos de color	19
Absorción de luz	20
Espectrofotometría	21

Ley de Lambert-Beer	21
Cuando se incumple la ley de Lambert-Beer	22
Transiciones electrónicas	22
CAPITULO III	
3. OBJETIVOS	24
CAPITULO IV	
4.-METODOLOGIA EXPERIMENTAL	25
4.1 Reactivos utilizados	25
4.2 Instrumentación utilizada	25
4.3 Procedimiento general para la síntesis de azocompuestos	26
CAPITULO V	
5.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN	27
5.1 Análisis espectroscópico	27
5.2 Espectros de absorción UV-Visible	45
CAPITULO VI	
6.-CONCLUSIONES	55

1.-INTRODUCCION

El grupo azo es un grupo funcional del tipo $R-N=N-R'$, en donde R y R' son grupos alquilo o arilo y los átomos de nitrógeno están unidos por un enlace doble. Cuando el grupo azo está conjugado con dos anillos aromáticos, el compuesto que lo contiene absorbe radiación electromagnética en el espectro visible, por lo que presenta coloración. Debido a esta característica, esta clase de compuestos han sido ampliamente usados como colorantes, sin embargo, los azocompuestos se han empleado también en diversas áreas de la ciencia; ya sea como precursores de materiales ópticos, como indicadores ácido-base o como ligantes en Química Organometálica, principalmente formando parte de metalociclos.¹

Si bien es cierto que se conoce un amplia gama de compuestos azoicos con diferentes sustituyentes, la investigación acerca de azocompuestos con grupos heterociclos ha sido poco explorada, debido a que muchos compuestos heterociclos pueden oxidarse en presencia de derivados del ácido nitroso, es por esto que es necesario desarrollar metodologías apropiadas para llevar a cabo la reacción de acoplamiento diazoico.

Esta tesis presenta la síntesis, caracterización y espectros de absorción de tres nuevos azocompuestos derivados del pirrol, además se comparan sus propiedades con tres azocompuestos ya conocidos (el azobenceno, el 2-fenil-azo-*N*-metilpirrol y el 2-(4'-metilfenilazo)-*N*-metilpirrol), estudiando así los efectos que tiene un sustituyente como el átomo de iodo en las propiedades de la molécula.

¹ Kleiman, J. P.; Dubeck, M.; *J. Amer. Chem. Soc.* **1963**, *85*, 1544.

2. ANTECEDENTES

Las aminas son derivados orgánicos del amoníaco, NH_3 , que al igual que el amoníaco, contienen un átomo de nitrógeno con un par solitario de electrones, motivo por el cual las aminas son básicas y nucleofílicas. Los enlaces de las aminas son similares a los enlaces en el amoníaco. El átomo de nitrógeno tiene hibridación sp^3 , los tres sustituyentes ocupan tres vértices de un tetraedro y el par de electrones sin compartir ocupa el cuarto vértice.

A diferencia de los compuestos quirales con base en el carbono, es imposible resolver la mayor parte de las aminas quirales debido a que las dos formas enantioméricas se interconvierten con rapidez por una inversión piramidal. La inversión piramidal ocurre por una re-hibridación momentánea del átomo de nitrógeno a una geometría planar sp^2 , seguida por una re-hibridación del intermediario planar a una geometría sp^3 tetraédrica.²

Esquema 1: Inversión piramidal en aminas

² McMurry, J.; *Química Orgánica*, 5ª edición, Thomson Internacional, México, 2001, páginas 976-985

Figura 1: cambios de hibridación en el átomo de Nitrógeno debido a una inversión piramidal

El par de electrones sin compartir del átomo de nitrógeno, domina la química de las aminas. Debido a este par de electrones, las aminas son básicas y nucleofílicas. En la práctica los valores de K_b no se utilizan con frecuencia, en lugar de ello, la forma más conveniente de medir la basicidad de una amina (RNH_2) es buscar la acidez del ion amonio correspondiente (RNH_3^+). Así tenemos que:

Base más débil pK_a menor para el ion amonio
 Base más fuerte pK_a mayor para el ion amonio

Nombre	Estructura	pK_a del ion amonio
Amoniaco	NH_3	9.26
Pirrolidina		11.27
Anilina		4.63
Pirrol		0.4

Tabla 1: Basicidad de aminas

Por otra parte, las aminas heterocíclicas, son compuestos químicos en los cuales el átomo de nitrógeno forma parte de un anillo, también son comunes y cada

sistema de anillo heterocíclico tiene un nombre propio. El átomo de nitrógeno heterocíclico siempre se considera para efectos de numeración como la posición 1 en monociclos.

Figura 2: Ejemplos de aminas heterocíclicas

El término pirrol proviene de la observación de Runge en 1834³ de que el alquitrán del carbón quemado contenía una sustancia que le daba cierto tono rojizo. Ese compuesto fue aislado del aceite de hueso y purificado por conversión en su sal de potasio por Anderson en 1857⁴. La International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) numeró al sistema de la siguiente forma:

Figura 3: Numeración del pirrol adoptada por la IUPAC

El pirrol es un anillo de cinco miembros con un átomo de hidrógeno, los átomos de carbono muestran en su estructura una hibridación sp^2 , cada uno de estos átomos tiene un electrón en el orbital p_z , mientras que el heteroátomo tiene dos electrones en el orbital p , estos orbitales p se traslapan para formar una nube π arriba y abajo del anillo (Figura 4).

³ Runge, R. *Ann. Physik.*, **1834**, 31, 67.

⁴ Anderson T., *Liebig Ann. Chem.*, **1858**, 105, 349.

Figura 4: Orbitales moleculares del pirrol

El pirrol es un líquido sin color, $P_{eb} = 129.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ a 760 torr, $P_f = 23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$, densidad 0.970 g ml^{-1} a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Se torna gradualmente en café en presencia de aire y es ligeramente higroscópico, tomando aproximadamente 3% de su peso en agua a temperatura ambiente. Las propiedades químicas y físicas del pirrol están de acuerdo con lo esperado para un sistema aromático en el cual el par de electrones libres del nitrógeno está deslocalizado en el anillo.

La energía de resonancia del pirrol se ha estimado por diferentes autores a partir de datos termodinámicos y también usando datos de equilibrio,⁵ por ejemplo, la comparación del cambio de energía libre resultante de la protonación en posición 2 y 3 en el anillo pirrólico con aquellas correspondientes a la protonación de dihidropiridinas y dihidropirroles. El promedio de los valores obtenidos son de alrededor 100 kJ/mol. Esto es menor al valor del benceno (130-140 kJ/mol) y está de acuerdo con el punto de vista aceptado que el pirrol es menos aromático que el benceno.

Una evidencia química para la aromaticidad la proporciona la alta predominancia de la sustitución electrofílica en contra de las reacciones de adición y la tendencia del anillo para sobrevivir a reacciones en las cuales las cadenas laterales son degradadas. La baja basicidad comparada con aminas secundarias típicas,

⁵ Jones, R.A. in C.W. Bird, Cheeseman Eds., *Comprehensive Heterocyclic Chemistry*, Vol. 4, Part 3, Pergamon, Oxford, 1984, p. 201.

también es una evidencia de la deslocalización del par no compartido de electrones del nitrógeno.

Este anillo heterociclo, está ampliamente distribuido en la naturaleza,⁶ es una subunidad de la clorofila, vitamina B₁₂, y un pigmento de la bilis. El Porfobilinogeno (1) es un importante producto natural monopirrólico, puesto que es un precursor biosintético de porfirinas⁷. El anillo pirrólico está presente en un buen número de antibióticos naturales, incluyendo a la cada vez más importante netropsina (2).⁸ Polímeros basados en el sistema del anillo del pirrol muestran propiedades promisorias como materiales semiconductores y conductores.

Figura 5: Compuestos importantes a base de pirrol

El pirrol es muy reactivo frente a agentes electrofílicos, aproximadamente 1000 veces más reactivo que el benceno, esto se debe a que es más rico en electrones. La distribución de carga en el anillo del pirrol es asimétrica, por lo que los átomos de carbono cercanos al nitrógeno tienen una mayor carga negativa en comparación con el benceno, lo que lo hace más susceptible al ataque electrofílico en posición 2.⁹

⁶ Thirumalairajan, S.; Pearce, B. M.; Thompson, A.; *Chem. Commun.* **2010**, 46, 1797.

⁷ Bogorát, L.; Granick, S.; *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, **1953**, 39, 1176.

⁸ Khalaf I. A.; Ebrahimadabi H. A., *Org. Biol. Chem.* **2004**, 2, 3119-3127.

⁹ Jones R. A.; Bean, G. P. *The chemistry of pyrroles*, Academic press, New York, **1977**, 36-74.

Esquema 2: Sustitución electrofílica más favorecida en posición 2

El pirrol reacciona muy rápidamente con una amplia gama de electrófilos, e incluso con reactivos débiles como iodo molecular y sales de aril diazonio, dando el producto de sustitución en posición 2.¹⁰ Muchas de estas reacciones de sustitución electrofílica pueden llevarse a cabo sin la necesidad de un ácido de Brönsted o Lewis como catalizador.

La reacción de electrófilos con pirroles puede ser afectada por efectos estéricos, inductivos o mesoméricos. Los sustituyentes fuertemente aceptores de electrones tienen un marcado efecto desactivante en la reactividad del anillo pirrólico, como el ácido carboxílico del pirrol, sustituyentes electro-aceptores pueden cambiar también la orientación de la sustitución en el anillo pirrólico (Esquema 3).

¹⁰ Miller, Foil A.; *J. Am. Chem. Soc.*, **1942**, *64*, 1543.

Esquema 3: Principales ataques electrofílicos que sufre un anillo pirrólico

La alta reactividad de los pirroles en la sustitución electrofílica aromática se ilustra por su reacción con sales de benceno diazonio. El pirrol da un derivado monoazo al reaccionar como una especie neutra a pH=8, pero a pH 10 se forma el anión pirrilo y la reacción es 10^8 veces más rápida. En condiciones fuertemente alcalinas se forman derivados 2,5-bis(diazofenil)pirrol.¹¹

¹¹ Butler, A.; Pogorzelec, P.; Shepherd, P.; *J. Chem. Soc., Perkin Trans.*, **1977**, *11*, 1452.

Azocompuestos

La química de los diazo y azo compuestos posee un sorprendente número de facetas y una mirada al desarrollo histórico de esta área nos muestra el progreso que se ha realizado tanto en compuestos aromáticos, como alifáticos. El descubrimiento del azobenceno (Mitscherlich, 1834) y azoxibenceno (Zinin, 1841) tuvo lugar en el comienzo de la química orgánica. Inmediatamente después del comienzo del periodo clásico de esta materia, Griess comenzó su trabajo en diazocompuestos (1858) y sus contribuciones formaron los fundamentos de la química de los azocompuestos, este tema fue abordado de manera intensa en laboratorios científicos y tecnológicos y no se limitó a su uso industrial.¹²

Cuando el grupo azo está conjugado a otros dobles enlaces, el compuesto que lo contiene absorbe radiación electromagnética en el espectro visible, por lo que presenta coloración intensa. Por esto son empleados como colorantes en la industria textil, papelería, alimentaria, etc. Por ejemplo, el *p*-dimetilaminoazobenceno se empleó como colorante en la margarina.

La presencia de otros grupos funcionales en el compuesto puede provocar que éste absorba a distintas longitudes de onda (por tanto se obtienen distintos compuestos con colores diferentes). También pueden provocar que el compuesto absorba la luz con mayor o menor intensidad. Asimismo, algunos grupos (por ejemplo grupos sulfónicos) sirven para que el compuesto sea soluble en el medio en el que se va a aplicar.

Los Azocolorantes con componentes heterocíclicos han sido extensamente investigados por producir brillo y fuertes sombras de color en un amplio rango de colores. Estos resultados han propiciado el desarrollo de estos compuestos a

¹² Zollinger H., *Azo and diazo chemistry*. Interscience publishers, Ltd., London, 1961, cap. 1.

escala industrial, reemplazando a los convencionales azocolorantes de benceno¹³.

Entre los azocolorantes conocidos, los azocolorantes heterocíclicos de cinco miembros, como el azotiazol, azotiofeno, azopirrol y azofurano son muy importantes puesto que tienen pronunciadas absorciones batocrómicas comparadas con los colorantes de azobenceno, además son más amigables para el ambiente. Los azocolorantes que absorben en el infrarrojo cercano, basados en heterociclos de cinco miembros han sido usados efectivamente en tres métodos principalmente: (1) introduciendo grupos donadores o aceptores de densidad electrónica al anillo aromático unido al grupo para incrementar la polarización molecular donador-aceptor; (2) expandir el anillo aromático ligado al grupo azo de benceno a naftaleno y de tiazol a benzotiazol; (3) extender la conjugación del enlace N=N de *mono-azo* a *bis-azo* colorantes para aumentar los efectos moleculares de la resonancia π .

Se ha encontrado que los azocompuestos heterocíclicos son útiles como transportadores de datos ópticos, medios de almacenaje por transferencia de calor y láseres semiconductores.¹⁴ Una de las propiedades más interesantes de estos cromóforos es la facilidad y reversibilidad con que sufren isomerización alrededor del enlace azo, de este modo, los isómeros *E* y *Z*, pueden ser interconvertidos fotoquímica o térmicamente.¹⁵

Esquema 5: Interconversión sobre el enlace azo

El mecanismo de la interconversión *E-Z* permanece poco claro, pero al parecer no hay un mecanismo general, sino una competición entre el mecanismo rotacional

¹³ Towns, A.D.; *Dyes Pigm.* **1999**, *42*, 3.

¹⁴ Li, Y.; Patrick, B. O.; Dolphin, D. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 5237.

¹⁵ Coelho, P. J.; Carvalho, L. M. *Tetrahedron Lett.*, **2006**, *47*, 3711.

(alrededor del doble enlace $N=N$) y el inversional (a través de un estado de transición donde uno de los átomos del nitrógeno toma una hibridación sp).

La visión del color está basada en una variedad de procesos físicos, químicos, fisiológicos y psicológicos. La parte del espectro electromagnético visible para el hombre es el rango de longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. La luz puede ser absorbida completamente, en parte o nada por gases, líquidos y sólidos. Esa parte que no es absorbida puede ser reflejada en la superficie de líquidos o sólidos o transmitida a través de gases. La luz que es emitida por una fuente luminiscente, después de reflejada o transmitida alcanza la retina en el ojo humano. De esta forma, la luz con longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros inicia una reacción fotoquímica, y subsecuentemente una serie de reacciones independientes de la luz que toman lugar en el pigmento visual. El proceso que resulta de la transferencia de información entre el ojo y el cerebro produce la percepción visual.

Si los rayos electromagnéticos, alcanzan un sólido el cual refleja toda la luz visible, con completa reflectancia, aparece al ojo humano como blanco. Por otro lado, si el sólido absorbe toda la luz, lo reconocemos como negro. Si absorbe una fracción constante de luz en el rango completo de entre 400 y 700 nanómetros, aparece como gris. Blanco, gris y negro, son llamados colores acromáticos. En contraste con los colores acromáticos, los sólidos que contienen colores cromáticos muestran una o más bandas de absorción. Si una banda de absorción se localiza a longitudes cortas en el espectro visible (400-430 nanómetros), esa parte de la luz entrante será absorbida. El resto del espectro será reflejado y el sólido aparecerá como amarillo al ojo. Análogamente, bandas de absorción a 430-480 nm, 480-550 nm, 550-600 nm, y 600-700 nm dan sólidos los cuales aparecen como naranja, rojo, violeta y azul, respectivamente. Sólidos que parecen verdes se caracterizan por tener dos máximos de absorción a 400-450 nm y 580-700 nm.

Figura 6: Relación color-longitud de onda

La aplicabilidad industrial de los compuestos coloridos depende no solo de la posición de las bandas de absorción con respecto a la longitud de onda, sino también de la intensidad de las bandas como función de la concentración de colorante. La intensidad de la absorción puede ser expresada por la ley de Lambert-Beer.

Los cambios en la posición e intensidad de las bandas son descritas cualitativamente como se indica en la figura 7. Desplazamientos del máximo de absorción a longitudes de onda más largas y cortas, son llamados desplazamiento batocrómico e hipsocrómico, respectivamente. Un incremento y un decremento en la magnitud del coeficiente de extinción (absorción) son llamados cambios hipercrómicos e hipocrómicos, respectivamente.

Figura 7: Efectos longitud de onda-absorbancia

La absorbancia es importante porque es directamente proporcional a la concentración de la especie que absorbe la luz en la muestra:

$$A = \epsilon \cdot b \cdot c \dots\dots\dots \text{Ecuación 1}$$

Esta ecuación es el fundamento de la espectrofotometría, se llama ley de Lambert-Beer. La concentración de la muestra c , normalmente está dada en unidades de molaridad (mol/L ó M). El paso óptico, b , normalmente se expresa en centímetros. La cantidad ϵ se llama absorptividad molar y tiene unidades de $M^{-1}cm^{-1}$. La absorptividad molar es la característica de una sustancia que nos dice cuanta luz absorbe a una longitud de onda determinada.

La ley de Beer afirma que la absorbancia es proporcional a la concentración de la especie absorbente. Esta ley se aplica a la radiación monocromática (En la ley de Beer monocromático significa que el ancho de banda de la luz debe ser mucho más pequeño que el ancho de la banda de absorción del espectro del cromóforo) y es válida para disoluciones diluidas ($0.01M \geq$) de la mayoría de las sustancias.¹⁶

¹⁶Wentworth, W, E.; *J. Chem. Educ.* 1966, 43,262.

En disoluciones concentradas, las moléculas de soluto interactúan entre sí debido a su proximidad. Cuando las moléculas del soluto se acercan unas a otras, sus propiedades (entre las que se encuentra la absorptividad molar) cambian. A concentraciones muy altas, los solutos se convierten prácticamente en disolventes. Las propiedades de una molécula no son exactamente las mismas en diferentes disolventes.¹⁷

Para determinar un compuesto por espectrofotometría debe absorber luz. Dado que la mayoría de los compuestos absorben radiación ultravioleta, la absorbancia en el ultravioleta, de ordinario, es de poca utilidad, y en análisis se utiliza normalmente el espectro visible. Sin embargo, si no hay especies interferentes, puede utilizarse la absorbancia ultravioleta.

Al irradiar una molécula con luz visible o ultravioleta puede originarse una transición electrónica durante la cual la molécula absorbe un cuanto de energía y se excita un electrón desde el orbital que ocupa en el estado fundamental a otro orbital de energía más elevada. Es esencial que la frecuencia de la radiación corresponda a la diferencia de energía entre los dos orbitales implicados.

Las moléculas de un compuesto existen en varios estados vibracionales que sólo difieren entre sí en pequeñas cantidades de energía, cuando un grupo de moléculas sufre la misma transición electrónica experimentan simultáneamente cambios en los estados rotacional y vibracional de cada molécula que no son idénticos. La suma de todas las absorciones origina una banda de absorción y no una línea de absorción.¹⁸

La excitación de un electrón de un par no compartido a un orbital σ^* se denomina transición $n \rightarrow \sigma^*$. Si un átomo con un par electrónico sin compartir está unido, o forma parte de un centro de insaturación de la molécula, todavía es posible una

¹⁷ Harris, D. C. *Análisis Químico Cuantitativo*, 2 ed. español, España, Reverté S.A., 2001, Cap 19.

¹⁸ Allinger, Cava, De-Longh, Johnson, Stevens, Label; *Química orgánica*, 2 ed., España, Reverté S.A., 1984, (Edición original Worth Publishers Inc. New York), 1971, 817-840.

transición de menor energía, que consiste en la excitación de un electrón n a un orbital π^* . Otras transiciones importantes se designan análogamente como $\sigma \rightarrow \sigma^*$ y $\pi \rightarrow \pi^*$.

Figura 8: Representación de las principales transiciones electrónicas.

3 Objetivos

- Llevar a cabo la síntesis de diversos azocompuestos no simétricos derivados de pirrol que en un futuro puedan funcionar como bloques de construcción para materiales moleculares.

- Evaluar la influencia del átomo iodo en diferentes posiciones de la molécula.
- Caracterizar todos los compuestos obtenidos mediante las técnicas espectroscópicas convencionales (EM, IR, RMN ^1H y ^{13}C).
- Evaluar las propiedades como colorantes de los compuestos obtenidos mediante sus espectros de absorción

4. Metodología Experimental

Todos los reactivos utilizados fueron marca Aldrich Chemical Company y se utilizaron sin ningún tratamiento previo. Los disolventes utilizados se adquirieron de proveedores comerciales y se utilizaron sin algún tratamiento posterior. Para la técnica de cromatografía en capa fina se utilizaron cromatofolios de sílice como fase estacionaria y como fase móvil mezclas de hexano-acetato de etilo en proporciones variables, empleando luz ultravioleta o vapores de yodo como reveladores.

La purificación de los productos obtenidos se realizó por medio de cromatografía en columna empleando como fase estacionaria gel de sílice (malla 70 – 230) y como fase móvil se utilizaron mezclas Hexano/acetato en proporciones variables.

La técnica de espectroscopia por resonancia magnética nuclear se realizó en un equipo JEOL ECLIPSE de 300 MHz. El disolvente empleado fue CDCl_3 , los desplazamientos químicos se reportan en partes por millón (ppm) respecto al tetrametilsilano (TMS) usado como referencia interna. La espectrofotometría de infrarrojo se llevó a cabo con un equipo marca Perkin-Elmer 283B utilizando una pastilla de KBr.

Para obtener los espectros de absorción UV-Vis se realizaron diferentes disoluciones de los compuestos en CHCl_3 grado espectrofotométrico, se usó una celda de 1 centímetro de cuarzo, y el equipo utilizado fue Varian Cary 1 Bio UV-Vis, modelo 84524.

Para la determinación de los puntos de fusión se empleó un aparato Mel-Temp II, tomado a una altura de 2235 metros sobre el nivel del mar.

Procedimiento general para la síntesis de azocompuestos

A una disolución de 0.5 ml. de *N*-metil pirrol en medio acuoso, se agregó un equivalente de cada una de las aminas aromáticas utilizadas (anilina, *para*-toluidina, *orto*-iodoanilina, *meta*-iodoanilina y *para*-iodoanilina) y se enfrió a 0 °C, a esta disolución se le agregó lentamente y bajo agitación constante una disolución de 1.2 equivalentes de nitrito de sodio (NaNO₂) con la finalidad de formar *in situ* la sal de diazonio y llevar a cabo la sustitución electrofílica aromática. Al terminar la adición, se retiró el baño y se dejó 5 minutos a temperatura ambiente, se llevó la mezcla a un pH de 10, entonces se calentó la disolución por 10 minutos a 50 °C.

La disolución resultante se extrajo en CH₂Cl₂ y se secó con sulfato de sodio anhidro. La mezcla se purificó por cromatografía en columna de gel de sílice, utilizando como fase móvil mezclas de hexano-acetato de etilo.

azobenceno¹⁹

Sólido amarillo (7.4 %). P_f 65-68 °C P_r²⁰ 68°C. IR (KBr, cm⁻¹): 1352 (N=N), 1206 aromático *trans*. RMN ¹H (90 MHz, CDCl₃, ppm) 7.45 (2H 4-H) 7.49 (4H 3-H) 7.92 (4H 2-H) RMN ¹³C (CDCl₃, ppm) δ 122.8 (2-C), 129.0 (3-C), 130.9 (4-C), 152.7 (1-C).

2-(fenil-azo)-N-metil pirrol

Sólido amarillo (67.69 %). P.f. 40 – 41 °C IR (KBr, cm⁻¹): 1352 (N=N), 1206 (aromático *trans*) RMN ¹H (300 MHz, CDCl₃, ppm) 3.94 (s, 3H, 1-H), 6.28 (m, 1H, 4-H), 6.71 (m, 1H, 3-H), 6.91 (m, 1H, 2-H), 7.34 (m, 1H, 9-H), 7.42 y 7.81 (t, t, 4H, 7-H y 8-H) RMN ¹³C (CDCl₃, ppm) δ 33.4 (1-C), 100.0 (3-C), 110.4 (2-C), 122.2 (7-C), 126.9 (4-C), 129.1 (8-C), 129.4 (9-C), 146.6 (5-C), 153.7 (6-C).

¹⁹ http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi (9 Junio 2010)

²⁰ http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=36689|FLUKA&N5=SEARCH_CONC_AT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC (10 junio 2010)

2-(4'-metilfenil-azo)-N-metil pirrol

Sólido amarillo (43.55%). P.f. 53 °C. IR (KBr, cm^{-1}): 1353 (N=N), 1210 (aromático *trans*) **RMN ^1H** (300 MHz, CDCl_3 , ppm) 2.41 (s, 3H, 10-H), 3.95 (s, 3H, 1-H), 6.29 (m, 1H, 4-H), 6.69 (m, 1H, 3-H), 6.91 (m, 1H, 2-H), 7.27 y 7.74 (sist AA'BB', 4H, 7-H y 8-H) **RMN ^{13}C** (CDCl_3 , ppm) δ 21.5 (10-C) 33.4 (1-C), 99.5 (3-C), 110.1 (2-C), 122.0 (7-C), 126.5 (4-C), 129.7 (8-C), 139.7 (9-C), 146.5 (5-C), 151.7 (6-C).

2-(4'-iodofenil-azo)-N-metil pirrol

Sólido amarillo (59.77 %). P.f. 84 °C IR (KBr, cm^{-1}) 1350 (N=N), 1201 (aromático *trans*) **RMN ^1H** (300 MHz, CDCl_3 , ppm) 3.93 (s, 3H, 1-H), 6.29 (m, 1H, 4-H), 6.72 (m, 1H, 3-H), 6.95 (m, 1H, 2-H), 7.53 y 7.78 (sist AA'BB', 4H, 7-H y 8-H) **RMN ^{13}C** (CDCl_3 , ppm) δ 33.5 (1-C), 94.1 (9-C), 100.7 (3-C), 110.6 (2-C), 123.7 (7-C), 127.6 (4-C), 138.2 (8-C), 146.5 (5-C), 153.1 (6-C).

2-(3'-Iodofenil-azo)-N-metil pirrol

Solido amarillo (36.63 %). P.f. 58-59 °C IR (KBr, cm^{-1}) 1350 (N=N) **RMN ^1H** (300 MHz, CDCl_3 , ppm) 3.94 (s, 3H, 1-H), 6.29 (m, 1H, 4-H), 6.95 (m, 1H, 3-H), 7.14 (m, 1H, 2-H), 7.20 (m, 1H, 10-H), 7.66 (m, 1H, 7-H), 7.77 (m, 1H, 9-H), 8.11 (m, 1H, 11-H) **RMN ^{13}C** (CDCl_3 , ppm) δ 33.5 (1-C), 94.6 (8-C), 100.9 (3-C), 110.5 (2-C), 122.7 (11-C), 127.7 (4-C), 129.6 (10-C), 130.5 (7-C), 137.7 (9-C), 146.3 (5-C), 154.5 (6-C).

2-(2'-Iodofenil-azo)-N-metil pirrol

Aceite amarillo (14.75 %). P.f. Líquido a temperatura ambiente IR (KBr, cm^{-1}) 1439 (-N=N-), 1204 (aromáticos *trans*) **RMN ^1H** (300 MHz, CDCl_3 , ppm) 3.95 (s, 3H, 1-H), 6.29 (m, 1H, 4-H), 6.86 (m, 1H, 3-H), 6.90 (m, 1H, 2-H), 6.91 (m, 1H, 9-H), 7.56 (m, 1H, 10-H), 7.93 (m, 1H, 11-H), 7.96 (m, 1H, 8-H) **RMN ^{13}C** (CDCl_3 , ppm) δ 34.9 (1-C), 101.3 (7-C), 110.6 (2-C), 116.9 (3-C), 128.4 (4-C), 128.8 (10,11-C), 130.5 (9-C), 139.7 (8-C), 146.1 (5-C), 152.5 (6-C).

Aunque la síntesis y el mecanismo de formación de una gran variedad de azocompuestos, ya ha sido establecido, no existen muchos estudios acerca de la síntesis de estas moléculas cuando en su estructura tienen un anillo pirrólico. En nuestro grupo de trabajo, estamos interesados en la búsqueda de materiales que tengan propiedades de óptica no lineal,²¹ nosotros pensamos que una fuente de esta clase de compuestos pueden ser los azopirroles, dado que otros compuestos azoicos tienden a fotoisomerizarse, por lo que pueden ser útiles en la generación de nuevos materiales.²² Es por lo anterior que en esta tesis se aborda la síntesis de nuevos azopirroles y el estudio de algunas de sus propiedades ópticas.

Mecanismo de reacción:

Esquema 6: Mecanismo de formación de compuestos azoicos

Inicialmente comenzamos nuestra investigación siguiendo la ruta sintética más común para la formación de azocompuestos, que es la diazotización en medio

²¹ Schilling, M. L.; Katz, H.G.; Cox, D.I.; *J. Org. Chem.*, **1988**, 53, 5538.

²² Mativetsky, J.; Pace, G.; Elbing, M.; *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, 130, 9192.

acuoso, seguida de una reacción de acoplamiento diazoico por medio de una sustitución electrofílica aromática (Esquema 7).

Esquema 7: Planteamiento retrosintético para la síntesis de los compuestos presentados

De esta forma se llevó a cabo la síntesis del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol, con el propósito de estandarizar las condiciones de la reacción, primeramente se siguió parcialmente la ruta antes mencionada, sin embargo fue necesario realizar algunos cambios para optimizar el proceso y obtener rendimientos más altos tales como observar si la cantidad de ácido clorhídrico era determinante, o bien, si el utilizar otro disolvente como metanol podría ser una opción adecuada. La síntesis del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol se llevó a cabo de acuerdo a la metodología descrita previamente haciendo reaccionar la sal de diazonio de la anilina con el *N*-metilpirrol mediante una reacción de sustitución electrofílica aromática (esquema 8).

Esquema 8: Planteamiento sintético para la formación del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol

Las adecuaciones que se realizaron a la técnica general de obtención de azocompuestos funcionaron de manera positiva, logrando, en el caso del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol que el rendimiento aumentara del 53.4% a 67.69%. El compuesto fue purificado mediante una columna de sílice, una vez purificado fue caracterizado mediante técnicas espectroscópicas (IR, RMN ^1H y ^{13}C). El espectro de IR (en pastilla de KBr) del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol (1), destaca la presencia de una banda a 1352 cm^{-1} , la cual es asignada a la vibración del enlace $\text{N}=\text{N}$, también es importante la banda a 1206 cm^{-1} , la cual nos indica la conformación *trans* de la molécula.

Espectro 1; Espectro de IR del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol

En lo que respecta a la espectroscopia de masas, es posible observar un pico en 185 m/z, que corresponde al ion molecular esperado y que también es nuestro pico base, además se observa un patrón de fragmentación en donde hay un pico a 156 m/z que indica la pérdida de nitrógeno (N_2), asimismo, se observa un fragmento a 80 m/z mostrando la presencia del pirrol.

Espectro 2: Espectro de masas (IE^+) del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol

El espectro 3 muestra la RMN 1H para el 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol en el cual vemos a 3.94 ppm una señal que integra para tres protones, la cual es asignada a los protones de metilo enlazados al nitrógeno del pirrol, a campos un poco más bajos tenemos los tres protones que presenta la molécula de pirrol, ubicados en 6.28 ppm, el protón unido al carbono 4 y que presenta una multiplicidad de 2, en 6.91 ppm se observa el protón del carbono 2 con multiplicidad de 2, y a 6.71 ppm,

el protón enlazado al carbono 3 como una señal múltiple; cada una de estas señales integran para un protón. Finalmente tenemos las señales del anillo bencénico, en 7.34 ppm que integra para un protón y se asigna al H en posición *para* al grupo azo, las de 7.42 y 7.81 ppm, las cuales se asignaron a los protones en posición *orto* y *meta* al grupo azo, respectivamente.

Espectro 3: Espectro de RMN ^1H (CDCl_3) del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol

En lo que respecta al espectro de RMN ^{13}C para el mismo compuesto, a campo alto, a 33.4 ppm tenemos al grupo metilo base nitrógeno del pirrol, a 100.0 ppm se encuentra el carbono 3, en 110.4 ppm, el carbono 2 del pirrol, en 122.2 ppm los carbonos *orto* al grupo azo del anillo bencénico, en 127.0 ppm el carbono 4 del pirrol, así mismo podemos observar en 129.0 y 129.4 ppm, las señales de los carbonos de las posiciones *meta* y *para* con respecto al grupo azo, finalmente en 146.6 y 153.7 ppm se observan los carbonos cuaternarios C5 y C6, respectivamente.

Espectro 4: Espectro de RMN ^{13}C para el 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol

Una vez que se logró de forma positiva la síntesis del 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol y con el propósito de observar la influencia de un grupo ligeramente donador, en la formación de la sal de diazonio, se utilizó la *para*-toluidina, la reacción procedió de forma eficiente y el 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metil pirrol se obtuvo con un rendimiento de 43.55% (Esquema 9). Aunque este compuesto, se encuentra descrito en la literatura,²³ no se informa su caracterización espectroscópica, por lo cual uno de los objetivos de este trabajo fue llevar a cabo su caracterización completa mediante técnicas espectroscópicas (estos datos se resumen en la parte experimental) y adicionalmente se logró confirmar su estructura mediante difracción de Rayos X de monocristal (Figura 9).

²³ J. Sepulveda Arques, M. E. González Resende, M E. Zaballo García, *Anales de Química*, **1991**, *88*, 246-248.

Esquema 9: Planteamiento sintético para la formación del 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metilpirrol

Figura 9: Proyección tipo ORTEP para el 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metil pirrol

Uno de los factores más obvios que afectan la distancia entre dos átomos es la multiplicidad del enlace; los enlaces simples son más largos que los dobles enlaces, y éstos a su vez más largos que triples enlaces, los valores calculados

para algunos enlaces son: C-C 1.54 Å, C=C 1.34 Å, N-N 1.45 Å., N=N 1.25 Å., N≡N 1.10 Å.²⁴

Como se observa en el diagrama ORTEP (Figura 9), el doble enlace N=N se encuentran en su conformación *trans*, que es la más estable. Los valores para las distancias en los dobles enlaces C=C y N=N son muy cercanos a los valores que se dan teóricamente.

Asimismo, se puede observar que la distancia de enlace de C(6)-N(3) es de 1.419 Å, mientras que la distancia N(2)-C(2) es de 1.380 Å, lo cual confirma el mayor carácter electrodonador del anillo pirrol con respecto al anillo bencénico.

Tabla 2: Distancias de enlaces para el 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metil pirrol

Distancias de enlace (Å)			
N(1)-C(5)	1.350	C(4)-C(5)	1.365
N(1)-C(2)	1.375	C(6)-C(7)	1.382
N(1)-C(1)	1.456	C(6)-C(11)	1.395
N(2)-N(3)	1.269	C(7)-C(8)	1.383
N(2)-C(2)	1.380	C(8)-C(9)	1.383
N(3)-C(6)	1.419	C(9)-C(10)	1.389
C(2)-C(3)	1.383	C(9)-C(12)	1.506
C(3)-C(4)	1.393	C(10)-C(11)	1.376

Tabla 3: Ángulos de enlace en el 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metil pirrol

Ángulos de enlace (°)			
C(5)-N(1)-C(2)	108.17	C(7)-C(6)-C(11)	118.83
C(5)-N(1)-C(1)	125.88	C(7)-C(6)-N(3)	116.60
C(2)-N(1)-C(1)	125.85	C(11)-C(6)-N(3)	124.57
N(3)-N(2)-C(2)	114.17	C(6)-C(7)-C(8)	120.81
N(2)-N(3)-C(6)	113.88	C(7)-C(8)-C(9)	120.92
N(1)-C(2)-N(2)	117.40	C(8)-C(9)-C(10)	117.84
N(1)-C(2)-C(3)	108.28	C(8)-C(9)-C(12)	121.39
N(2)-C(2)-C(3)	134.31	C(10)-C(9)-C(12)	120.78
C(2)-C(3)-C(4)	106.56	C(11)-C(10)-C(9)	121.92
C(5)-C(4)-C(3)	107.88	C(10)-C(11)-C(6)	119.67
N(1)-C(5)-C(4)	109.11		

²⁴ Huheey, J. E.; Inorganic Chemistry; 3 ed.; Harper & Row publishers, Inc; 1983; U.S.A.; pag. 237

Tabla 4: Datos cristalográficos del 2-(4'-metilfenil-azo)-N-metil pirrol

Fórmula	C ₁₂ H ₁₃ N ₃
Peso molecular (g mol ⁻¹)	199.25
Tamaño del cristal	0.364 × 0.296 × 0.264 mm
Color	amarillo
Sistema cristalino	Monoclínico
Grupo espacial	P 2 ₁ /c
Dimensiones de celda unitaria	
a (Å)	9.549
b (Å)	10.253
c (Å)	11.667
α (°)	90
β (°)	107.334
γ (°)	90
V	1090.3 Å ³
Z	4
D _{calculada}	1.214 Mg/m ³
No. de reflexiones colectadas	11575
No. reflexiones independientes	1992 (R _{int} =0.0322)
Método de corrección adsorción	Semi-empírico
Máximos y mínimos de transmisión	0.9863 y 0.9733
Datos/parámetro	1992/138
Índice R final (>2σ(1))	R1=0.0471, wR2=0.1211
Índice R (todos los datos)	R1=0.0399, wR2=0.1309

Es importante recalcar que la síntesis de ambos compuestos ya había sido informada previamente por Arques,²³ sin embargo la caracterización de los compuestos no fue completa, por lo cual una contribución de esta tesis es la confirmación estructural de uno de los azo-compuestos por difracción de rayos X. Y estos azo-derivados fueron sintetizados a fin de tener una referencia conocida e interpretar la espectroscopia de ultravioleta de sus análogos iodados, con el propósito de estudiar cómo afecta el átomo de iodo a las propiedades electrónicas de la molécula.

Como ya se mencionó previamente, nosotros estamos interesados en la síntesis de compuestos con propiedades ópticas importantes, los cuales puedan ser utilizados posteriormente como bloques constructores en la síntesis de compuestos más complejos. Un método general usado frecuentemente en la

síntesis de dendrímeros,²⁵ es el uso de reacciones de acoplamiento carbono-carbono,²⁶ los cuales requieren de compuestos aromáticos que posean un halógeno de arilo apropiado, generalmente yoduro, es por lo anterior, que se decidió abordar la síntesis de tres diferentes iodo-fenil azo pirroles, utilizando la iodoanilina correspondiente, para generar la sal de diazonio apropiada y el *N*-metilpirrol como anillo aromático (Esquema 11).

Esquema 11: Planteamiento sintético para la formación de la serie de 2-(iodofenil-azo)-*N*-metil pirroles **3a-c**

Iniciamos con la obtención del azocompuesto que tuviera un menor impedimento estérico, en este caso del 2-(4'-iodofenil-azo)-*N*-metilpirrol (**3a**), el cual se sintetizó por el procedimiento descrito en la parte experimental, con un rendimiento del 59.77%. Este compuesto se caracterizó usando diferentes técnicas espectroscópicas. El espectro de IR (KBr) del 2-(4'-iodofenil-azo)-*N*-metilpirrol, muestra la presencia de una banda que sobresale del resto a 1350 cm^{-1} como consecuencia de la vibración del enlace N=N y a 1201 cm^{-1} se puede ver la señal característica del azocompuesto con geometría *trans*.

²⁵ Zhong, Y. L.; Loh K. P.; Midya, A.; Chen, Z.; *Chem. Mater.* **2008**, 20, 3137

²⁶ Schröter, S.; Stock, C.; Bach, T.; *Tetrahedron*; **2005**, 61, 2245.

Espectro 8: Espectro IR del 2-(4'-Iodofenil-azo)-N-metil pirrol

Las señales del espectro de RMN ^1H para 3a se asignaron de la manera siguiente: los protones del metilo unido al nitrógeno del pirrol aparecen en 3.93 ppm, a campos más bajos tenemos las señales de los tres protones del pirrol, cada uno de las cuales integra para 1H, éstos aparecen en 6.29, 6.72 y 6.95 ppm y corresponden a los hidrógenos H4, H3 y H2, respectivamente. Cabe mencionar que no se aprecian las multiplicidades de estas señales y que la asignación se realiza gracias a que los desplazamientos son muy semejantes a su análogo sin Iodo. Las señales de los protones en el anillo bencénico aparecen aun a campos más bajos, ubicándose en 7.5 y 7.8 ppm las señales de los protones bencénicos en posición *orto* y *meta* al grupo *azo* respectivamente, cada una de ellas con una integración de dos protones. Los protones *orto* al átomo de Iodo se ven desplazadas a menores partes por millón, esto es debido a que estos hidrógenos están más desprotegidos en comparación a los ubicados en posición *meta*.

Espectro 9: Espectro de RMN ^1H (CDCl_3) del 2-(4'-Iodofenil-azo)-N-metil pirrol

En el espectro de RMN ^{13}C se observa el número de señales esperadas para este compuesto, a 33.5 ppm aparece la señal del grupo metilo unido al nitrógeno del pirrol, en 94.1 ppm aparece el carbono *ipso* al átomo de yodo, en 100.7 ppm se observa la señal del carbono 3, en 110.6 ppm está la señal que corresponde al carbono 2, en 123.8 ppm esta la señal correspondiente a los carbonos *meta* al yodo y en 138.8 ppm, la correspondiente a los que se encuentran *orto* al yodo, en 127.6 ppm aparece la señal del carbono 4, y a campos más bajos están las señales de los carbonos *ipso* al grupo azo, en 146.5 ppm el carbono 5 y finalmente en 153.1 ppm se observa el carbono 6.

Espectro 10: Espectro de RMN ^{13}C (CDCl_3) del 2-(4'-Iodofenil-azo)-N-metil pirrol

Una vez obtenido el compuesto 2-(4'-Iodofenil-azo)-N-metil pirrol, se realizó la síntesis de los otros azopirroles con sustituyente iodofenilo, todos los compuestos fueron sólidos amarillo-naranja y se obtuvieron en rendimientos aceptables (ver tabla 5). Las diferencias en los rendimientos obtenidos para estas reacciones, se pueden explicar debido al efecto de la posición del sustituyente.

Tabla 5: Rendimientos obtenidos

Estructura	Rendimiento	Apariencia	P. f.
<p>2a</p>	67.69%	Sólido amarillo	40-41 $^{\circ}\text{C}$
<p>2b</p>	43.55%	Sólido amarillo	53 $^{\circ}\text{C}$

3a	59.77%	Sólido amarillo	83-84 °C
3b	36.63%	Sólido amarillo	58-59 °C
3c	14.75%	Aceite amarillo-negro	Líquido

Al analizar con detalle los resultados obtenidos se pueden deducir las siguientes conclusiones:

1.- El yodo es un átomo electronegativo, el cual por efecto inductivo provoca que la sal de diazonio formada sea menos estable en comparación con la del anillo aromático sin sustituyente, así se entiende que el rendimiento obtenido sea más bajo para **3a** en comparación con el obtenido para el 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol (**2a**).

2.- Cuando el átomo de yodo se encuentra en la posición *orto* con respecto a la sal de diazonio, además de los efectos inductivos y de resonancia, el efecto estérico juega un papel importante, provocando con ello que el rendimiento de la reacción de diazotización disminuya drásticamente.

Una vez obtenidos los compuestos y habiéndolos caracterizado, estudiamos sus espectros de absorción UV-Vis, además se observó la viabilidad de utilizar estos compuestos como colorantes a nivel industrial, calculando para ello el coeficiente de extinción molar. De acuerdo a la literatura, los colorantes técnicos tienen valores en el rango de $10^4 - 10^5 \text{ mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$. Colorantes con coeficientes de extinción molar particularmente altos son eficientes en términos de coloración obtenida por mol de colorante y debido a esto son económicos.

Para calcular el coeficiente de absorptividad molar (ϵ) para estos compuestos se utilizo la ley de Lambert-Beer

$$A = \epsilon \cdot b \cdot c$$

Si conocemos la longitud de onda a la cual hay una absorción máxima, la concentración de las disoluciones y la longitud del paso óptico, realizando una gráfica de absorbancia en función de la concentración, la pendiente será el coeficiente de absorptividad molar.

$$A_1 = \epsilon \cdot b \cdot c_1 \dots A_2 = \epsilon \cdot b \cdot c_2$$

Así, podemos tener la ecuación de una recta

$$y = mx + b; \text{ en donde:}$$

$$y = A, x = c \text{ y } m = \epsilon \cdot b$$

En nuestro caso inicialmente trabajamos con el compuesto 2-fenil-azo-*N*-metilpirrol, se prepararon disoluciones en concentraciones molares usando como disolvente CHCl_3 de 10^{-5} , $2 \cdot 10^{-5}$, $4 \cdot 10^{-5}$, $5 \cdot 10^{-5}$, $8 \cdot 10^{-5}$, 10^{-4} , y $2 \cdot 10^{-4}$, obteniendo los espectros de absorción que se observan en la grafica 1.

Gráfica 1: Concentraciones usadas para realizar la grafica de absorbanca

Con estos resultados y utilizando la ley de Lamber-Beer, se trazó una gráfica para buscar la relación entre la concentración y la absorbanca (gráfica 2). Con estos puntos se realizó una correlación lineal mediante mínimos cuadrados, determinando la pendiente, la cual, corresponde al coeficiente de absortividad molar para el compuesto determinado. De este modo el valor para el azocompuesto 2-fenil-azo-*N*-metilpirrol (2a) fue de $21509 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$.

Gráfica 2: Obtención del coeficiente de absorptividad molar

Se realizó el mismo procedimiento con todos los azo-compuestos obtenidos y los valores se encuentran en la tabla 6.

Tabla 6: Longitudes de absorción máxima y coeficientes de absorptividad molar

Estructura	Longitud de onda de máxima absorción (en CHCl_3)	Coefficiente de extinción molar
393 nanómetros (319 nm en benceno ²⁷)	$22387 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ en benceno
387 nanómetros	$21509 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$
389 nanómetros	$21685 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$

²⁷Zimmerman, G.; Chow, L.; Paik, U.; *J. Chem. Phys.*; **1958**, *80*, 3528-3531.

357 nanómetros	$19911 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$
395 y 342 nanómetros	11743 y $13474 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ respectivamente
392 nanómetros	$6332.2 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$

Una vez obtenidos los datos, se realizó una comparación con los diferentes azocompuestos sintetizados, para ello se trazaron los espectros de absorción de estos compuestos a la misma concentración, con la finalidad de observar las diferencias que se presentan en los diferentes compuestos debidas al efecto del sustituyente (Grafica 3).

Grafica 3: Espectros de absorción de los azocompuestos **2a-b** y **3a-c** a una misma concentración

A continuación se muestran los espectros de absorción UV-Visible (en CHCl_3) para los compuestos de referencia, empleando las mismas condiciones que en los casos anteriores.

a) Azobenceno

Longitud máxima de absorción: 393 nm

Grafica 4: Espectro de absorción para azobenceno

b) 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol (1)

Longitud de onda de máxima absorción: 387 nm

Grafica 5: Espectro de absorción 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol

Gráfica 6: Determinación del Coeficiente de absorción molar para 2-(fenil-azo)-*N*-metil pirrol (2a)

- c) 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metil pirrol (2b)
Longitud máxima de absorción: 389 nm

Gráfica 7: Espectros de absorción 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metil pirrol

Gráfica 8: Determinación del Coeficiente de absorptividad molar 2-(4'-metilfenil-azo)-*N*-metil pirrol (2b)

- d) 2-(4'-Iodofenil-azo)-*N*-metil pirrol (3a)
Longitud máxima de absorción: 357 nm

Gráfica 9: Espectros de absorción 2-(4'-Iodofenil-azo)-*N*-metil pirrol

Gráfica 10: Determinación del Coeficiente de absorptividad molar 2-(4'-iodofenil-azo)-*N*-metil pirrol (3a)

e) 2-(3'-iodofenil-azo)-*N*-metil pirrol (3b)

Longitudes de onda de máxima absorción: 1.-395 nm, 2.-340 nm

Gráfica 11: Espectros de absorción 2-(3'-iodofenil-azo)-*N*-metil pirrol

Grafica 12: Determinación del Coeficiente de absorptividad molar 2-(3'-iodofenil-azo)-N-metil pirrol (3b)

Grafica 13: Determinación del Coeficiente de absorptividad molar 2-(3'-iodofenil-azo)-N-metil pirrol (3b)

f) 2-(2'-iodofenil-azo)-N-metil pirrol
Longitud de onda de máxima absorción: 392 nm

Grafica 14: Espectro de absorción 2-(2'-Iodofenil-azo)-N-metil pirrol

Gráfica 15: Determinación del Coeficiente de absorptividad molar 2-(2'-iodofenil-azo)-N-metil pirrol (3c)

Al realizar estos espectros de absorción y calcular sus respectivos coeficientes de absorptividad molar se observa cierta tendencia, por lo que se hizo la siguiente gráfica; en donde se relaciona la longitud de máxima absorción para cada compuesto en función de la sigma de Hammett:

Gráfica 16: Relación sustituyentes – λ_{max}

Se puede ver que una propiedad macroscópica como es el color (longitud máxima de absorción) guarda una marcada relación con un parámetro teórico como lo es la constante de Hammett²⁸ (que tan activado esta un anillo).

Con estos resultados podemos decir que un grupo desactivante como el Iodo produce en general una disminución del coeficiente de absorción molar; lo cual nos indica una disminución en la probabilidad de las transiciones electrónicas $\pi \rightarrow \pi^*$ y $n \rightarrow \pi^*$ del grupo cromóforo, las cuales no se pueden diferenciar.²⁹

-La molécula con el impedimento estérico más alto (3c) tiene un bajo coeficiente de absorción molar, por lo que es menos probable su transición $\pi \rightarrow \pi^*$ y $n \rightarrow \pi^*$ y también presenta un fuerte efecto batocrómico respecto a su análogo **2a**.

-El azocompuesto con el sustituyente Iodo en posición *meta* presenta dos bandas máximas de absorción, por lo sería posible diferenciar las bandas debidas a las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$ y $n \rightarrow \pi^*$ del grupo azo.

-En la molécula con el sustituyente Iodo en posición *para* sólo se observa una banda de absorción en 357 nm, debida la suma de las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$ y $n \rightarrow \pi^*$ principalmente. Con un coeficiente de absorción molar de $19911 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$, muy parecido a su análogo **2a**, esto nos indica una probabilidad muy similar a llevar a cabo esta transición, pero también un fuerte efecto hipsocrómico, que indica que la energía para llevar a cabo esta transición es más alta.

²⁸ Mosher, M.; Ansell, Jay; Journal of chemical education, 1975, 195, 52.

²⁹ Rau H. en Rabek J.K. editor. *Photochemistry and photophysics*, Vol 2. Boca Raton, FL: CRC Press, 1990, p. 119.

CONCLUSIONES

- Se logró la síntesis de diversos azocompuestos, a través de una modificación a la metodología común para la obtención de este tipo de compuestos, con mejores rendimientos y condiciones de reacción fácilmente manejables.
- Durante este proceso se logró la síntesis de dos azo-compuestos ya conocidos el 2-fenilazo-*N*-metilpirrol (**2a**), y 2-(4'-metilfenil)azo-*N*-metilpirrol (**2b**) en rendimientos menores a los reportados, pero con condiciones más suaves y usando como disolvente, agua.
- También se realizó la síntesis de tres nuevos azo-compuestos, el 2-(4'-iodofenil)azo-*N*-metilpirrol (**3a**), 2-(3'-iodofenil)azo-*N*-metilpirrol (**3b**) y el 2-(2'-iodofenil)azo-*N*-metilpirrol (**3c**) en buenos rendimientos.

- Se realizó la caracterización completa de todos los compuestos sintetizados en este trabajo, lográndose confirmar mediante difracción de Rayos-X de monocristal la estructura del compuesto **2b**.
- Se llevó a cabo la caracterización espectrofotométrica de los compuestos **2a**, **2b**, **3a**, **3b** y **3c**, determinándose en todos los casos los coeficientes de absorptividad molar en Cloroformo.

C:\infrarrojo\AIR-2009\1862.0 Dr.J.Lopez Azo 2 KBr/Pastilla RPM

31/08/2009

AZOH_1H_4.jdr

X : parts per Million : 1H

X : parts per Million : 13C

OrtoIAzopirrol_1H_-4.jdf

12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0

7.9627
7.9586
7.9366
7.9325
7.5667
7.5621
7.5511
6.9102
6.9053
6.8644
6.8507
6.3068
6.2981
6.2931

3.9577

X : parts per Million : 1H

152.5146	146.1478	139.7658	130.5286	128.8338	128.4139	116.9858	110.6495	101.2825	34.8968
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

C:\Infrarrojo\AIR-LEP-IQUI-001\838.0

Dr.J.Lopez

m-lazopirrol

KBr/Pastilla

RPM

13/05/2010

metaIazopirrol-1H_5.jdf

8.1133
7.7727
7.7471
7.6065
7.4413
7.2497
7.2018
7.1767
7.1496
7.1112
6.9574
6.7188
6.7106
6.7055
6.2930
6.2862

5.2835

3.9480

N: parts per ABJlon : 1H

154.4890

146.3053

137.6335

130.4722

129.6172

127.6934

122.7008

110.5474

100.9112

94.6075

33.5198

153.0872

146.4837

138.1855

127.6200

123.7724

110.6571

100.7329

95.1142

33.5456

7.7806
7.7541
7.5380
7.5114
6.9524
6.7249
6.7130
6.3037
6.2932
6.2840
3.9381
3.9349
3.9175